



6. 6 222

VIATICVM NOVVM,

DE OMNIVM

FERE PARTICVLA-

RIVM MORBORVM CVRA-

tione, Liber, authoris innominati quidem, sed
longè doctissimi, verè aureus & incomparabilis,
nunc primùm in lucem editus per C A-

SPARVM VVOLPHIVM

Medicum Tiguri-

num.

Ex libris Joh. Jac. Schilleri



TIGURI,

APVD CHRISTOPH. FROSCHE,

Anno M. D. LXXVIII.

6338



ANTIQUISSI-

MA NOBILITATE, VIRTUTE

& doctrina præstantissimis viris, D. Iohan. Georgio & D. Christophoro ab Hinuuyl fratribus, dominis suis colendis Casparus Vuolphius
Medicus, Tigurinus.

S. D.

ANTE annos duodecim, cum Medicina discendæ atque exercendæ gratia, Gallia, Italiaque celeberrimæ Academies sequerer: fortè in ruderibus cuiusdam bibliothecæ veteris, hunc de curandis morbis libellum manu scriptum reperi. Eum ipsum utrum utilitatis publicæ prouehendæ gratia in lucem darem, an meis ipsius priuatis vsibus conseruarem, diu multumq; mecum dubitavi. Ac suppressendi quidem huius causæ, cum multæ, magnæ & graves occurrebant, cum illæ me potissimum mouebant: quod viderem, partim huius generis scripta selectissima tam à priscis, quam à recentioribus doctoribus elaborata extare: partim etiam esse plerosque in ea sententia, ut si

EPISTOLA.

quid habeant rarius, aut, ut ipsi vocant, secretius, id ipsum sibi potius seruandum, quàm publicandum arbitrentur. Ex altera autem parte, Stoicorum non omnino improba sententia, qua homines hominum causa genitos asserunt, fecit, ut existimarim nefas esse, occultare atque suppressere, quod multis vsui & utilitati esse possit: in memoriam hoc Ennij Poetae dictum reuocans, quod is qui de suo lumine, lumen alteri accenderit, facit, ut nihilominus ipsi luceat. In quacunque enim re aliquis cæteris præstat, ea de re hominibus bene mereri debet, & diuinam illam in nos benignitatem optimum quenque, hominem iuvando, quàm proximè imitari decet ac convenit. Qua de causa cum nihil sit, mea quidem sententia, tam proprium humanitatis atque amoris, quàm communicatio, & semper aliquid, ut Ciceroni placet, ad communem utilitatem afferendum, putavi librum eum, cuius lectione sæpius mirificè sum & delectatus & adiutus, cōmunem multis faciendum: & siquidem culpa hoc meum factum vacare non possit, in temeritatis potius, quàm inuidiæ

dia crimen incurrendum. Optandum equidem
 fuisset, ut ipsemet author, quisquis tandem
 fuit (neque enim cuiusquam nomen ascri-
 ptum liber habuit) hunc in lucem edidisset:
 quo laboris & ingenij sui laudem atque præ-
 mium ipse tulisset, & liber elaboratior ac per-
 fectior exisset. Requirit siquidem hoc argu-
 menti genus, quod de morbis feliciter curan-
 dis & commodè regendis agris, tractat, in-
 genium felicissimum, iudicium summum, &
 experientiam longè maximam. Neque enim
 frustra est, quod primo de pulsuum differen-
 tijs Galenus prodidit, tantam inquit, in
 hac arte difficultatem esse & obscuritatem,
 ut si vel triplo longius spaciū nobis conce-
 deretur, tamen ne tunc quidem exactè nos
 omnia cognoscere posse. Nam quemadmo-
 dum nihil est, nec pulchrius, nec utilius,
 quàm multis & varijs morbis huius artis
 beneficio leuari, & optatum sentire restitua-
 tæ sanitatis fructum: sic videtur, tum pro-
 pter subiectum adeò nobile, tum propter oc-
 casionem sanè quàm præcipitem, nec diffici-
 lius quicquam, nec magis laboriosum, quàm

de morbi specie rectè iudicare, & ea, quæ sine
 huic pariter & naturæ laborantis aptissima
 medicamenta, comparare. Eſt enim hoc vel
 præcipuum Medicæ artis officium, cùm agra-
 tum morbi habere rationem. Et quanquam
 morborum, qui sub ſenſum cadunt, & per ſe
 ipſi, (quemadmodum in alijs rebus colores)
 percipiuntur, facilis ſit perceptio & cognitio,
 facilisq̃ue proinde curatio: eorum tamen, quo-
 rum per media obſervatio fit, vt difficilis iu-
 dicatio, ita per medicamenta curatio eſt. Quin
 etiam agra natura communis & propria (cu-
 ius tanta eſt: quanta ingenorum diuerſitas
 & in temperatione, conformatione, humo-
 risq̃ue dominio verſatur) curationis difficul-
 tatem auget. Ex hijs enim omnibus tandem
 colligendum, intelligendumq̃ue eſt, diætæ,
 vacuationis, alterationisue occaſionem, ven-
 di modum, quantitatem & qualitatem. In
 tanta autem rerum difficultate & confuſione,
 quæ in hac medicinæ parte obuia eſt, quis
 obſecro non animaduertat, cùm Methodo,
 per vniuerſalia, vt vocant, theoremata,
 cùm exercitatione ſeu experientia in parti-
 cularibus

cularibus exemplis, iuxta Galeni doctrinam
 (duobus instrumentis ad cuiusque artis scien-
 tiam comparandam necessarijs) opus esse?
 Οὐδὲν καὶ, inquit Xenophon, ἔτιωσ' εὐχρη-
 σον, ἔτε καλὸν ἀθρώποισι ὥς ἡ τάξις: Et Me-
 thodi ignoratio, inquit Galenus, omnes dissen-
 siones, tum inter Medicos tum inter Philoso-
 phos peperit. Hæc docet, quid primum esse de-
 beat, quid secundum, quid deniq; tertium quar-
 tūmus. Experientia quoq; tanta est necessi-
 tas, ut & ipsa Methodi sine exemplis, neque
 Galeno neq; Aristoteli doceri posse rectè, visæ
 sint: & Plato testatur, arduum esse absq; ex-
 emplis res magnas lucidè ostendere, ut non
 immerito dicendum sit, particulari exercita-
 tione Methodum explicari. Quisquis igitur
 Methodo morbos curare instituerit, eamq;ue
 particularibus exemplis, ut fiat magis perspi-
 cua atq; illustrior, applicuerit: is demum vide-
 bitur, magnum quiddam in re Medica præ-
 stitisse: omnemq;ue eam, quæ in curandis mor-
 bis confusa & sine ordine proponuntur, diffi-
 cultatem, è medio tulisse. Ac tale quid fe-
 cisse videtur, præsentī in libro, noster author,

quisquis fuerit. Methodo utitur perspicua,
 & in opere practico perutili, quam particula-
 ribus exemplis perpulchrè accommodat. Rara
 affert multa, & experimenta non pauca hinc
 inde spargit. In plerisq; enumerat, tum simpli-
 cia, tum composita medicamenta ad singulos
 morbos, & circa finem Capitum ferè subiun-
 git, quæ à totius substantiæ proprietate vel
 colla appensa, vel interius assumpta morbis
 medentur. Destillatos liquores præsertim cõ-
 positos egregios passim præscribit, aliaq; medi-
 camenta multa ingeniosè componit. Collegit
 pleraq; ex antiquorum & probatorum Me-
 dicorum scriptis magno iudicio, quorum pug-
 nantes sententias quandoq; conciliat, raro ab
 eis dissentit. Quamobrem cum ob has ipsas,
 quas modò diximus causas, aliasque multas,
 omnino idoneus sit & dignus, qui à Medicis
 ad vias, profectionesque circumferatur, præ-
 terea etiam viatici instar, propter remediorũ
 quæ continet præstantiam, esse queat, non in-
 commodè fortè Viatici noui (nimirum vt à
 Constantini illius viatico iam olim edito dif-
 ferret) nomen illi est impositum. Quæ quidem
 omnia,

omnia, multaꝫ alia, quæ ne excedam scribendo modum Epistolæ, dedita opera nunc recte, satis declarare possunt, cur hunc librum aliena opera conscriptum, in publicum dederim: ut intelligant nimirum omnes quàm utilitatis publicæ sim cupidus. Cæterum quod hunc librum, vobis potius quàm alijs, viri præstantissimi, dedicauerim, summus meus erga vos, perpetua cum obseruantia coniunctus amor, fecit. Cum enim inde à teneris annis vobiscum vixerim familiariter, vosꝫ ipsi tum temporis atque etiam adhuc, ita multis magnisꝫ beneficijs & officijs prosecuti sitis, ut me totum vobis obligatum, deuinctumꝫ tenéatis: haud committendum putavi, ut nullum omnino vel vestræ erga me beneuolentiæ, vel meæ erga vos gratæ voluntatis monumentum apud posteros extaret. Cumꝫ vos, pro vestra ingenuitate & natura verè nobili, cum omnis liberalis doctrinæ studiosos simul ac doctores, amore maximo complectamini: tum etiam ipsi in liberalium artium & bonarum literarum, in primisꝫ Iuris ciuilis studijs, magnificè liberaliterꝫ educati sitis: arbitratus

E P I S T O L A.

sum nullum vobis offerri potuisse munus, quod
 & dignius & gratius vobis esset. Quamobrem
 illud munus quaecumq; mea erga vos beneuo-
 lentiae atq; obseruantiae signum, vt benignis
 animis suscipiatis, ita mihi persuasi, vt nul-
 lis precibus impetrandum existimem. Illud po-
 tius à vobis vnicè peto & rogo, vt librum i-
 psum, ἀδελφότητος, in fidem tutelamq; vestram
 recipiatis, ita faciliè & omnium odium vitare
 poterit, & inuidiam sustinere. Valete viri
 nobilissimi, & me quod haëtenus fecistis, ama-
 re pergitte: & puppillum hunc, hilari fronte
 vobis adoptate. Tiguri Helueticorum, Ca-
 lendis Augusti, 1565.

V. P. D.

Casparus Vuolphius
 Tigurinus Medicus.

CON-

CONRADVS GESA

NERVS LECTORI REI
Medicæ studio S. LIBRARY.

AVARITIAE affinium vitiorum non v-
num genus est. Sunt qui res bonas, quibus ipsi
nec uti nec frui queant, inuidentiæ ducti non com-
municant alijs, stolidi inuicem; potius quàm auari, et
planè Canes (quod aiunt) ad præsepe. Sunt alij, illi-
berales illi magis quàm auari, qui mechanicorum
& *Βαναύσων* hominum more res utiles celant, ut so-
li ipsi fructum et lucrum inde capiant. His vitij qui
obnoxij non sunt, & quæ bona utiliaq; possidēt, aut
præstare alijs possunt, ea nec inuident cuiquam, nec
celant & premunt, nec in otio sibi alijsq; inutiles et
damnoso versantur, neq; pecunijs aceruandis inhi-
ant: sed homines se esse, ad imaginem Dei condito-
ris factos, & hominibus natos, (hoc est omni homi-
num generi, viuentium & posterorum: non patriæ
solum & amicis, ut veteres philosophi censebant,)
probè meminerunt, illi demum ut veræ pietatis offi-
cio hac in parte fungi, ita non exigua laude digni
mihi videtur. Quibus ego CASPARVM VVOL-
PHIVM etiam, cōciuem meum & collegam neces-
situdine non uulgari mihi deamctum, medicum sa-
nè excellentem, adnumero. Hic enim cum aliquan-
do librum hunc medicinaliū curationum, nunquam
prius editū quod sciamus, mihi ostēdisset: et ego mul-
ta vitæ utilissima eo contineri animaduertērem, et

EPISTOLA.

in publicum hunc ἀνοήτων thesaurum potius quam
 librum, proferret hortatus sum. Is verò pro suo can-
 dore non difficulter mihi morem gessit, nec sordido,
 illo & vetere illiberalitatis prætectu, vti apud me
 voluit: non oportere scilicet, præclara medendi in-
 uenta, quibus multi imperiti abuti possent, in vul-
 gus spargi. Atqui si malorū & imperitorum homi-
 num abusus, à rerum bonarum communicatione de-
 terrere nos deberet: omnia ferè illa quibus vesi-
 mur, alimur, & quouis modo vtimur ac fruimur
 quotidie, occultanda vel è medio tollenda fuerint.
 Quo nomine sanè optimi LECTORES, plurimū
 vos Vuolphio nostro debere, si librum hunc diligen-
 ter euoluere, & quæ in eo traduntur in vsum vitæ
 conuertere volueritis, confessuros libenter non du-
 bito. Quod si feceritis, sicut debetis, candidè: nec re-
 prehenderitis alienam in eo culpam, vt quod alicu-
 bi fortè, quisquis est huius libri author à Galeni pla-
 citis, (vt circa sanguinis detractionem, nondum con-
 firmata aut declinante nimium ætate,) Arabum for-
 tè quorundam doctrinam ac morem secutus, recessse-
 rit: hoc candore vestro eum excitabitis, vt aliquan-
 do me etiam hortante, cætera quæ ad aliorum mor-
 borum ac febrium curationem huic commentario
 deesse videntur, de suis interea assiduis observatio-
 nibus, eadem scribendi methodo ac breuitate,
 addenda explendaq; suscipiat.

VALETE.

AD LECTOREM
AD LECTOREM
ADMONITIO.

CVM Typographus noster, Viaticum illud nouum, de particularium morborum curatione, quod ante annos aliquot, grauissimorum quorundam virorum autoritate atque impulsu, in studiosorum rei medicæ gratiam, nullo certo authoris appposito nomine, edideram, nunc formis chalcographicis suis denuò subijcere constituisset: nolui intermittere, quin te, candide Lector admonerem, hunc eundem librum, paucis quibusdam mutatis sub clarissimi viri Iacobi Hollerij nomine, eodem tempore, Parhisijs editum atque excusum esse. Quod vtrum eius, an alterius sit, cum mea non intersit, non etiam magnopere laboro: facile tamen eorum iudicio, qui id ita esse affirmant, acquiesco. Ego verò, vt ingenuè, quod res est, fatear, cum à Dionysio exemplar meum esset, ac proinde cuius nam esset ignorarem, nolui editione mea priore vel nomine ficto, cuiquam fucam facere, vel arroganter, qui alterius erant labores, pro meis venditare: hoc enim, vt indecorum & homine ingenuo indignum, ita illud iniurium omnino extitisset. Quamobrem, id quod boni viri officium erat, eum libro titulum præfixi, qui & ipsi authori, quisquis tandem ille esset, nihil penitus de-

A D M O N I T I O.

traheret, & libro ipsi gratiam atq; fauorem conciliaret. Itaque si ad Hollerium, virum doctissimum, referre eum placeat: æquum est, pios Hollerij manes favore & laude prosequi, quod suis hisce operosis vigilijs, arduisq; laboribus, eruditiores quam plurimos reddiderit, posterisq; tam paratum bene medendi thesaurum reliquerit. Sed ipsi insuper libro quoque gratulandum, quod hoc tam celebri parète prognatus, hominum tuendis commodis illustrior, plausibilior, graviorq; appareat. Quod verò etiamnum operis titulum non mutarim, id eo consilio à me factum est, vt is ipse me, meamq; famam & existimationem, à maleuolorum atq; obtrektorũ iniurijs atq; morsibus, quibus fidem meam quasi mihi ipsi tribuerim, labefactare sunt conati, defēdat vindicetq;. Itaq; candide lector, hunc Hollerij, vti perhibent, doctissimum librum, ab infinitis, quibus scatebat mendis perpurgatum, nunc denuò à Typographo, in vsum atque vtilitatem tuam æditum, beneuolo gratoq; animo suscipe. Vale.

AVTHORES QUI IN
boc libro citantur.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Aetius. | Hippocrates. |
| Aegineta. | Herophilus. |
| Aelianus. | Mefue. |
| Auicenna. | Oribafius. |
| Aurelianus. | Orpheus. |
| Albucafis. | Octavius. |
| Asclepiades. | Porphyrus. |
| Archelaus. | Rafis. |
| Arabes aliij. | Solinus. |
| Celfus. | Symachus. |
| Diocles. | Scribonius. |
| Didymus. | Soranus. |
| Galenus. | Trallianus. |

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
JOHN HUTCHINGS
OF THE BOSTON BAR
IN TWO VOLUMES
VOL. I.
BOSTON: PRINTED BY
J. B. ALLEN, 1827.

VIATICVM NOVVM DE OM- NIVM FERE PARTICV- *larium morborum cu ratione.*

DE DOLORE CAPITIS.

Caput I.

GALENVS secundo *ratio totius*, ex
causarum efficientium varietate;
ex partium laborantium natura,
ex qualitate propria, dolores capi-
tis distinguit. *Causæ*: intemperies, copia vel *Causæ.*
humorum vel vaporum, qualitas eorundem,
ac denique obstructio. Partes laborantes: to-
tum caput aut pars capitis, perioſteon, menyn *Partes affe-*
ges, & reliquæ partes capitis interiores. *stæ.* Qua-
litas propria: quia dolor vel grauis est, vel ro- *Qualitas*
dit, aut pulsat, aut distendit. *doloris.*

Curatio coloris capitis his perficitur. Phle *Curatio.*
botomia, arteriotomia, sanguisugis, cucurbi-
tulis, purgationibus, potionibus, & medica-
mentis naturam præparantibus, topicis re-
pellentibus, concoquentibus, mitigantibus,
alterantibus, digerentibus, roborantibus, phos-

DE DOLORE CAPITIS.

nigmis, sinapismis, cauterijs, paracentesi.

*Venz se-
cio.*

Phlebotomia imperatur si plenitudo & copia sanguinis, si vehemens obstructio est, si vultus, casus, concussio, febris, inflammatio, atque adeò ubi intolerabilis est dolor. Si à reliquo corpore vitium est, primum Axillarem, deinde Cæphalicam, aut semel mediam tundito. Si à suppressis menstruis, aut hæmorrhoidibus, venas malleoli incidito. Perseuerante malo, venam frontis, temporum; quæque post aures sita est, aperito: quin & venis sub lingua sectis, dolorem capitis mitigatum animaduertimus. Eam tamen eligito semper, in cuius regionem dolor incumbit magis.

*Arteriarum
sectio.*

Arteriotomia probatur in his, qui ob intemperiem arteriarum capite dolent ac vertigine, atque ubi calidus sanguis & vaporosus dolorem facit, eligenda in fronte, temporibus, aut post aures, quæ micat magis, calet & rubet, & ubi dolor acerbior est. Modum secandi arterias, docet Aegineta perspicuè libro vj. cap. iij.

Sanguisugæ.

Vacuato iam corpore & contumaci malo, sanguisugæ extremo naso affiguntur, post aures, & venis quæ in caluaria eminent. Aliquando his, qui ita assueti & multi sanguinis sunt, post maiora remedia sanguinem è naribus irritamus.

Cucur.

DE DOLORE CAPITIS. 2

Cucurbitulæ primū leues occipitiō vel cer- Cucurbitulæ.
uicis initio aſcuntur & ad partes inferiores
trahuntur, deinde verō cum ſcarificatione.

Post phlebotomiam & ante, purgamus, & Purgatio.
aliquando ſine phlebotomia. Ante phleboto-
miam leui pharmaco, cuius vis hepar non ſu-
peret, ſed tantum venter, meſenteriū, ſima he-
patis & inteſtina repurgentur, quale hoc erit.

R̄ caſiæ aut catholici ʒ j. aut caſiæ ʒ ſ. qua
drante horę ante paſtum. Poſt phlebotomiam
ſi quis humor vitioſus in corpore relictus eſt,
& ſiquidem recens dolor eſt, materia ſequax,
ſubtilis, & tenuis, nulla quoque obſtructio eſt,
leui pharmaco vteris, vt Caſia, rhabarbaro,
manna, catholico, in mollioribus & diuitibus.
Electuario de ſucco roſarum, diaprunis, hieræ
puluere, catholico, in alijs corporibus. Velut
exempli gr̄atia.

R̄ decoctionis prunorum, tamarindorum,
paſſularum, trium florum cordialium quantū
ſatis ſit ad diſſolutionem ʒ ij. mannæ. Aliud.

R̄ caſiæ fiſtulæ ʒ ſ. manniæ ʒ j. diſſoluan-
tur in ſupra dicta decoctione, vel ſero lactis, a-
quā hordei, ptifana. Non diuitibus loco man-
niæ penidia imperabis, vel catholici ʒ vj. Caſ-
iæ fiſtulæ ʒ ſ. aut catholici vel caſiæ ʒ vj. dia-
prunis ʒ ij. Ex his omnibus cum ſaccharo ſit
bolus, aut vt ſupra dictū eſt diſſoluuntur. Rha

DE DOLORE CAPITIS.

barbarum aliquando per se, aliquando cū cassia imperabitur. Pueris ꝓ ij. infunduntur in aqua endiuix cū modico cinnamomi. Mulieribus ad ʒ j. s. viris ad ʒ iij. Mollioribus & quibus aluus facilè cōmouetur ʒ iij. cassiæ, & ꝓ ij. rheubarbari satis esse possunt, ex his fit bolus cum saccharo. Alijs cassiæ fistulæ ʒvj. addimus ꝓ liij. rhabarbari. Pulvere hieræ sic vtendum erit.

Bolus.

Hieræ picræ usus.

℞ pulueris hieræ picræ recentis ʒij. excipiatur modica conferua violarum. Aut hæ pilulæ fortiores erunt.

Pilulæ.

℞ pulueris aloes ʒj. masticis, cinnamomi ana ꝓ s, diagridij grana iij. cum succo citri fiant pilulæ.

Potiones digestiux.

In crassis humoribus & viscidis, magnis quoq; obstructionibus, grauior ferè atq; contumacior morbus est, in quibus & phlebotomia, si cætera consentiant, necessaria est, & portiones quæ materiam incidant, attenuent & à quibus purgationes per interualla, validique clysteres, topica ex ijs quæ incidunt, & attenuant, errhina, apophlegmatismi, suffumigia, diamassemata, frictiones, vincula, cucurbitulæ, sinapismi, setonia, paracentesis, ferrū, ignis. phlebotomia vt prius instituenda satis amplo vulnere. Oxy mellite aut alijs descriptis materijs præparabitur, aut hac potione.

℞ Itæ.

℞ stœchados citrinæ ℥ij. fiat decoctio in Syrupus.
 aqua purissima ad quartaria tria, in expressio-
 ne colata dissolue mellis communis, vel mel-
 lis albi, vel sacchari albisissimi. †℥. s. plus minús-
 ue, & fiat syrupus, vtatur ieiunus & duabus
 horis ante cœnam, dosi ℥ iij. Hæc potio putre-
 dinem arcet, extenuat, deterget, roborat, non
 solum cerebrum, sed viscera omnia & corpus,
 laudata Græcis & Arabibus. A qua vsus esse
 potest syrupi de stœchade incompleti, hoc
 est, sine aromatibus seu speciebus: atque
 hinc syrupi completi, hoc est cum speciebus.
 Eodem modo ex açoro & radice fœniculi oxy-
 mel, atque hinc hydromel parari potest. Cali-
 diores syrupi suspecti sunt, vbi plethora, febris,
 cruditas in primis venis. Hinc enim augentur
 febres, liquefacta cruditas trahitur in corpus:
 fusa plenitudo, apoplexias, febres, tabes, & alia
 mala inuehit.

Purgationes ex hiera diacolocynthidos, Purgatio-
 agarico & alijs, quale hoc sequens est. nes.

℞ pulueris hieræ diacolocynthidos ʒ. s. Pilulæ.
 agarici trochiscati ʒ ij. masticis, bdellij ana ʒ
 s, nucis moscatæ gr. viij. cum succo absinthij,
 formentur pilulæ. Delicioribus naturis po-
 terunt incorporari pulueres in modico con-
 seruæ anthos. Solent autem parare syropos Apozema.
 quibus per interualla vtendum sit, quos ita

DE DOLORE CAPITIS.

conficies, vt in decocto describantur quæ attenuent, cōcoquant, aperiant, roborent & conuenienter purgent: quale hoc est.

℞ radice graminis, petroselini, asparagi ana ℥ s. seminis anisi & fœniculi ana ℥ j. betonicæ, stœchados ana p. ij. florum cordialium ana p. j. passularum mundatarum ℥ j. s. liquiritiæ ℥ ij. polypodij quercini ℥ s. agarici trochiscati ℥ vj. foliorum senæ mundatorum & in fine decoctionis positorum ℥ ij. s. fiat decoctio in aqua purissima ad quartaria tria, in colatura dissolue sacchari albissimi quartaria tria, fiat syrupus mediocriter coctus, vtatur singulis hebdomadibus ℥ j. s. cum ℥ ij. hydromelitis aut ptisanæ: æstate potius ptisana, hyeme hydromeli. Aliud fortius.

℞ polypodij quercini, radice acori, ireos, seminis carthami ana ℥ j. s. seminis anisi, fœniculi, cuscutæ ana ℥ ij. sebesten, ceterach, scolopendrij, betonicæ, sumitatum lupuli, agrimonie ana p. j. stœchados Arabicæ & citrinæ ana p. s. foliorum senæ purgatorum in fine decoctionis positorum ℥ iij. agarici recenter trochiscati ℥ j. s. turbith gummosi ℥ j. fiat decoctio ad ℥ b. j. in colatura dissolue sacchari albissimi & mellis albi benè depurati ana ℥ b. s. fiat syrupus coctus secundum artem, accipiat ℥ ij. cum hydromelitis aut ptisanæ ℥ ij. semel in duobus.

in duodecim diebus. Pilulæ.

℞ agarici recenter trochiscati ʒ ij. turbith Pilulæ.
 ʒ j. s. salis gemmæ & zinziberis ana ʒ j. infun-
 de omnia in vino albo, fiat leuis feruor, super
 calidos cineres, deinde fortis expressio, expres-
 sæ materiæ adde pulueris hieræ diacolocyn-
 thidos ʒ iij. pulueris hieræ picræ ʒ iij. mala-
 xentur cum vino expressionis, fiat massa, ca-
 piat ʒ j.

Post purgationes imperare solêt, quæ ven- Roboran-
 triculum & viscera roborant: quale hoc est. tia.

℞ mithridatici veteris, conseruæ, buglossæ
 & acori ana ʒ j. capiat mane. Aliud.

℞ specierum electuarij diambrae ʒ j. pliri-
 sarticon & aromatici rosati ana ʒ s. excipian-
 tur modico conseruæ anthos, vel syrupi de cor-
 tibus citri, aut de stœchade fiat trochiscus.

Repellentibus statim initio vtendum est, Repellentia.
 sed in dolore calido magis refrigerantibus, vt
 & in corporibus durioribus, æstare, regione
 calidiore, iuuentute. Contra vero temperan-
 da res est contraria conditione: quale hoc est,
 quòd vehementer repellit & refrigerat.

℞ olei rosati recentis ʒ ij. aceti albi & aquæ Primo
 rosarum ana ʒ ij. agitentur diu & refrigerêtur ordo.
 in aqua frigidissima aut niue. Pro frontali,

℞ olei rosacei & violacei ana ʒ j. aceti albi, Frontales
 succi agrestis ana ʒ ij. misce: diuitibus adde cæ-

DE DOLORE CAPITIS

phoræ gr. iiij. linteolum immersum posca frigida, hoc est, mixtura aquæ & aceti, vel in succis semperuiui, centinodiæ, portulacæ, lactucæ, psyllij, rosarum, malorum granatorum, capreolorum vitis, omphacis, mespili, cucurbitæ, cucumeris, parabilia remedia sunt. Oportet autem hæc remedia subinde renouari, quia statim incalescunt. Secundus ordo.

Secundus
ordo.

Rz ceroti Galeni diu subacti cum succo portulacæ aut simili ꝑ ij. inungatur fronti & superponantur folia salicis. Aliud.

Rz mucilaginis seminis psyllij, & seminum althææ & cydoneorum ana ꝑ vj. agitentur cum modico aceti. Aliud.

Rz olei rosati & chamæmelini ana ꝑ j. acetum ꝑ iiij. hyeme, pueris, eunuchis, & mulieribus conuenit, in quibus nimia refrigeratio periculosa est. Iam progressio morbo.

Tertius
ordo.

Rz olei chamæmelini, anethini, de lilijs aliquid adiiciendum est: in frigido dolore. Sed in calido.

Rz vnguenti dialthææ ꝑ j. agitetur in mortario, primum quidem cum oleo rosaceo, deinde vt procedit morbus, cum oleo de mastice, de cydonijs, de spica. Diuitibus addi possunt grana duo moschi. Olea conueniunt, chamæmelinum, anethinum, de lilijs, laurinum, mastichinum, de spica, de costo in quo serpillum,

DE DOLORE CAPITIS. 5

lum, menta, thymus, origanum, rosmarinum, maiorana, calendula, pulegium, behen, nuxmoschata, caryophylli, cinnamomum coxerint. Veluti.

R^x serpilli Mj. coquantur in quartarijs tribus olei chamæmelini, & ℥ss. f. vini rubri, fiat decoctio ad consumptionem vini in vase duplici, deinde fortis expressio, seruetur oleum ad vsum. Aliud.

R^x caryophyllorum, nucis moscatæ ana ℥ss. fiat decoctio in quartarijs tribus olei chamæmelini & vini rubri ℥iij. ad consumptionem vini vt prius. Aliud.

R^x terebinthinæ ℥ss. j. masticeis, cinnamomi, Oleum stillo-
latitium. nucis moscatæ ana ℥j. caryophyllorum, galangæ, zedoariæ, ladani ana ℥j. f. succi ebulli, succi cucumeris asinini ana ℥j. puluerizatis puluerizandis, omnia misceantur in alembico, destilletur oleum secundum artem. Laudant & oleum zambachinum, id est, iasminū. Nec òmittendum est remedium mulieris apud Paulum. Radices itaque cucumeris asinini concides in taleolas, & cum absinthij coma hydrelæo incoques, fouebis patrem hydrelæo, materiam verò emplastri modo impones.

Iam diuturniore & contumaciore morbo, caput tondeatur aut radatur ad cutem, tum Rubi-
cantia.

DE DOLORE CAPITIS.

fortioribus vtemur, quale est oleum de castoreo, de euphorbio, quod cōfici oportet ex ℥. olei de cheiri & ʒ s. euphorbij vel castorei. Quale hoc erit.

℞ olei de cheiri ℥. s. cere ʒ j. s. liquefiant in vase duplici, deinde insperge, euphorbij ʒ ij plus minúsue. Oppugnandus quoque est morbus masticatorijs, apophlegmatismis, caputpurgijs, pomis adoratis, sacculis vel cucuphis. Masticatorium.

*Masticato-
ria.*

℞ masticis ʒ ij. piperis ʒ. j. radicis cappasum ʒ s. cum aceto scillitico formentur tres pilulæ, teneat in ore & mandet. Idem facit.

℞ staphisagriæ puluerizatæ, condisi ana ʒ ij. recipiantur melle, teneantur in ore.

℞ pirethri, staphisagriæ ana ʒ ij. liquiritiæ ʒ j. masticis ʒ. j. fiant pilulæ. Apophleg.

*Apophleg-
matismus.*

℞ sinapi ʒ s. hyssopi p. ij. fiat decoctio in vino rubro cum modico melle fiat gargarismus.

Erhinum.

Erhinnum vel caputpurgium fit ex succo vel aqua maioranæ, betæ, anagalidis, cucumeris agrestis, adiecto pipere, castoreo, euphorbio, elaterio, helleboro, condiso, gallia moscata, pyrethro, pane porcino, sinapi, mosco. Succi itaque tepidi & excepti vola manus naribus attrahuntur: pulueres insufflantur in nares, aut alicui oleo immixti illinuntur, vt oleo de costo

costo, de spica, irino & similibus. Delicatis additur modicum mosci aut ambræ, quale hoc est.

R^z succi maioranæ ʒ ij. succi betæ ʒ j. acetici scillitici ʒ s. misce fiat caputpurgium, attrahat tepidum naribus. Aliud.

R^z piperis, castorei ana ʒ j. ellebori, galliæ moscatæ ana ʒ s. fiat pulvis, modicum insuffletur in nares. Aliud.

R^z olei de spica ʒ j. elaterij ʒ j. diuitibus ad de mosci gra. ij. illinantur nares interiores. Pomum,

R^z cinnamomi, caryophyllorū, nucis moscatæ, ligni aloes pulueris maioranæ ana ʒ ij. galliæ moscatæ ʒ j. mosci, ambræ ana gra. ij. fiat omnium pulvis. Deinde cum ladano & mastice agitatis in mortario cum modico oleo de spica, de costo, de behen fiat pomum. Cucupha.

R^z seminis cumini & fœniculi, baccarum lauri ana ʒ ij. nucis moscatæ, cinnamomi, caryophyllorum ana ʒ j. galliæ moscatæ, mastiches, sandaracæ ana ʒ ij. fiat pulvis omnium pro cucupha facta cum rasura scarlatæ.

Extrema remedia sunt raso capillo, sinapismi, dropaces, phœnigmi, cauteria, paracenteses, de quibus alio loco.

DE VERTIGINE

DE VERTIGINE

Caput II.

Signa.



in Græcis, vertigo Latinis cum caput circumagi videtur: *Συρόδιον* cum tenebræ etiam oculis offunduntur: aut

spectra rubentia, quæ denunciant maniam: aut rubore saturata, quæ epilepsiam. Ex inordinato autem motu spirituum vel flatuum

Causæ.

hæc omnia gignuntur. Aliquando in capite, aliquando ex inferioribus partibus corporis eiusmodi spiritus efferuntur, quod his ferè contingit, qui cruditates colligunt, quibus hepar calidius est, quibus ex hepate in ventrem regurgitat bilis, quibus arteriosum genus intemperatum est, plenum feruido & spirituofo sanguine.

Cura:

Si in capite primum generatur malum, iisdem remedijs vtitor pro varietate materiæ, quæ in dolore capitis descripta sunt.

Si ab arterijs, arteriæ post aures conuenienter secantur.

Si à cruditate, ea concoquatur, & temperantior vita instituat.

Si à regurgitante bile, hæc pilulæ singulis hebdomadibus deuorentur.

Pilulæ.

R^z hieræ picræ, rhabarbari electi, agarici trochiscati ana gra. vij. cum syrupo rosato fiant pilulæ nouem, pro tribus dosibus per ho-

ram

ram ante cœnam. Alijs diebus vtatur.

℞ specierum aromatici rosati, specierum Electuariũ.
diatriumſantalorum ana ʒ ſ. ſacchari rosati
quantum ſufficit, cum ſyrupo rosato fiat ele-
ctuarium. Aliud.

℞ conſeruæ borraginis, bugloſſæ ana ʒ
vj. pulueris diamoſchi dulcis & de pomis ana
ʒ ij. ſ. electuarium regum ʒ j. ſ. behen albi &
rubri, baſilici ana ʒ ſ. ſyrupi de pomis quan-
tum ſufficit, fiat electuarium molle. Vtile eſt
etiam & ſæpius expertum in ſimili caſu, præ-
fertim vbi vitium in capite eſt, vti ſequenti de
coctione.

℞ veronicæ, euphragiæ, origani, centau- Decoctum.
rij minoris ana M. j. mentæ, roſmarini,
ſaluæ ana M. ſ. ſeminis aniſi, carui, ſœniculi
ana ʒ ij. galangæ, zinziberis ana ʒ j. ſ. pruno-
rum damaſcenorum nu. xv. coquantur in ſuf-
ficienſi quantitate aquæ ad ʒ ix. deinde cola
& aromatiza cum cinnamomo, colaturæ ad-
de ſyrupi de ſtœchade, oxymellis ſimplicis ana
ʒ j. ſ. fiant doſes tres. Quarto die ſumendę ſunt
pilulæ.

℞ pilularum cochiarum, aurearum ana Pilulæ.
ʒ ſ. ſpecierum hieræ picræ ʒ ſ. miſce & cum
ſyrupo de ſtœchade fiant pilulæ nouem. Fri-
ctiones vtilis ſunt, & alia quæ capite de dolo-
re capitis dicta ſunt.

DE PHRENITIDE

DE PHRENITIDE

Caput III.

Curatio.
Venæ sectio

Phreniticos ita curabis. Viribus integris sanguinem detrahēs ē cēphalica angustō foramine, vt vulnus celeritūs coalescat, quod etiā fideliter ligabis, aut pice obduces, ne temeritate phrenitici dissoluatur, & ita erumpat sanguis. Obseruandum tēpus quo minus furere videatur. Ministris quoque opus est, qui phreniticū contineant, alioquin periculum est, ne agitatione corporis vena phlebotomum eludat, aut amplior adhibeatur plaga, vel locus turpiter laceretur. Detrahatur pro viribus, vitato animi deliquio Paulus in his qui initium corpus agitant, venam in fronte: alij venam nasi: Diocles venam sub lingua, diuidūt. Sunt qui auriculas scarificent. Sed hæc omnia non nisi progressio morbo & vacuato corpore tempestiua sunt.

Aër qualis
conueniat.

De aere vbi collocentur iam olim disputatum est. Antiqui ferē tales ægrotos in tenebris habebāt, cū quia in luce spiritus agitati, furorē exasperarent, tum tenebras quoque ad somnum & quietem conducere putabant. Asclepiades phreniticos in lumine habendos dixit, quia tenebræ terreant, & lucido loco sensus magis occupantur, & interim mens quiescit. In tenebris contra quētis sensibus mens altis

altis cogitationibus & visis sese exagitat. Sed hoc ferè Græcis & Latinis perplacuit. Qui luce offenditur, habeatur in tenebris aut medio eri luce collocetur: Quem tenebræ lædunt, in luce collocato: Qui vtroque pariter offenduntur, mediocri luce habeantur, & si vires valeant, lucido magis: si infirmæ, magis tenebroso iuuantur. Hæc & alia plura apud Celsum & Aurelium in acutis,

Fuit & alia controuersia de tondendis phreniticiis. Asclepiades radi noluit, nec etiã tondere, quia videlicet raso capillo aut detonso copiosior materia in caput attollitur, vnde capilli fruticant magis, & seges detonsa vberius provenit. Itaque cum oporteat materiam à capite reuolui, non in caput attrahi, non erunt tondendi. Hoc verò reliquis omnibus Medicis placuit. Tondendi phrenitici, radendi etiam nisi prohibeat frigus, remissionis tempore, longius à cibo. Sic enim remedia commodius adhibentur, caput leuatur onere & fumi facilius digeruntur.

An caput
radendum.

Missio sanguine, molliusculis clysteribus utemur, interim etiam acriusculis, & maximè si phlebotomia omissa est, qualis hic erit.

Clyster.

R̄ decoctionis fursurū ℥.j. in qua dissolue catholici ʒvj. sacchari rubri, mellis rosati colati ana ʒj. olei violati ʒiij. sal. cōmunis ʒij misce.

DE PHRENITIDE

Purgatio. Imperandæ etiam purgationes leues, quales descriptæ sunt in dolore cholérico, aut tales.

Potio. R^z succi granatorum acidorum & dulcium ana ʒ j. s. sacchari in aqua endiuivæ dissoluti ʒ j. misce & fiat potus. Vel.

R^z Succi rosarum ʒ ij. sacchari similiter dissoluti ʒ v j. leuiter ferueant in calidis cineribus. Opulentos adhibitis ministris continebis, aut etiam vinculis colligabis vt pauperes.

Vincula. Vincula enim vtilia sunt, quia motum retinēt & materiam à capite reuellunt.

Topica refrigeranda. Topica. Vitandus assiduus refrigerantium vsus ne in lethargum mutetur morbus. Deinde quia constringunt poros ex quò sumi in capite retinentur. Licebit vti ijs, quæ in capitis calido dolore descripta sunt. Primum quidem repellentibus, deinde ijs admiscendum erit chamæmelinum oleum. In declinatione etiam vti licet oleo in quo serpillum & alia huiusmodi coxerint.

Somni conciliatio. Vt concilietur somnus hordeata parentur ex aqua decoctionis quatuor seminum frigidorum. Perfundatur caput & facies, abluantur pedes & manus: excipiatür quoque vapor hoc modo.

Lotio pedum & faciei. R^z violarum, hordei excorticati, capitum papaueris albi, radicum mandragoræ ana M. j. fiat de-

fiat decoctio in aqua purissima, vbi refrixerit, facies ægri inde abluatur, & pedes quoq;. Deinde sponsia submersa in decocto subinde naribus admoueat.

Iuscula cum capite vno papaueris albi coquantur, sæpe etiam lactuca alterentur. Vel hoc nodulo. Iuscula.

℞ quatuor seminum frigidorum maiorū, papaueris albi ana 3 s. fiat nodulus, qui imponatur iusculis. Utatur cichorio & lactuca elixis & modico saccharo violato conspersis. Sua uiter quoq; somnum inducit post pedum lotiones, & alia supra dicta, sequens clyster. Nodulus.

℞ herbæ matris violarum, lactucæ, parietariæ, foliorum salicis, mercurialis ana M. j. florum nenupharis M. j. seminis lactucæ, endiuie ana 3 iij. prunorum nu. xij. coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad medias, colaturæ sumatur ℥ss. j. confectionis hamech 3 s. diacassie, sacchari rubri ana 3 j. olei nenupharini & violacei ana 3 j. s. vitellum oui vnius. fiat enema. Frontalia. Clyster.

℞ olei rosarum 3 j. aceti 3 ij. vnguenti populeonis 3 iij. misce pro frontali. Oleum in quo viua torpedo extincta sit, ac deinde coxerit, in quo etiam coxerit lactuca, folia aut capita papaueris recentis, oleum violatum, de nenuphare, de papauere, de mandragora, de cucurbita, Quale hoc est. Frontalia.

DE PHRENITIDE.

Rolei demandragora \mathfrak{z} j. vnguēti populeo
nis \mathfrak{z} s. aceti \mathfrak{z} ij. simul agitentur & misceantur
pro frontali. Aliud fortius.

Capiti im-
ponenda.

Re opij, croci, ana \mathfrak{z} j. distemperentur in vi
ni albi & aquæ rosaceæ ana \mathfrak{z} j. cum linteolo
in eo madefacto fiat frontale. Somnum etiam
conciliat, & phreniticorum feruorem mitigat,
stuppa canabina in aceto tepido cum albumi-
ne oui diu agitato & oleo nenupharino infu-
sa, & capiti imposita. Aut si hoc parum profi-
ciat, superponatur capiti catulus paruus, qui
adhuc lactet, per medium dorsum dissectus,
remotis intestinis: aut gallus gallinaceus simi-
liter dissectus & superpositus: aut denique pe-
coris siue arietis iam iam mactati adhuc ca-
lens pulmo.

Conciliato somno & expergefacto ægro fa-
cies abluatur cum decocto chamæmeli, ante-
thi. Non vtendum somniferis quæ intro su-
muntur, nisi vires valeant, alioqui horum vsu
languidus calor extinguitur. Porro si quæ ex-
terius adhibentur, nihil proficiunt, dentur se-
quentia.

Syrupus ad
somnum.

Re syrupi de nenuphare, de papauere añã
 \mathfrak{z} vj. decoctionis lactucæ \mathfrak{z} ij. fiat potus, detur
hora somni. Aut.

Decoctio
ad somnũ.

Re lactucarum p. j. dactylos nu. tres, caput
vnum papaueris albi, fiat decoctio ad \mathfrak{z} iij. in
quibus

quibus dissolue syrupi rosarum ʒj. s. misce, de-
tur hora somni. Aut.

R̄ rosarum, violarum, absinthij, ana ʒ s. o-
pij, gra. j. simul mixta leuiter bulliant, colatura
cum ʒ ij. iusculi pulli sorbeatur. Nimum so-
pitos ita excitabis.

R̄ succi radicis fœniculi ʒ ij. s. aceri albi in Sopiti quib-
quo nux moscata coxerit ʒ j. s. cum spongia ex bus exci-
aqua hyssopi expressa, & rursus madefacta in tandi.
supra dicto succo fiat applicatio ad nares. In
eundem vsum pulegium aut hyssopus teritur
ex aceto & naribus admouetur.

In declinatione morbi remanente virium Restaura-
totius corporis imbecillitate, & præcipuè cor- tio uiriâ.
dis sequenti electuario confortari potest.

R̄ conseruæ rosarum, nenupharis, buglossæ
ana ʒ iij. pulueris diamargariti frigidi ʒ j. co-
ralli rubri ʒ s. seminis pæoniæ ʒ ij. seminis pör-
tulacæ, acetosæ, endiuicæ ana ʒ j. auri foliati ʒ s.
quod etsi nimium videatur, temere tamen nō
mutaui, sacchari quantum sufficit, fiat ele-
ctuarium auro coopertum, de quo utatur sepe
cum potu suo, aut etiam sine potu cum volet.

DE APOPLEXIA

Caput IIII.

A Poplecticum hoc modo curabis: Homi Curatio.
nem agitato, concutito, fricato, saepe e-

D E A P O P L E X I A.

nim similes apoplecticis concidunt ex leui ob-
structione, quæ agitatione corporis discutitur.
Ea obstructio à crassis vaporibus esse potest,
vel quia pauca ea materia est quæ obstruit. Si-
miles quoque apoplecticis sunt, qui apoplecti-
ci & cataleptici verius dicentur, ex plenitudi-
ne totius corporis vel capitis, vnde viæ spiri-
tales intercipiuntur. Quibus vena brachij in-
terna quidem, si totius corporis plenitudo est:
cæphalica, si tantum capitis, statim aperienda
est. Hoc enim remedium sæpe satis est. Eius-
modi est historia apud Aetium capitè de Ca-
talepsi. Iuuenis quidam multi sanguinis, dere-
pente mutus factus est, tres dies integros ita ia-
cuit, quartò die multo profluvio sanguinis li-
beratus est, ἀπαίαν Græci vocant.

Cataleptis.

Venæ se-
ctio.

Historia.

Apoplexia

In apoplexia, quam frigidus & crassus hu-
mor excitat, priuatione motus & sensus, ac pro-
pè extincta rectrice anima, hominem loco lu-
cido & tepido collocato, ac corpus vehemen-
tius concutito, tum multa frictio conuenit, vn-
ctio ex oleo calente, & maximè earum partiū
quæ magis refrixerint.

Venæ se-
ctio.

In phlebotomia quæ vel hominem liberat
vel occidit, ita te gerito. Si nihil repugnat, præ-
parato prius corpore & in tempore venam cæ-
phalicam incidito: parum detrahito. Post ali-
quot horas si perseverat malum, alteram cæ-
phalicam

phalicam vulnerato, nec ita multum sanguinem detrahito. Hæc vero repugnant, quod aliquando immodica venere aut alia quavis spirituum inanitione virtus corporis exhausta est. Hic scarificatione, cucurbitulis, sanguisugis toto corpore fixis contentus esto: quemadmodum etiam in obæsis, corporibus mollioribus & debilioribus, in quibus venæ vel nō apparent vel non ferunt phlebotomiam. Preparatur corpus subducto prius ventre, totius corporis fotu ex oleo chamæmelino calido, anethino aut simili: aspera frictione, concussione corporis & ambulatione, vt sanguis crassior & frigore gelatus recalescat, attenuetur & melius effluat. Oportetq; iustum vulnus infligere, alioquin subsistit sanguis: quanquam nō vniuersim, sed interuallis detrahendus sanguis est. Occasio est in remissione, aut quo tempore non ingrauescit malum. Remissio intelligitur liberiore, quàm antea, spiratione, pulsu meliore, & vbi partis alicuius torpor cepit egeldari: alioqui si, quod sæpe fit, aliter venam aperias, aut ægrum præcipitabis, aut nihil iuuabis exitu materiæ negato.

Corporis
ad phlebo-
tomiam præ-
paratio.

A phlebotomia spes salutis est, si pulsus, respirationis, faciei color, partium frigus, mens, motus, sensus, omnia aut ex his aliqua in melius conuertantur: alioqui si accreuerit malum ex

Prognost.
con.

DE APOPLEXIA.

altera cæphalica iteranda sectio est. Quod si na-
tunc quidem proficitur, desperatur æger.

Secta vena, quiescat æger, atq; interim sto-
macho & visceribus reliquis consulamus.

*Stomachi
corrobo-
ratio.*

Stomacho quidem hoc modo. R^x olei de
spica ꝑ iij. masticeis ꝑ j. liquefiant in vase dupli-
ci & cum cyperi, macis, cinnamomi ana ꝑ ij. co-
ralli rubri ꝑ j. misceantur, cum flocco rasuræ
scarlatæ aut cotone applicetur calidum. Potest
etiam aliquid syrupi rosarum deuorari.

*Viscerum
corrobo-
ratio.
Porus.*

Visceribus vero, vt hepati & lien. R^x su-
mitatis absinthij. Mj. seminis carui, cumini,
ana ꝑ s. fiat decoctio in oleo & vino singulo-
rum quantum satis est, inde foueatur regio he-
patis & lienis. Post hæc clyster acris iniicien-
dus est ex decocti capitalis ꝑ l. j. adiectis semi-
nibus carui, cumini, baccarum lauri ana ꝑ s. de
inde in decoctione dissoluatur pulvis hieræ pi-
cre, et diacolocynthidos ana ꝑ iij. olei anethini
ꝑ iij. misce fiat clyster. Sæpe autem fit vt resi-
stat clyster, aut per os euomatur, tum inde ano
hoc suppositorium.

Clyster.

*Supposito-
rium.*

R^x pulueris hieræ diacolocynthidos ꝑ ij. ca-
storei, seminis carui & rutæ ana ꝑ ij. salis gem-
me ꝑ j. cum melle quantum sufficit, fiat sup-
positorium benè longum. Quod si nec hoc mo-
do, alius quicquam reddit, cucurbitulis uten-
dum est: ex libro de cucurbitulis. Reddito cly-
stere

stere aliquantisper quiescat æger : postea vero exhibeatur in potu.

R̄ pulueris hieræ diacolocynthidos ʒ ij. **Potio ori**
theriacæ veteris ʒ j. dissolue in aqua vitæ & ca- **infundēda.**
lendulæ ana ʒ j. cum cochleari aut syphone in
fundatur in gulam.

Interim quoque vtendum est remedijs quæ **Quæ excl-**
apoplecticum excitant. Oleum vitrioli pluri- **tant apople-**
mum commendatur: quod si deest, dissoluan- **cticum.**
rur ʒ ij. vitrioli in ʒ j. olei de spica, de co-
sto, de castoreo, de scylla aut simili, ad hunc
modum.

R̄ scyllæ concisæ in taleolas ʒ ij. castorei **Oleum.**
ʒ s. vitrioli ʒ iij. fiat decoctio in olei anethini
& vini ana ʒ ss. ad consumptionem vini. Il-
linantur nares & palatum hoc oleo. Sunt au-
tem & alia quæ apud Græcos & Arabes inue-
nies. Alia potio.

R̄ castorei ʒ iiij. masticeis, seminis rutæ, san- **Potio.**
tali citrini, nucis moschatæ ana ʒ s. ponantur
in manica Hippocratis. Cum ijs coletur qua-
ter aquæ vitæ & calendulæ ana ʒ j. s. infunda-
tur in gulam. Alia.

R̄ conseruæ iris, acori ana ʒ ss. diu agitentur
in mortario ex aqua saluiæ ʒ ij. fiat fortis ex-
pressio cum supra dicta aqua vitæ fiat potus.

Suffumigium. R̄ capillorum hominis mi-
nutim concisorum ʒ s. castorei ʒ ij. telleborei **Suffumigiū**

DE APOPLEXIA.

℞ j. incorporentur cum opopanace fiat suffumigium. Caput purgijs fortioribus, illinitio-
nibus palati ex pulueribus masticatorijs apo-
phlegmatismis, vtendum est. Sed prius suffu-
migijs & vaporibus materia incidenda est. Ra-
dendum quoque caput est, fouendumque ex
oleo calente in quo pulegium, serpillum, aliaq;
eiusmodi coxerint. Dein dropacibus, sinapif-
mis, sartagine Rasis vtendum est. Cucurbitu-
læ quoq; & sanguisugæ iam benè purgato cor-
pore conueniunt.

Dropax.

Dropax. ℞ olei rutacei ℥ iij. picis nigræ
℥ j. liquefiant in vase duplici, deinde adde py-
rethri, sinapi, piperis albi ana ℥ iij. misce & ex-
tende in aluta, calidum appone, renoua prius-
quam infrigescat.

Sinapismus

Sinapismus. ℞ ficus pingues q. s. leniter in-
coque, deinde cum duplo seminis sinapi con-
tunde ad formam emplastri. Aliud.

℞ oxycroci ℥ iij. fortiter agitetur in mor-
tario cum oleo laurino, deinde addantur gra-
norum sinapi, pyrethri, staphidis agriæ, pipe-
ris albi, euphorbij ana ℥ ij. misce.

Sanguisuga
Rasa.

Rasis sartaginem calefieri iubet dum can-
deat, & de proximo admoueri capiti : Aliqui
palam ferream ita calefaciunt & similiter ca-
piti admouent. His remedijs per longiora in-
terualla vtendum est, aut breuiora, vt res pa-
titur.

titur. Apoplexia secundo aut tertio die iugulat, aliquando primo, vt ergo celerior est aut minus celer, ita erunt interualla remediorum aut breuiora aut longiora.

Paratur nobile medicamentum ad apoplexiam per destillationem. In aquam vitę aliquoties purificatam flores rosmarini infunduntur & macerantur, qui postea exprimuntur & abijciuntur: in eandem rursus alios recentes flores iniiciunt rursumque exprimunt, idque sæpius atque iterum, ad eum ferè modum, quo syrupus rosarum multarum infusionū in pharmacopolijs paratur, repetunt, & tandem destillant, sicque vi ignis efficacissimum liquorem ad hunc & alios frigidos morbos eliciunt.

Aqua ex floribus rosmarini.

DE LETHARGO

Caput. V.

Lethargi signa colliges ex Actio, prædictionibus Hippocratis Coi, de causis pulsum quarto: sed plenissimè ex Aureliano lib. secundo acutorum.

Lethargum cognitum ita curabis: Initio materiam repelles, deinde ægrum excitabis, tum materiam vacuabis, postremo confirmabis caput, accidentia corriges, & in primis rationem vitę institues. Loco autem lucido & tepido ægrum collocabis.

Curatio.

DE LETHARGO.

**Repulſio
materiæ.**

Materiam repelles oxyrrhodino: hoc autem minus aceti recipiat quam in phreniticis. Deinde oxyrrhodinum parandū erit ex oleo roſaceo, chamæmelino, adieſta minore parte aceti: Exempli gratia.

**Oxyrrho-
dina.**

R̄z olei roſati & chamæmelini ana ꝑ ſ. aceti ꝑ iij, oportetque effundere oxyrrhodinum, in eam partem capitis, vbi commiſſura eſt coronalis. Tum clyſteribus acribus & ſuppoſitorijs vtendū eſt, qualia in Apoplexia deſcripta ſunt.

**Aegrum ex-
citantia.**

Poſtea vero friſtionibus, vinculis, vellica- tionibus, partim vt ijs materia reuellatur, par- tim vt æger inde excitetur, vti conuenit. Ex- citatur quoque hac potione.

Potio.

R̄z mithridatij ꝑ j. diſſolue in aquæ vitæ & calendulæ ana ꝑ ſ. Similiter theriaca vti licet, ſed tutius poſt clyſteres acres & euacuationes. Et hoc quoque excitat.

**Suffumi-
gium.**

R̄z Caſtorei, lapidis gagatis, cornu cerui, ab rotoni, capillorum hominis, ana ꝑ j. exci- piantur pice humida, fiat ſumus qui adhibea- tur naribus.

**Euacuatio
materiæ.**

Statim ab initio, ſi corpus ſanguineum eſt & vires tollerant, è cæphalica detrahendus ſan- guis eſt. In lethargo clyſteribus & glandibus acribus potius, quàm pharmacis purgantibus vtendum eſt. Vbi tamen diuturna paſſio eſt, & vires tollerant, vtimur primum ſyrupis in- cidenti-

ſidentibus, quales antea deſcripti ſunt. Deinde ex hieris, picra & diacolocynthide & agarico purgamus. Poſtea cucurbitulas ceruicis initio ac deinde ſcapulis, metaphreno, lumbis & cruribus affigimus.

Cucurbitulæ.

Ab his ad localem purgationem veniendū eſt per errhina, diamaſſemata, illitiones palati & capitis, dropaces, ſinapiſmos phœnigmos. Pulegium itaque, thymum, origanum, aliaq; id genus incocta aceto naribus ita admouebis, vt calidus vapor ad cerebrum perueniat, ex quo nares inunges hoc modo.

Topica
Errhina.

℞ olei irini ℥ j. aceti ſcyllitici ℥ ſ, caſtorei ℥ ij. miſce. Poſtea etiam errhinis ſupra deſcriptis vti licebit. Pallatum illines ſinapi trito ex aceto & melle commixto. Cumq; hæc fiunt, per interualla clyſteres iniicies.

Caput æſtate rades, hyeme detondebis, fouebisq; primū ex decocto ſerpilli, ſatureiæ, pulegij, organi cœctorum in oleo & aceto. Deinde inunges & fouebis oleo philoſophorum, de gagate, ſinapino, de piperibus, de euphorbio: quæ à Meſue deſcribuntur, alioqui irino, ſampſuchino, hoc eſt, de maiorana, aut ex roſmarino temperato. Vel hoc cerato.

Capiti ad
mouenda.

℞ olei laurini ℥ iiij. ceræ tantundem, liquæſcant in vaſe duplici, fortiterq; agitentur cum ſucco apij & rutæ, quibus adde caſto-

Ceratum
capiti.

DE LETHARGO

Sinapismus storei puluerizati ꝯ j. Hinc ad dropacem prius descriptum transeundum est, ex quo ad sinapismum. Sinapismo autem sic vtendum est, vt simul atque erubuerit reuellatur, parsque ex oleo calido foueatur. Quod si dolor vehemens inde excitatus est, leniendus erit rosaceo, meliloti, chamæmeli, aut maluæ decocto. Oportet autem sinapismum subigi ex aqua, vt vult Oribasius, non ex aceto vt recentiores ferè Medici, & olim Archigenes. Actius ex aqua vbi præmaduerint ficus siccæ. Credidit enim Oribasius vim sinapismis aceto dissolui, id quod experientia didici. Huic rei utilis est diacapregias Aureliani, aliorum diaspyrathon ex caprino stercore, aceto vel posca subacto.

Phœnigmi. Sunt & phœnigmi qui rubificant ex nasturtij semine, sinapi, helenij radice, columbarum agrestium stercore, scylla in mortario trita & illita, aliorum tunica, lacte tithymalli, cantaridum puluere, vrtica, attramento sutorio, euphorbio. Hæc autem tandiu inhærent, dum pars erubescat. Si quæ ampullæ excitatæ sunt, contundantur. Ampullas attollit quod sequitur.

Phœnigmus. R. sinapi, piperis, euphorbij, anna ꝯ j. incorporentur melle anacardino, & in pare sinatur dum ampullæ tumeant.

Mellis anacardini con-
fectio. Mel anacardinum ita fieri oportet. Anacardia

dia septem diebus in aceto macerabis prius cōtrita, tunc in eodem aceto coques dum tertia pars aceti cōsumpta sit, refrigerari sines. Quod supernatabit oleosum, mel est anacardinum. Albucasis in aqua macerat & coquit. Alij mel anacardinum vocant in quo anacardia fuerint condita. Oportet autem dum hæc sunt, quem admodum in Apoplexia stomacho consulere & visceribus.

DE CARO.

Caput VI.

Carus cum Lethargo conuenit, sed maior *Signa.*
 Cac profundior sopor est. Stimulati non excitantur: interrogati non respondent.

Eadem curatio quæ lethargi, nisi quod magis incidentibus & attenuantibus vtendum est. Est & quoddam genus delirij inter phrenitidem & lethargum ex bile & pituita. Veteres *Ceratio.*
τυφμανία, aut *τυφνία* appellarunt, in qua affectione si superat bilis, Coma peculiariter appellatur: Si pituita, Catochus. Fit & Coma vbi calidioribus & humidioribus vaporibus à reliquo corpore sublatis caput repletur. *Typhomania.*
Coma.
Catochus.
 Catalepsis nomen ambiguum est: nam aliquando subita vocis amputatio, sensus & motus priuatio intelligitur: quam *ἀφροσία* Hippocrates *Aphrochia.*
 appellauit: Græci etiam *ἀσύνεσις*. Ea interim

DE CARO.

fit plénitudine sanguinis quæ vias spiritus animalis intercipit. Sed quæ peculiariter Cataleptis appellatur, à melancholico succo aut vapore postèrius cerebrum replente & obturante fit, de repente muti fiunt neque concidunt, sed in eodem habitu permanent, apertis oculis, si prius apertis essent: stantes, si starent: sedentes, si sederint. Ex quo vulgus credidit non dolere, aut ita mortuos; sed ṽt loquuntur raptos.

DE PARALYSI.

Caput VII.

Paralyſis
quid.

Paralyſis de qua hic agimus, familiaris apoplexiæ, resolutio est dimidij corporis non totius: quarundam partium, non omnium: à crasso & frigido humore, à quo nervosum genus remollitur & resoliditur.

Curatio.

Curatio in his sic instituenda. Primum clystere vtendum est: molli quidem, si diutius fœces alui substererint, deinde etiam acriori. Partes resolutæ oleo moderato, sed calente, fovendæ sunt.

Venæ
sectio.

De phlebotomia non conuenit inter Græcos & Arabes. Detrahendus quidem sanguis est mediocriter ex Cæphalica partis integræ authoribus Græcis. Frigidum enim eorum corpus

corpus est, itaque larga sanguinis missione languidum calorem extingui metuunt. Rasis & qui hunc sequuntur, ex vtraque Cæphalica ad tres aut quatuor libras, postridie etiam ex venis sub lingua, sanguinem auferunt. Græcis tutius adhærebis.

Victus instituendus, primum quidem quileniter incidat, attenuet, detergeat. Potus sit hydromel ex sextupla aqua, in qua modicum stœchados aut aceti aut ireos Florentinæ coxerit, velut exempli gratia. Horum aut similiū ʒj. in ℥iij. aquæ. Quale hoc est.

Victus ratio.
Potus.

℥b. radice ireos Florentinæ ʒj. coquatur in ℥b. ij. aquæ, dum dimidum libræ consumptum sit, in colatura dissolue mellis communis quartarium vnum, fiat hydromel despumatū. Poterit & cinnamomum & macis, nux moscata & caryophylli in aqua decoqui atque inde hydromel parari. Aut sic.

Hydromel.

Rx aquæ fontis ℥b. xx. mellis communis bis despumati ℥b. j. ℥. radice acori ʒj. succi samfuchi ʒj. ℥. nucis moscatæ ʒiij. decoquantur vsque ad consumptionem quartæ partis, coletur & fiat melicratum ad ℥b. xv. vtatur tempore sitis. Loco etiam mellis saccharo vtetur si febris suspicio est, modicoque cinnamomi aut rerum eiusmodi, vti oportebit. Quale hoc est.

Rx aquæ costæ ℥b. j. coletur per manicam

D E P A R A L Y S I.

Hippocratis cum sacchari ℥ iij. & ʒ ij. cinnamomi. Delicatus, magisque medicatus potus hic est.

Cum.

℞ sacchari alibi ℥ j., aquæ purissimæ ℥ xij. cinnamomi ʒ j. f. zinziberis, galangæ ana ʒ f. zedoariæ ʒ iij. acori veri ʒ ij. seminis pæoniz ʒ j. f. saluiz siccæ p j. depurentur & coquantur vsque ad ℥ viij. Utatur asis carnibus, quæ caryophyllis, cinnamomo, & lardo configantur: vel lardum quo figuntur, aspergemus puluere cinnamomi, nucis moscatæ & caryophyllorum. Utatur granis pini conditis & pistaciorum. Teneat frequenter in ore frustula nucis moscatæ mastigando. Conuenit & caro columbarum, & cerebellum ex lepore. In decoctis saluia, maiorana, hyssopum. Manus ex aqua decoctionis saluiz abluantur. Abstineant aqua, & vino & longiori somno: Aer columbarum à proprietate occulta paralyticis confert.

*Humorum
preparatio
& euacuatio.*

Materia potionibus incidenda, ut hydromelite, in quo stœchas, cæteraque eiusmodi coxerint. Deinde purgant hac potione.

℞ hieræ picræ Galeni ʒ iij. diacatholici ʒ f. electuarij de succo rosarum ʒ j. mellis rosati colati ʒ vj. aquæ melissæ, betonicæ ana quantum satis est, fiat potio. Aut.

Syrupus.

℞ radicum acori ℥ j., saluiz M. iij. stœchas
dos

dos p. iij. fiat decoctio in ℥b. tribus aquæ, ad
 medietatis consumptionem, in colatura tempe-
 ra agarici albi ℥j. s. foliorum senæ ℥.ij. zinz-
 beris, cinnamomi ana ℥j. in colatura dissolue,
 sacchari & mellis ana ℥b. s. fiat syrupus perfe-
 ctè coctus, de quo capiat bis vel ter in hebdo-
 mada per tres horas ante pastum. Aut in for-
 ma boli seu pilularum.

R̄ pulueris hierę diacolocynthidos ℥ij. ma **Bolus.**
 sticis, bdellij ana ℥j. nucis moscatæ, spicæ ro-
 sarum ana ℥j. misce in forma boli. Vtemur e-
 tiam vbi ex vsu esse videtur, pilulis imperiali-
 bus, assaiereth, de agarico, scetidis, cochijis & a-
 lijs quoq; supra descriptis capite de Soda phle-
 gmatica: quo loco etiam syrupi descripti sunt,
 qui plurimum conferent, si per intervalla pa-
 ralyticis imperentur. Dum hæc fiunt, oleo ca-
 lente, sed temperie non ita calida, resolutæ par-
 tes fouendæ sunt. Stomacho etiam & visceri-
 bus vt prius consulendum est.

Conseruæ quoque imperandæ sunt, iuz̄, **Conserua**
 anthos, saluæ, stœchados, enulæ, gentianæ, a- **conueniens**
 cori, ireos, zinziber conditum, nux moscata **tes.**
 condita, theriaca, mithridatium. Dosis conser-
 uarum ad ℥j aut ij. quas vtiliter commiscebis
 cerebro leporis asso, quod peculiari natura scri- **Cerebrum**
 bunt conuenire paralyticis. Præscribatur igi- **leporis.**
 tur hoc modo.

DE PARALYSI.

Rz conferuæ iuæ, saluiæ, & anthos ana ʒj. cerebri leporis recenter alsi ʒ ss. cinnamomi, nucis moscatæ ana ʒj. cū saccharo in aqua iuæ dissoluto fiat electuarium secundum artem. Huius detur ʒj. vespere, duabus horis ante cibum, & in ingressu lecti. Theriaca & mitridatium vt & alia omnia remedia fortiora magis conueniunt post purgationes. Dosis ʒ ij. aut ʒ j. quæ interim miscebis cum conferuis. Aliquādo dissolues in hydromelite, in aqua vel decocto iuæ, calendulæ, roris marini, saluiæ, stæchados, aqua vitæ, aut vitis.

**Electuariū
de leporis
cerebro.**

**Cucurbitu-
læ.**

Vomit.

Stuphæ.

Balnea.

Post hæc cucurbitulæ locis affectis sine scarificatione aptandę sunt, ac deinceps collocandę, sed maxime radicibus neruorum ad fines dorsi & neruorum. Probant quoque vomitiones semel in hebdomada, stuphas siccas & balnea.

Stuphæ parari debent ex decocto herbarū conuenientium, maioranæ, saluiæ, hyssopi, origani, calamenti, calendulæ, sarmentorum vitis, pulegij, serpilli, stæchados, rerumque eiusmodi. Collocabitur resolutum corpus loco bene concluso, ne fumus decocti euanescat. In decoctum silices candentes iniiciemus vt fumus fiat.

Ex ijsdem rebus balnea comparantur. Probant quoque balneum decoctionis vulpis integræ

tęgrę cum herbis supra enumeratis.

Inunctiones primum molles, deinde aciores. Partes itaque primo oleo chamæmelino, de meliloto, anethino, amygdalarum dulcium, de lilio, hyperico, iasmino, Keiri, de nucib. de semine lini, de maiorana, de galbano, nardino, canabino, raphanino, de castoreo, de cōsto, de spica, laurino, de cucumere asinino, sinapino, de pipere, de euphorbio, de pyrethro. Oportet quę paulatim à leuioribus ad fortiora progredi. Flocci lanę in his oleis immergendi sunt, & ex ijs fouendę partes affectę, postea etiam sunt regendę. Olea componuntur ex olei quatuor aut quinque partibus, aquę iuę, aut succi conuenientis vna parte, & aliorum quorundam medicamentorum decima, quale hoc est.

Inunctio
hes partis.
Olea.

℞ olei de iasmino ℥. j. aquę saluię, aut succi iuę, vel vini in quo iua coxerit ℥. iij. castorei, pyrethri, euphorbij, piperis, belzoi-
mi, assę fœtidę, opopanacis, galbani, lapidis gagatis, horum vnius ℥. j. fiat decoctio ad aquę, vini aut succi consumptionem. Olea composita. Oleum de scylla prius descriptum. Aut.

℞ terebinthinę ℥. ij. laterum antiquorum, aut (vt Albucasis) recentium in oleo iasmino extinctorum, masticeis, styracis ana

Oleum de
stillatum.

D E P A R A L Y S I.

℥ s. belzoimi ℥ s. fiat destillatio in alembico vitreo : tres humores fluunt, quorum tertius erit optimus. De oleo de Lateribus lege Mesuen. Balsamum & oleum Balsaminum mirabiliter commendant, sed rariora sunt & tantum principum. Sed his respondere volunt, quod sequitur.

**Balsamum
artificiale.**

℞ thuris albisissimi, masticis, ana ℥ ij. ligni aloes ℥ j. caryophyllorū, galangę, cinnamomi, zedoarię, nucis moscatę, cubebarum ana ℥vj. myrrhę, aloes, ladani, sarcocollę, castorei ana ℥ s. baccarum lauri, nucleorum piniana ℥vj. ireos, aristolochię rotundę, dictamni, consolidę maioris ana ℥ j. gummi elemi, opopanax, belzoimi ana ℥ ij. succi iuę, succi herbę paralytis ana ℥ iij. terebinthinę ad pondus omnium. Omnia incorporabis, destillabis in alembico vitreo, extillabit aqua primum, dein de velut oleosum quid, postremo quasi mel. Probatur & oleum vulpinum descriptū à Mesue: & hoc quoque.

℞ vnguenti de bdellio ℥ iij. liquefiat in vase duplici cum olei de terebinthina, de scylla aut similis ℥ iij. Parabiliora sunt hæc.

Vnguentū.

℞ olei lumbricorum, olei de terebinthina ana ℥ iij, aquę vitę ℥ j. pyrethri, castorei, costi, ana ℥ ij. bulliant ad aquę vitę consumptionem, fiat vnguentum, quo vngatur collum,

lum, spina dorsi, & iuncturę partis dolentis. In eundem vsum paratur sequens linimentum.

R̄ assæ fœtidæ, serapini, opopanacis, galbani, armoniaci, euphorbij, ana 3 s. liquefiant ad ignem, castorei 3 j. ellebori, hermodactylorum ana 3 s. pyrethri, sinapis, piperis albi ana 3. ij. ol. laurini 3 j. s. ceræ parum fiat vnguentū, vngatur nuca, & pars affecta. Aut.

R̄ olei chamæmelini, vulpini, costini ana 3 iij. Misce, vngantur partes iam dictæ, & aspergantur postea sequenti pulvere.

R̄ pulueris cimini 3 j. piperis longi 3 s. Misce. Optimum autem est corpora paralytica inungi ad ignem factum è sarmentis vitium. Mollis alius perpetuo seruari debet clysteribus aut leuibus pharmacis vel suppositorijs. Modus operationis medicamentorum & eorum quæ partibus affectis apponuntur vnctio num, dropacum, sinapismorum, phœnigmorum est, vt pars in ruborem attollatur, non exulceretur, & cucurbitularum brevis mora esse debet, ne quod attractum est dissoluatur. Sunt qui certum experimentū dicant, si pars decocto maioris tithymali foveatur, deinde folia eius integra super ponantur. Errhinis vel apophlegmatismis vt prius vtendum est. Apophlegmatismis cum nodulo aut baccillo ori appposito, vt diximus.

DE SPASMO CANINO.

Paraliticis & nervorum doloribus laborantibus, vinum prorsus fugiendum est. Potus sit illis mulsa, aqua mellita, quæ fit ex partibus octo aquæ, duabus vel tribus mellis albi, vel sacchari. Coquantur omnia simul, colentur per manicam Hipp. cum ʒij. cinnamo; vel decoctum aceti conditi.

DE SPASMO CANINO.

Caput VIII.

Spasmus
Caninus
quid?

Spasmus Caninus est subita contractio, vel extensio nervorum & musculorum masticatoriorum, & eorum qui peculiariter lati appellantur. Animadvertendum autem utrum resolutio sit, an convulsio. In resolutione pars affecta laxa, mollis, à sana trahitur. In convulsione dura & contenta trahit sanam. In resolutione salivatio multa: in convulsione, non ita.

Curatio.
Sang. missio.

In materia frigida causa efficiente huius passionis, si nihil repugnat, sanguis mittendus, sed moderatè. Primum quidem è cephalica, deinde è venis sub lingua.

Digestio
hæmorrhoidis.

A sanguinis missione incidendum & attenuandum est, hoc modo:

℞ acori & stœchados ana M. s. fiat decoctio in quinque quartarijs aquæ purissimæ, colaturæ addatur mellis communis ℥ s. plus minusue

núsue, fiat melicratum despumatum, aromati-
cetur cum ꝓ j. nucis moschatæ. Quod si res vr-
get (acuta enim hæc & tarda aliquando passio
est) clysteres acres iniicies.

Purgabis ex hiera Passij ex descriptione Scri **Evacuatio.**
bonij, cuius hæc est descriptio:

R̃ pulpæ colocynthidos ꝓ iiij. opopanax **Hiera Passij descriptio.**
& sagapeni ana ꝓ j. & grana vij. marrubij, stæ-
chados, agarici, chamædryos ana ꝓ iiij. petro-
selini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi ana
ꝓ ij. cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ electæ,
folij, croci ana ꝓ s. & grana iiij. Opopanax &
sagapenum in mortario tundantur cum affu-
sione modici mellis liquidi, aut syrupi de stæ-
chade, reliqua in puluerem, redacta miscean-
tur cum melle quantum satis est & fiat electua-
rium.

R̃ supra dicti electuarij ꝓ j. s. castorei ꝓ s. dis- **Potus.**
soluantur omnia in supra dicto melicrato quã-
tum satis sit, & fiat potus.

Partes affectæ & tota ceruix oleo aut vn- **Topica.**
guento inducenda sunt, quale hoc est.

R̃ radicis althææ ꝓ j. seminis fœnu græci **Inunctio.**
conquassati ꝓ s. fiat decoctio in olei conue-
nientis quartarijs tribus, aquæ saluæ quar-
tario j. & fiat fortis expressio, inungatur lo-
cus & tota ceruix. Deinde cum lana intin-
cta in hoc oleo, partes affectæ & ceruix mu-

DE SPASMO CANINO,

niantur. Postea verò licebit vti oleo de cucumere asinino, de scylla, & in ijs liquefacere duodecimam partem ammoniaci, bdellij, opopanax, galbani.

Caputpur-
gia.

Posthæc apophlegmatismis, caput purgijs & alijs, quæ caput partim euacuant, partim corroborant, vtendum erit. Nodulo itaque folijs lauri pleno, & in decocto conuenienti madefacto, palatum illinendum erit, quale hoc est.

R̄ nucis moscatæ, pyrethri ana ʒ ij. sinapi, piperis ana ʒ j. decoquantur omnia in mulsâ ʒ iiij. Ex eadem mulsâ possunt fieri caput purgia. Probatum autem & hoc caput purgium.

R̄ anagallidis, panis porcini, nucis Indicæ, nucis moscatæ, pyrethri, cucumeris asinini, piperis, acori, ana ʒ ss. conquassata omnia decoquantur in olei cheirini ℥ ij. aquæ maioranæ quartarijs tribus, vel in sola aqua maioranæ. Vfus tempore, resupinetur æger & stomacho vacuo, quinque vel sex guttæ naribus instillantur, aut sæpius nares interiores inungantur.

Oleum verò vnctioni occipitij, colli, regionis sub mento & affectæ partis, cōuenit. Teneat in ore acorum conditum, zinziber conditum, nucem moscatam.

Frictiones quoque auertendæ materiæ conueniunt,

ueniunt, vt etiam cucurbitulæ, quæ primæ & secundæ vertebræ ceruicis admouendæ sunt. Friciones
Cucurbitulæ.

INVETERATO & sic contumaci morbo, Razis probat cauteria post aures, & in ceruice. Cauteria.

Dropace quoque simpliciori vtendum erit Dropax.
expicis ꝓ iiii. olei liliorum ꝓ j. liquefiant & extendantur in aluta. Castoreum quoq; teneatur sub lingua. Demum ad sinapismos & phœnigmos deueniendum est.

VICTVS instituitur incidens, & attenuas, qui tamen media materia temperetur. Cibus sit liquidus. Loco tepido, lucido, stragulis quoque mollibus decumbat. Quæ topica admoventur, conseruentur calida: nam refrigerata vehementer nocent. Madefactionibus capitis abstinendum est, quia caput replent. Victus ratio.

DE CONVULSIONE

Caput IX.

COnuulsis eadem ferè ratio vitæ instituenda est, vt etiam in Spasmo canino: siquidem à plenitudine crudorum humorum contracta est. Victus ratio.

INITIO, ceruicem & vicinos musculos laxante, & emolliente oleo coq; tepido fouebis, lanaq; in eodem immersa conteges, atq; vt calor conseruetur in parte, vesicam suillam plenâ oleo tepête super pones, aut eiusmodi saccu Fomenta.

DE CONVULSIONE.

Sacculus. los. R^x seminis lini leuiter conquassati: M. s. fur-
furis frixi, florum chamæmeli & anthos ana p.
j. salis communis torrefacti & puluerizati ʒ s.
fiat sacculus, aut plures huiusmodi sacculi, qui
subinde recalfacti, calorem in parte contineât.
Leues sint sacculi, vt ea omnia, quæ læsis par-
tibus atq; dolentibus super ponuntur.

Clyster. Clysterium quoq; mollius vsus est. Veluti.
R^x Radices althææ ʒ ij. seminis lini & fœ-
nugræci ana ʒ s. fiat decoctio in aqua ad ʒb. s.
cui adde olei cōmunis ʒb. s. misce fiat clyster,
qui tepidus iniiciatur. Articuli corporis linteis
calentibus fouendi sunt.

Materiæ præparatio Materia hyssopi decocto in mulsa & rebus
huiusmodi incidenda est. Deinde purganda,
vt prius, in spasmo canino, & soda phlegmati-
ca, aut agarici, aut diaphœniconis, ʒ iij. in con-
uenienti mulsa dilutis. Molliter fricetur cer-
uix, spina, spatulæ, cum inunctione conuenien-
te, qualia sunt.

Lunatio. R^x olei terebinthinæ, olei lumbricorum ana
ʒ ij. axungię humanæ ʒ j. liquefiant simul.
Oleum de costo cum quarta parte pinguedi-
nis castoris, aut lutrę animalis, quem taxonem
aut blerellum vocant, permisceri potest.

Vulpis præparatio pro inunctione Plac. R^x vulpem bene pinguem corio detracto, &
exenteratam, confixam caryophyllis, infar-
ctamq; hoc modo, & assatam.

R^x ra-

R^z radicis althææ & liliorum ana ʒ f. radiceis acori, ireos ana ʒ ij. chamæpityos herbæ, costi, maioranæ, calendulę ana p. ij. florum anthos, meliloti, chamæmeli ana p. j. styracis, ladanii pinguis, masticeis, castorei ana ʒ iij. omnia in mortario contendantur, & cum oleo de vermibus malaxentur, farciatur vulpes, & bene consuatur, assætur cum aspersione aquæ vitæ: quod destillat pingue excipiat subiecto vase, in quod infusum sit acetum, deinde vulpes in aqua coquatur. Quod supernatabit pingue tum in aqua tum in aceto, vsui reseruetur. Vtilissimum est post vnctionem pellibus hædorum, agnorum, luporum, vulpium, arietum, recens detractis atque etiam dum calidis, partes inunctas contegere. Quod si pelles iam refrixerint, immergendæ sunt oleo calido, vt recalcescant. Aliud.

*Pelles animalium partibus impo-
nendæ.*

R^z vini rubri ʒ f. olei liliorum ʒ ij. rasurę mollioris partis & magis spongiosæ de cornu cerui ʒ j. salis ʒ j. florum camæmillæ, ʒ vj. masticeis f. bulliant omnia in vase duplici ad vini consumptionem. Hinc ad vnctiones calidiores transeundum est, de quibus supra.

Balneum quoque commendatur ad vmbilicum ex hydrælæo: cuius modus est ex æquis partibus aquæ & olei, Perseuerante malo, olei balneum conuenit calidum, & domicilio ca-

Balneum

DE CONVULSIONE.

lido, quod ita præparabis. Quintam partem olei calefacies, & quatuor partibus non calefactis commiscebis; alioquin ex decocti fœnugræci in aquæ partibus tribus & olei tertia parte balneum præparabis, quo totum corpus immergatur. Sed balnei modum esse oportet, ne vires resoluantur. Itaq; solis irrigationibus vtendum erit, vbi vires non sinunt.

**A balneo
quid.**

A balneo tempestiua est vnctio ex supra dictis oleis, aut in quo ruta, coniza, rosmarinum, arthemisia, fœli, cum modico cinnamomi coxerint, quibus aliquando decima vel duodecima pars castorei adijcienda est. Veteres omnes & recentiores Medici, castoreum propinant è mulsa. Dosis castorei à ʒ ij. ad ʒ ij.

**Castorei ex
hibitio.**

Cucurbitulæ.

Cucurbitulæ partibus affectis, sed cum scarificatione admouendæ sunt, iam progresso morbo & bene purgato corpore. Aurelianus in accessione, leuibus: in remissione, cum scarificatione vtitur, occipitio & collo defixis.

**Hipp. reme-
dium repro-
batur.**

Remedium Hippocratis est aqua frigida in iuvene bene carnoso, & ætate media, Paulus, Celsus, Aurelianus, denique tota posteritas reprobauit.

**Febris an
excitanda.**

De excitanda febre non conuenit. Qui pro uocant febrim, vtuntur autoritate Hippocratis aphorif. 57. lib. 4. & aphorif. 70. lib. 5. Herophilus quoque febriculam laudauit. Asclepiades

piades simpliciter febrem. Auicenna & Arabes febrem, prouocari nolunt, nisi diariam. Cæterum ex Galeno sic habeto. In morbis frigidis, quos humor crassus, contumax & multus generauit, febris satis vehemens excitari potest: leuis enim nocet, nec prodest exemplo filij Numenij, qui cum apoplexia correptus esset, febris accessit mediocris, quæ cum noceret & per infirmitatem caloris, non prodesset, mors sequuta est. Oportuit enim febrem fuisse magnam, quæ talem humorem calefaceret, incideret, concoqueret, & discuteret. Itaque vt est materia, ita febris consilium temperandum est.

1. Proreth.
Hipp.

DE INCUBO

Caput X.

Incubus quem ἰστιάριον αἰνῶσιον vocant, neq; deus, neq; semideus, neq; cupido, quod veteres credidere, neq; δαίμων sicut theologi existimant, neq; insultans vetula: sed vapor quidam crassus in caussa est, qui partim vias spiritus animalis intercipit, vnde & loquendi & respirandi difficultas: partim animæ offunditur, vnde phantasia & spectrum quoddā, quale frequens est in somnijs. Sed ideo incurfare atque etiam opprimere thoracem, constringere collum, præcidere vocem apparet, quia his ma-

Incubus
quid.

DE INCUBO.

ximè partibus labor est. Pueros, & obæsa corpora, interim suffocat, alioquin epilepsiã denuntiat. Incubus enim epilepsia quædam est nocturna. Multos olim Romæ, quod scriptum reliquit Symmachus, vno anno confecit.

Erratio.

Itaque qui incubo opprimitur, statim excitandus est, postea videndum, vt ne huiusmodi affectio redeat. Imperanda est sobria vita, cœna frugalis, vitæ ratio è media materia, frequens ablutio extremorum, sæpe etiã pectendum caput est ex ebore, in partem posteriorem ducto pectine.

Mellicratũ præparatio

Mellicratum plus minúsue dilatum pro ratione, in quo radices fœniculi, asparagi, petroselini, graminis, acetosæ, cichorij, endiuiz, cortex radicis capparis, hyssopus, buglossum, borrago, endiuia, summitates lupuli, fumaria, ceterach, scolopendrium, capilli veneris, cuscuta, passulæ mundatæ ab acinis, pruna, sebesten, flores anthos, violarum, borraginis, decoxerint, quale hoc erit.

Mellicratũ.

℞ radicis fœniculi, radicis graminis ana ʒ ss. sumitatum lupuli, p. ij. hyssopi, trium florum cordialium, passularum, liquiritiæ ana p. j. fiat decoctio ad ʒss. j. f. in colatura dissolue mellis albi, sacchari albissimi ana ʒ ij. fiat mellicratum. Deinde purgandum corpus est, hoc modo.

℞ Caf.

R^x Cassiæ vel catholici ꝑ x. dissoluantur in sero lactis caprini, cum ꝑ j. syrupi violacei, fiat potus. Pro ratione naturæ licebit vti fortioribus, quæ partim in capite, de Epilepsia, partim in capite, de Melancholia dicentur. Nec omit- tenda phlebotomia, si res exigit. Clysteres quoque & frictions ex v^{su} sunt, quia fumos reuelant. Errhina quoque & apophlegmatismi, sed ex leuiori materia.

Purgatio.

Venz se-
tio.
Reuulsio-
nes.

Pulueres quoque, maximè à cibo, qui fu- mos prohibeant & morbo conueniant, qua- lis hic est.

Puluis post
pastum.

R^x coriandrorum preparatorum ꝑ ij. specie- rum diamargariti frigidi & diarrhodonis abba- tis ana ꝑ j. seminis pæoniæ nigri ꝑ ij. coralli ru- bri ꝑ s. macis, cinnamomi ana ꝑ j. cum modico sacchari rosati fiat mixtura, vtatur post pa- stum, cochleari dimidio. Bibere quoq; medio pastu, non in fine, hoc adiuuat.

Cucuphæ quoque parandæ sunt ex flori- bus anthos, stœchados, & alijs cebus capitali- bus, vt prius.

Cucupha.

Dropax quoq; simplex, tū hypochondrijs, tum etiam capiti commodè aptari potest. Ca- lidus applicatur & ne pertinacius inhæreat, linteolum rarius & vehementer attritū inter- ponendum est. Componatur dropax ex quin- que partibus picis & vna olei de spica vel de mastiche.

Dropax.

DE EPILEPSIA.

Thoraci
quæ adhi-
benda.

Thoraci præterea propter impeditam respirationem quædam applicanda sunt, quæ facilem motum pectori pareant, & si quæ plenitudo affuerit discutiât, quare hac inunctione, pectus & ventriculi regio vngi debent.

R^z olei anetheni & camæmelini ana ʒ ij. vi
ni albi ʒ j. sagitentur simul & fiat inunctio supra thoracem & ventriculum.

Cordis tu-
tela.

Cordis quoq; habenda ratio est, quare sacculus parari potest ex cordialibus, qui aqua meliſſæ & vino irroratus, tepidè cordi applicetur.

DE EPILEPSIA

Caput XI.

Epilepsia
quid &
unde.

Epilepsia conuulsio est corporis, nascitur vbi humor crassus & frigidus obfarcit anteriores cerebri ventriculos, ex quo vitiosus motus & veluti raptus totius corporis, contorta facies, inuoluntaria seminis effusio, & interim affectio, quæ apoplexiæ proxima est. Pueros ferè vexat, quo tempore dentire incipiunt, vnde Puerilis morbus ab antiquis appellatus, vt etiam Lunaticus, quia interlunio nati, obnoxij huic morbo existimantur, vt & qui concepti sunt fluentibus mensibus. Perseuerat hic morbus ad annos pubertatis, soluique consuevit in masculis cum semen emittere incipiunt: in mulieribus, cum primum effluunt menses. Quos annos si superat morbus

Puerilis
morbus.

morbus, desperata res est. Nascitur aliquando consensu stomachi, aut aliarum partium corporis: aliquando spiritu quodam virulento, ex partibus inferioribus sublato in caput. Sæpe etiam primarius cerebri affectus est.

QVOS vexat paroxysmus sic habeto: Corpus quod rapitur, loco lucido & mediocriter calido collocato, sublimiori capite, ex quo membrâ supernè deorsum confricari debent. Dentes quos sæpe constringit, unde etiam imminet suffocatio, vel manibus vel quavis alia ratione diducendi sunt, ex quo hæc formula & lingua & palatum illinenda sunt.

Curatio paroxysmi

R̄ theriacæ vel mithridatij ð iiij. dissoluantur in 3 j. succi rutæ, cum penna vel lineteolo extremitati bacculi alligato, palatum & lingua affricentur. Tum.

Palato theriacâ illinenda.

R̄ belzoimi, mumix, picis nigræ ana ð j. uniantur cum succo rutæ, fiat suffumigiū pro naribus, aut eadem simul liquefacta naso interiori inungantur. Vomitus si fieri potest excitetur, oleo ex penna illito interiori parti oris: alioquin perseverante paroxysmo.

Suffumigiū

R̄ castorei ð ij. belzoimi ð j. dissoluantur in oxymellitis scyllitici 3 j. s. cum cochleari distractis dentibus ingeratur in gulam. Didymus extracto sanguine è pedis pöllice, labra epileptici inungebat. Orpheus & Archelaus

Sanguinis proprii illicio.

DE EPILEPSIA.

contaminabant faciem ex quacunque parte corporis ducto sanguine, atque ita statim exurgere epilepticos testati sunt.

**Curatio es
pilepti ex
tra parox-
ysmum.
Clyster.**

P O S T paroxysmum clyster iniiciendus est, qualis hic veterum.

R decoctionis aristolochiæ, centaurij minoris, vel calamenti. ℥b. j. in qua dissolue pulueris hieræ picræ, pulueris hieræ diacolocynthidosana ʒ iij. olei chamomillæ ʒ iij. sacchari rubri, mellis communis ana. ʒ j. lalis ʒ ij.

**Humorum
præparatio**

Post clysterem refouendi sunt boni succi cibis. Ex quo Melicratum imperandum est, ex decocto hyssopi, stæchados, calaminthæ. Aut syrupus acetosus, oxymel simplex, oxymel scylliticum. Deinde purgandum erit, cum hiera picra, & hiera diacolocynthidos. Hæc enim purgatio maximè probatur antiquis.

Purgatio.

Nec omittenda phlebotomia, si omnia consentiant. Iis verò quibus inueteratur epilepsia ad cautionem vena è malleolo diuides verris initio. Iam progressu vere, melicrato hyssopi aut simili præparabis, & ut prius purgabis, aut ut veteres voluerunt. Amplissimam colocynthidem cauabis reiectis seminibus & interiore materia, tum vnde quaque induces pasta. Deinde cauatam colocynthidem passo aut alioquin vino dulci implebis, adiectis quatuor folijs rutæ & ʒ ss. cinnamomi, efferuebit vi-

**Colocyn-
thidis præ-
paratio.**

num

num in calidis cineribus, deinde per noctem
 finetur in colocynthide, postridie per linteum
 bene mundum percolabitur & bibetur, Post
 purgationem reficiendum corpus est. Post Cucurbitulæ
 tres inde dies, cucurbitulæ hypochondrijs af-
 figendæ sunt, deinde scapulis cum scarificatione.
 Aliquot diebus interiectis, iterum purgan-
 di sunt, ex eoque cucurbitulæ occipitio adhi-
 bendæ. Caput radendum est, aut certè deton-
 dendum. Comparanda cucupha, & per inter-
 ualla purgandum est, vt etiam autumnò, ad
 elleborum veniendum sit. Hoc autem modo
 veteres elleborum propinabant.

R^x fibrarum radicum ellebori ʒ ij. distem-
 perentur in ʒ j. melicrati, deinde siccantur
 in vmbra & puluerizentur, tum adiecto pa-
 ri pondere piperis, modico melli misceantur,
 vel è mulla propinentur. Galenus plurimum
 commendat hieram diacolocynthidos quæ el-
 leborum recipit. Tentatis itaq; leuioribus re-
 medijs, non est metuendus vsus ellebori.

Post hæc sternutatorijs, quæ puluerem
 radice pæoniæ recipiant & masticatorijs vten-
 dum erit.

Sanguisugæ etiam fronti & per ambitum
 capiti affigendæ sunt. Fuerunt in veteri medi-
 cina qui eunuchismū, id est castrationem ma-
 ximè probauerint, Formula sternutatorij.

DE EPILEPSIA

**Sternuta-
torium.**

R^z pyrethri, pulueris radice pæoniæ ana
 ʒ ij. nucis moscatæ ʒ j. ellebori nigri pulueri-
 zati ʒ s. fiat puluis, insuffletur in nares. Ea-
 dem quoq; præter elleborum mastice incor-
 porata, masticatorium efficiunt.

Conseruæ.

Vsus conseruarum acori, aut stœchados,
 theriacæ, mithridatij, maximè conuenit: idq;

**Electuariũ
Ralis.**

iam purgato corpore. Electuarium quoq; Ra-
 sis, cuius hæc est descriptio laudatur.

R^z pyrethri, seselios, stœchados ana ʒ x. aga-
 rici ʒ v. cardamomi recentis & acuti acrioris-
 que, assæ optimæ, aristolochiæ rotundæ, ana
 ʒ j. s. excipiantur omnia melle scyllitico, de-
 tur auellanæ magnitudo ieiunis.

**Scillæ præ-
paratio ex
Galenò.**

Galenus in libro de consilio in comitiali-
 bus, conquassatam scyllam vase meliteo, hoc
 est in quo antea mel repositum fuerit, aut alio-
 qui costum recondit: vas pelle inducit, & fi-
 deliter occludit, tum meridiano soli obuertit,
 prohibetq; aquilonibus, subinde aliter atque
 aliter obuertit, vt omni ex parte radij solis vas
 calefaciât. Scyllam colligit sub cane: quo tem-
 pore mel scylliticum præparat, sinitq; quadra-
 ginta diebus. Postremo aperto vase liquor
 qui è scylla desudauit, excipitur & melle addi-
 to dulcoratur. Dosis paruulis ʒ s. alijs ʒ ij. Ma-
 teria reliqua scyllæ cum melle subigitur, atq;
 eodem modo, sed non tam vtiliter, epilepticis

im-

imperatur. Alij succum scyllæ pari mellis pondere commiscant, vt fiat mel scylliticum.

PVEROS vero clementius habere oportet. In primis vitæ ratio instituenda est nutricia, quæ generet lac vtile, sed paulo calidius & siccius quàm temperatum sit. Pueri corpus molliter fricandum est & inungendum, tum etiam caput detonsum ex oleo anethino, ruta ceo, de maiorana, irino, adiecto pulueris momento cyperi aut ireos.

Pueri quoque modo curandi.

Cucupha quoque comparanda est. R̄ cy- Cucupha
peri, ireos florentiæ ana ʒ ij. s. selesios & pæoniæ ana ʒ j. capillorum veneris, florū anthos, & camæmeli ana ʒ j. macis, cinnamomi ana gr. viij. s. pul. pro cucupha. Sedes pueri inungatur melle & succo rutæ, vel salis granum immitatur podici. Paretur electuarium ex butyro & saccharo, quo etiam nutrix papillas mammarum illinat. Comparetur mel passu-
latum hoc modo.

Mel passulatum.

R̄ agarici troc. ʒ s. infundatur in aquæ ʒ ss. s. agaricum detrahatur, in eadem infusione de tracto agarico, passulæ bene pingues distemperentur dum turgeant. Turgidæ in noua aqua coquantur, ad extremum coctæ exprimantur in aqua, in qua coxerint. Expressio cum aqua rursus coquatur ad mellis crassitudinem. Paulo adultiores, vt qui secundum aut

DE EPILEPSIA.

tertium annum superant, passulis, prunis, ficubus, eo modo maceratis vti possunt, iisdemque electuarijs & passulato melli, puluis pæoniæ & hyssopi, adijci potest. Purgantur etiam ex ʒ iij. cassiæ, ex manna & penidijs præparatis vt ante dictum est. Radix pæoniæ concisa in taleolas & ita transfixa filo suspendatur è collo. Syrupus acetosus, melicratum, absinthij decoctum & cicerum rubrorum, vomitus iisdem conueniunt.

Epilepsia
per consensum
stomachi.

PER CONSENSVM A STOMACHO. Sanguis è poplite trahatur vel malleolo, eodem loco scarificatio fiat. Sæpe repetita purgatio ex his pilulis prodest.

Purgatio.

R̄ pul. hieræ picræ ʒ ij. agarici trochiscati, rhabarbari electi ana ʒ j. masticeis, santali citrini, macis, rosarum ana gr. vj. cum succo citri, fiant pilulæ, aut idem puluis incorporetur in ʒ ss. catholici, vt fiat bolus, aut omnia dissoluantur in sero caprino vel decocto cicerum rubeorum.

Unctio.

Inungatur stomachus cum olei masticeini ʒ j. coralli rubri, & pul. rad. pæoniæ ana ʒ ij. Corallium, radix pæoniæ, iaspis viridis è collo suspendantur, vt contingât stomachum.

Cæterum materiæ morbi habenda ratio est. Quibusdam enim gracilibus & iracundis in ieiunio influit in stomachum admodum sensibi-

sensibilem sanies biliosa: quibus panis per se, si non sitiunt: alioqui ex vino albo, tenui, diluto, austeriusculo, aut vino granatorum remedio est. Aliquando crapula in causa est, nonnunquam humor crassus & frigidus. His supradicti syrapi incidentes conueniunt. Eadem quoque purgatio & vomitus.

QVOD si ex spiritu venenoso, qui ex parte aliqua in caput attollitur, præliganda pars est, cucurbitula affigenda loco. Locus theriaca, mithridatio, contrita anagallide ruffa inducendus est, vicinia in vesicas attollenda ex sinapi, pipere, euphorbio incorporatis theriaca vel melle anacardino. Quod si locus præligari non potest, vt matrix, renes, cucurbitulis vtendum erit cum scarificatione. Postea purgandum est, si fuerit opus, & emplastra, vt prius, ad regionem partis apponenda.

Epilepsia
venenosa
uapore.

DE MELANCHOLIA.

Caput XII.

Melancholia nonnunquam vitio cerebri & capitis, quod cū calidius fit, sanguinem adurit, atque eo adusto fumi melancholici animam exagitant. Eiusmodi, ferè facie sunt admodum rubente, rubore quidem saturato & tandem liuescente. Quibus etiam aliquando adnascuntur pustulæ. Deinde etiam

Causa.

DE MELANCHOLIA.

qui flauo sunt colore, quibus caput calidius bilem adurit: ἰξτερόθυος ἢ λίου χροῶς καὶ ζαυθός, quisquis author fuit libelli de Melancholia appellauit. Alij vero vitio lienis aut hepatis melancholicum

Signa. sanguinem, toto corpore colligunt. Tertium genus est melancholiæ, quæ Hypochondriaca nominatur. Horum signa & phantasmata ex libello de melancholia Aetius trāstulit. Quædam etiā Aurelianus adnotauit in chronicis.

Curatio. Itaq; initio mali repellētibus vtendum est. oxyrhodino, aut mixta materia media, vt chamæmelino.

Phlebotomia.

Phlebotamiam omnes ferè imperant, atq; in primo genere cephalicam, in secundo ac tertio, mediam referant. Hippocrates in libro de Virginibus scripsit, virgines fieri melancholicas, resistente mēstrua purgatione; idq; multo magis, si vruntur amoribus. Idem quoq; viduis accidere consuevit, dum curis & mœrore animam conficiunt. In ijs enim ex vehemēti animi motu cerebrum laborat, atq; ideo infirmatur, refluit ab vtero ad cor vitiosus sanguis, atq; ita animam corrumpit. Iis vena maleoli aperienda, aut idem locus per interualla repetita scarificatione, lacerandus est. Probatum etiam vena, quæ inter annularem & minimum, vel medium & annularem digitum excurrit. Perseuerante malo, vena in fronte diuiditur.

ditur. Oportet autem latum vulnus inferre venæ: & siquidē sanguis crassus est, semel ac plurimum detrahere.

ALIMENTA è media materia instituen- Videtur ratio.
da sunt, panis triticeus bene coctus, vinum album tenue, odoriferum. Omnino cruditas vitanda est, & potus sine cibo, vel in fine pastus.

Clysteribus per intervalla vtendum est, pri- Clysteres
mum quidem leuioribus, qualis hic est.

R̄ furfurum, hordei ana M j. summitatum anethi, chamomillæ, meliloti ana M s. seminis rutæ & fœniculi ana ʒ ij. fiat decoctio ad ℥. j. in colatura dissolue mellis anthosati, sacchari rubri ana ʒ s. olei ʒ iij. Postea vero decoctioni adijciemus polypodij ʒ j. atque aliquando dissoluemus cassiæ aut catholici ʒ vj. aut hieræ picræ ʒ s. vel diaphœnici aut diaprunis tantundem.

Ex quo materia purganda est, sed præpara- Digestio.
nda prius leuioribus quidem remedijs, quæ in epilepsia diximus, & cap. de incubo, cum his etiam.

R̄ succi borraginis, succi buglossæ depura- Syrupus,
torum ana ℥. ij. succi pomorum odoriferū, ℥. iij. folliculorum senæ ʒ iiij. se. anisi & fœniculi ana ʒ ij. sena distemperetur diem integrum in succis, deinde leuiter bulliat, & cum sacchari ℥. j. fiat syrupus clarificatus & aro-

DE MELANCHOLIA

matifatus eum modico macis. Dosis \mathfrak{z} ij. cum aqua buglossæ, borraginis, lupulorum, fumarizæ, cuscutzæ, aut sero lactis.

Purgatio.

Melancholia leuiter & per breuia intervallo purgari debet. Itaque folia senæ \mathfrak{z} s. \mathfrak{z} vj. \mathfrak{z} j. è iusculo galli decrepiti, gallinæ, pulli, aut alterius carnis vel piscium decoquimus, deinde sorbetur iusculum: alioqui foliorum senæ \mathfrak{z} s. seminis anisi, cinnamomi ana \mathfrak{z} s. florum anthos & borraginis, florum violarum ana p. j. fiat infusio vel decoctio in sero caprino. Aliquando \mathfrak{z} s. cassiæ aut catholici adiicimus. Galenus & reliqui medici Græci, probant purgationem ex pul. hieræ picræ \mathfrak{z} j. pulueris epithymi \mathfrak{z} ij. Sed hæc purgatio ætate non conuenit, potiusq; vtendum erit cassia aut catholico dissoluto in sero lactis. Serum in quo medicamenta dissoluuntur, hoc modo melius fit.

**Serilactis
preparatio**

R \mathfrak{x} summatum absynthij & fumarizæ ana p. j. trium florum cordalium ana pugil. sem. fiat decoctio aut infusio supra calidos cineres, in colatura expressa dissolue medicamenta. Vbi vigiliz vrgent, poteris hoc imperare.

R \mathfrak{x} trypheræ persicæ \mathfrak{z} s. specierum hieræ picræ Galen. \mathfrak{z} vj. epithymi, pul. foliorum senæ \mathfrak{z} iiij. cum modico saccharo violato, fiat mistura, dosis ad \mathfrak{z} s. dissolutam in sero lactis caprini.

Pulue

Pulueres quoque subinde imperandi sunt & condita.

R̃ pul. electuarij lætificantis ꝓ iij. sacchari rofarũ & violarũ ana ꝓ s. dẽtur ꝓ iij. in cochleari cum modico vino albo odorifero. Aut. Conditum.

R̃ Electuarij lætificantis & diamargaritonis ana ꝓ ij. sem. citri, melonum, cucumeris, citrullorum ana ꝓ j. macis, spicæ ana ꝓ s. sacchari rosati quantum satis, fiat mixtura, aut si vis, incorporentur in conseruæ, borraginis, buglossæ, ros. ana ꝓ s. fiat conditum. Mixtura.

Balnea temperata per interualla conueniunt. Cucurbitulæ leues in hypochondrijs, quę discutiant flatum, atque vbi dolor est, cum scarificatione. Balnea.
Cucurbitulæ.

VBI verò pertinax morbus est, secundæ venæ capitis & sanguisugæ affigendæ. Aperientæ infernæ purgationes, vis pharmacorũ augenda est, imperandaque hiera diacolocynthidos, quæ epithimum aut senæ puluerem, deinde etiam quæ elleborum recipiat. Curatio
morbi con-
tumacioris

Elleborismis quoque vtendum est. Nec enim frustra dictum est ab antiquis, indigere elleboro, qui mente non ita constarent. Itaque sic imperabis. Ellebori
usus.

R̃ pul. hieræ diacolocynthidos ꝓ iij. pulueris epithymi & foliorum senæ ana ꝓ ij. excipiantur modico melle, deinde in sero caprino

DE MELANCHOLIA.

dissoluantur, fiat potus. Postea vero hieram diacolocynthidos hoc melle incorporabis.

Mel helle-
boratum.

R^z ramentorum hellebori ℥ j. fiat infusio per dies tres in aquæ pluuialis ℥ iiij. deinde lento igne decoque ad tertias, colaturæ addatur mellis optimi despumati ℥ ij. huius mellis cochleari pulueré hieræ diacolocynthidos miscebimus, reliquū mel seruabimus, & per interualla cochleare dabimus dissolutū in pingui iusculo exhibebimus, vt incitetur vomitus.

Ellebori
alia præparatio.

Alius modus parandi ellebori. Raphanus acerrimus in taleolas diuiditur, ramentorum ellebori ℥ iiij. taleolæ configuntur, transfixas sub dio per noctem collocabis. Postridie ramenta detrahes, & ita diligenter vt nihil remaneat elleb. Ex quo in oxymelite taleolas tribus horis macerabis, maceratas comedes & oxymel superbibes. Post horas aliquot vomitum ciebis.

Fotus.

Quod si venter flatuosus est, fouebis oleo in quo rutæ, anethi, dauci, cumini & similium semina coxerint, eademque semina in puluerem redacta adiecto piperis & cinnamomi momento, melle anthosato excipies & ita exhibebis.

Dropax.

Dropax calidus proximè descriptus breuib^{us} interuallis ventriculo adhibetur & toti metaphreno.

DE CATARRHO.

Caput XIII.

Catarrhus nomē generale, defluxus aut destillatio, nam *κατάρχω* verbū id sonat: peculiariter defluxus est à capite in fauces. Catarrhus itaq; alius pituitosus, tumque distentio est, faciei pallor, frigiditas capitis, ad somnum inclinatio, piger motus, hebes anima & sensus, vox per nares obmurmurat intercepta via. Adde temperamentū, locum, animi constitutionem, rationem vitæ, vrinæ quoq; crudiores sunt.

Catarrhi
pituitosi
signa.

Aliud calidus est, ferè à pituita salsa, aut alioqui acri humore. Hic totius capitis dolor est, rubent oculi, interiores partes oris exulcerantur, adde & cætera externa & vrinas magis coloratas.

Catarrhi
calidi signa

Catarrhus aliquando per venas & arterias diffluit in corpus. Hic ferè ceruicis, scapularū, membrorum & lumborum dolor est.

Catarrhi
per uenas
fluentis
signa.

Catarrhus vbi levis est & frigidus, foris capitis ex linteis calentibus, vt calor in profundum subeat, leui gargarismo, caput purgijs curari potest.

Curatio
frigidae.

Rx ros. M. j. f. d. in aqua cū modico aceto, vnde leuiter abluat os, vel vtatur modico conseruæ ros. vel syrupo ros. de ros. siccis. Caput pur.

Gargarismus.

Rx seminis nigellæ romanæ 3 ij. s. anisi 3 j.

Caput purgandum.

DE CATARRHO.

conquassata frigantur in sartagine cum leui asperſione aquæ maioranæ ſ. nodulus, applicetur naribus. Quod ſi venter reſiſtit. $\frac{3}{4}$ ſ. caſſiæ quarta parte horæ ante cibum imperabis.

Curatio
calidi.

Vbi verò calidus eſt ſed leuiſ, balneū aquæ dulciſ ſatis eſſe poteſt : aut inunctio capitiſ & frontiſ è roſaceo, è caſeo molli & recenti, è catuliculiſ lactucarum ſubactiſ ex oxycrato, ſacculuſ è roſiſ. Quod ſi purgatio imperanda eſt, quia reſiſtit aliuſ, caſſiam, mânã, imperato.

Catarrhi
ſuffocatiui
curatio.

Vbi verò vehementior catarrhuſ eſt maiora remedia ex uſu ſunt. Quod ſi ex vehementia catarrhi, quod ſæpe fit, præſenſ ſuffocatio imminet, clyſteribuſ acriuſculiſ ſtatim vtendum eſt, in quibuſ hieræ picræ $\frac{3}{4}$ ſ. diſſoluta ſit. Quod ſi corpus ſanguineuſ & bene carnoſuſ eſt, vena in brachio, anguſto foramine aperienda eſt. Cucurbitulæ ſcapuliſ & brachijs affigendæ, totuſ thorax ex oleo de hilijs, de lino, amygdaliſ, nucibuſ, chamæmelino, butyro recenti, cocta radice althææ, & cū axungia gallinæ aut ſimili, vel butyro malaxata inungendus eſt. Gargarifmata quæ reprimant fluxionem, cuput purgia, frictioneſ & vincula, quæ eandem diuertant, imperanda ſunt.

Ratio uſus.

Vbi verò nulluſ tale accideſ interturbat curationem catarrhi, frugaliſ vita imperanda eſt, cœna nulla aut pauca, declinatio à ventis,
ſoliſ

solis & lunæ radijs, abſtinentia à vino, & rebus vaporofis, à ſomno diurno, qui etiam noctu breuior eſſe debet. Vrantur hordeato, auenato, vbi reſiccandum. Conuenit etiam oryzogala, amygdalæ cum ſaccharo roſato, vbi retinenda deſluxio, incrassanda & coquenda. Aqua frigida ore colluta, in calidis: ſubtepida, in frigidis conuenit. Secunda menſa carne cydoniorum, pyris austeriuſculis & coctis, poſt etiam coriandro vti oportet, vt confirme tur venter & ſumi prohibeantur. In frigido, vino quidem vti licet, verum modico. In paſtu medio, non frigido, ſed refracto aqua ſubtepida, aut pane toſto. Clyſterum vſus ſed mollium probandus eſt.

Phlebotomia à Græcis ſerè omiſſa & Arabib. niſi vbi ea adſunt quæ Meſue annotauit. Venæ ſectio.

Purgationes initio leuiores, qualis eſt caſſia ad ʒ j. aut ʒ x. imperata, ac per interualla uſurpata, cui aliquando in fluxione calida addere licet, electuarij de ſucco roſarum ʒ ij. Iam progreſſo morbo, & vbi ſigna coctionis apparent, poterit catholicon imperari ad ʒ vj. adiecta infuſione ʒ ij. agarici & ʒ. ſ. rhabarbari. Nonnunquam etiam in his catarrhis imperamus rhabarbari infuſi ʒ iiij. pulueriſati vero ʒ ij. qui diſſoluantur in hoc decocto.

Rʒ paſſularum, hordei ana p. j. trium flo-

DE CATARRO.

rum cordialium, liquiritiæ rasæ ana ꝓ. ij. f. d. pro vna dosi, in qua dissolutum sit rhabarbarum, &c. Post hæc etiam iam bene maturato morbo, fortioribus licet vti.

Cura particularis.

Peculiariora verò remedia alia continentur ore, alia deuorantur, nonnulla naribus applicantur, eaque aut retinent, aut leniunt, & concoquunt, aut repurgant.

Catarrhum sistunt.

Retinent. R. ros. hordei, agrimonie ana ꝓ. j. f. plantaginis, papaueris albi, portulacæ ana ꝓ. j. f. d. ad ꝓ. iiij. in colatura dissolue diamori ꝓ. j. vini granatorum ꝓ. f. Aliud

Gargarisanda.

R. aquæ hordei non excorticati ꝓ. iiij. diu nuci ꝓ. j.

R. iulepi rosacei ꝓ. iiij. syrupi myrtillorum ꝓ. j. Aliud.

R. aquæ rosatæ ꝓ. iiij. caphoræ ꝓ. f. Aliud.

R. corticum papaueris, ros. siccarum ana, ꝓ. ij. boli armeni ꝓ. ij. f. d. Hæc ore continemus, & inde os leuiter colluimus, alioqui fiunt pilulæ quæ in ore continentur.

Pilulæ.

R. boli armeni loti cum aqua ros. terræ sigillatæ lotæ cum decoctione papaueris ana ꝓ. j. electuarij diatragacanthi frigidi cum oui albumine dissoluti ꝓ. f. cum modico syrupi ros. de siccis f. pilulæ ad magnitudinē lupini. Aliud.

R. anisorum, coriandri præparati ana ꝓ. f. Trochi sci. macis, cinnamomi, spicæ, ireos, coralli rubri ana

ana ʒ j. se. papaueris albi, opij in vino cocto
 macerata ana ʒ j. gummi tragacanthi, masti-
 cis ana ʒ j. omnia incorporentur in succi liqui-
 ritiae ʒ j. cum leui affusione syrupi myrtillo-
 rum, t. trochisci pondere ʒ s. Possemus vti solo
 tragacantho, terra sigillata: & in frigido ca-
 tarrho, spica.

VBI leniendum est liquiritiae succus ma-
 xime conuenit aut d. pectoralis Rasis. Ad lenien-
dum.

R̄ iuiubarum nu. xx. sebesten nu. xx. pas-
 sularum enucleatarum ʒ j. violarum sicarum Decoctio
pectoralis
 ʒ s. liquiritiae rasae ʒ vj. carica. nu. x. f. d. in ʒb
 iiij. aque, dum redeat ad vnam, adde si vis seme
 bombacis, capillos veneris, & alia quae infici-
 dunt & repurgant. Post initia vtendum est e-
 lectuario diaireos, immiscendumque est ele-
 ctuarium diatragacanthi. quale hoc erit.

R̄ electuarij diatragacanthi frigidi ʒ j. dia-
 ireos simpl. ʒ s. f. pul. teneatur in ore. Ve-
 rum vt minuitur catarrhus, & maturatur, plus
 diaireos miscendum erit.

RETINENTIBVS vtendum est cum Ad Reten-
dum.
 fluxio vehementior & periculosior, aut etiam
 vbi leuis est. Sed hic ferè sine purgatione cor-
 poris, illic post purgationem. Vtuntur suffu-
 migijs quale hoc est. Suffumigia

R̄ olibani, sandaracae ana ʒ ij. f. d. in vino
 astringente, excipiaturn fumus. In frigida.

DE CATARRHO.

- Calida.** *R* ligni aloes, costi ana \mathfrak{z} ij. galliæ mosc. \mathfrak{z} f. olibani, sandaracæ ana \mathfrak{z} j. cum styrace liquida f. pilulæ & super prunas suffumigiū excitetur. In calida, suffumigia fiunt hoc modo.
- Frigida.** *R* santali citrini \mathfrak{z} f. ros. viol. ana p. ij. f. d. in aqua, & deinde suffumigium. Utendū quoque pomis odo. est, vt prius, cucuphis & alijs rebus roborantibus cerebrū, ligatione in duobus digitis manus dextrę, stuphis siccis, postremo etiam cauterio, hoc modo. Radatur caput in sincipite medio, qua parte sutura coronalis est, fricetur locus calente linteo, sinapismus aut phœnigmus applicetur, vesicæ excitentur & diu, contineantur, vt fluant. Caules itaque ad ignem calefactos axungia porcina inunges & superpones loco, quibus si nihil proficitur, cauterio vtendum est.
- Cauterium**

DE OPHTHALMIA.

Caput XIII.

Ophthalmia quid.

Ophthalmia inflāmatio est eius tunicæ, quæ adnascitur corneæ *ἐπιπεφυκίται* vocant, hæc producitur à pericranio, à quo vasa diducuntur in oculum per frontem mediam & tempora. Itaq; ferè superficialis inflāmatio est cū rubore, dolore, tensione, quæ vt augentur, ita affectus magnus est: exiguus, vt minuuntur. In exiguis inflammationibus, maioribus

ribus remedijs opus non est, sed ros. succo, Curatio le-
 oui liquore tenui, aqua ros. aut plantaginis, la- uioris.
 ãte mulieris vel asinæ curari potest. Oporter
 hos succos instillare oculis, eosdemq; cõtege
 re panniculo lineo iisdẽ liquoribus insuccato.
 Postea verò iam declinante malo, santalos ci-
 trinos, modicum macis aut spicę, in qua aqua
 ros. feruefacta, adhibebimus. VBI verò gra- Curatio
 uius malũ est phlebotomia, arteriotomia, cu- maioris,
 curbitulæ, sanguisugæ, scarificatio, purgatio,
 cauterium, paracentesis, fortiora collyria &
 localia remedia instituenda sunt. Vbi cætera Venæ se-
 consentiunt dolor quoq; vrget vehementius, ctio.
 ac rubur & tensio maior est, subducta sponte
 sua vel molliori clystere aluo, cephalicam ape-
 rito eiusdem lateris amplo vulnere, & quan-
 tum tolerant vires sanguinem ei cito.

Tum si fuerit opus, paululum recreatis Purgatio,
 viribus leui pharmaco purgato. Hippocrates
 de locis in homine metuit, ne fortiori phar-
 maco humores corporis agitati, confluant in
 oculos. Quod consilium multis è recentiori-
 bus medicis probatum est. Itaque si biliosus
 sanguis est, quem ferè dolor acerbior sequi-
 tur, rhabarbaro, cassia, manna, catholico, ele-
 ctuario de succo ros. hiera picra ventrem sub-
 duces. Dissoluantur hæc æstate in sero lectis,
 decocto violarum & hordei: reliquis tempo-

DE OPHTHALMIA

ribus in decoctione pectorali. Fortiores sunt pilulæ autæ, pilulæ lucis, hiera diacolocynthidos. Si pituita, ex hiera picra, pilulis alephanginis, agarico mixtis, formentur pilulæ. Diaphœnicom similiter ex usu est, pilulæ fœtidæ & cochix. In melancholicis hiera rufi, hiera diacolocynthidos addito epithymo aut folijs fenę. Per interualla clysteres & suppositoria loco purgationum esse possunt, alioqui reuocandæ sunt purgationes.

Cucurbitulæ.

I A M bene purgato corpore, cucurbitulæ scapulis & initio ceruicis insigendæ sunt, vbi & scarificatio conuenit. Siquidem locus admota cucurbitula vehementer intumescit, atque vbi grauitas est capitis.

Venæ sectio.

PER SEVERANTE malo vena frontis, vel quæ in sincipite apparet, quæ post aures, quæ in temporibus, in quibus ea eligenda est, quæ tumet, rubet, pulsat magis cæteris. Reliquas inflammationis, vacuat ea vena quæ ad maiorem angulum est. Loco phlebotomiæ nonnunquam hirudines inducuntur. Cartilago quoq; auriculæ scarificatur. Quæ vena ad pollicem vergit, mediæ ramus est, quæ initio secta plurimum diuertit, & viribus minus detrahit, quàm secta cæphalica. Arteriotomia locum habet vbi calidus & spumofus sanguis est, cuius rationē describit Gal. ad finē 14. me-

Arteriotomia.

thodi

rhodi medendi, & Mesue cap. de Ophthalmia. Cauteria tum ad coronalem futuram vt prius, Cauteria. post aures, in occipitio è regione oculi laborantis, in ceruicis initio, imprimi possunt.

Paracentesis fit hoc modo. Præhendes digitis cutem cum carne, quæ initio ceruicis est Paracentesis. ad cauum occipitij, tum acum traductâ, filo serico satis crasso transfiges, & ita locum peruium ad triginta aut xl. dies permittes, per interval- Topica. la sublato, ac deinde reposito filo. TOPICIS verò hoc modo vtendum est. Initio quidē reprimendū, augmento aliquid coquentiū & reprimentiū vtendū est. Vt verò procedit morbus hæc augenda sunt & minuenda, quæ reprimunt, postremo roboranda pars est. Fovetur itaq; oculi ex decocto viol. ros. sem. psyllij, papaueris albi, corticis radice mandragoræ, folijs populi, salicis, rubi, myrti & similibus, distincta ratione ex natura humoris, qui fluit. In augmento decocto maluarum, althææ, cydoniorum, adiecta modica quantitate eorū quæ reprimunt. Præcedente morbo flores camomillæ, anethi, meliloti miscendi sunt. Postremo etiâ sænugræci decoct. Vbi reprimendum aqua communi, aqua ros. aut plantaginis decoctio fit. In augmento lacte, postea etiam vino diluto. Itaque vbi topicis vtendum est, fovendus locus decoctione frigida aut tepida si

DE OPTHALMIA.

lemæ adfunt, & pertinacius inhæret pituita. Tum medicamentum oculis instillandum, postea gossipium madefactum liquore conuenienti, linteolo lineo inuoluitur, linteolum similiter insuccatur, & ita oculo insternitur, tum ita alligatur fascia, vt nec oculus grauetur, aut doleat. Oportet enim quæ adhibentur oculis leuia esse, mollia, præterea sine morfu, sine emplastica & viscida natura, quæ pertinacius inhæreat & celerius indurescat. Quater in die remedia innouentur, aut etiam sæpius, si vrget dolor. Quod si per exteriores partes (quod sæpe fit) fluxio est, frons & tempora reprimente emplastro inducenda sunt. Conueniunt itaq; initio aqua ros. oui liquor tenuis, lac muliebæ aut asinæ, succus ros. conserua ros. cum oui albumine, muscilago semin. psyllij & similia, vel hæc composita.

Deffensiuæ.

R̄ succi mororum agrestium resiccati. ʒ iiij. quas cum oui albumine commiscebis, & rursus siccabis, vsus tempore ʒ ij. pulueris in lacte muliebri & aqua ros. dissolues, vteris autem vt supra dictum est. Oui albumen agitatū & despumatū cum decocto papaueris albi, aut aqua ros. vtile est. Aliud.

R̄ mucilaginis, se. psyllij, se. cydoniorum extractæ in qua papaueris ana ʒ j. liquoris tenuis o. ii ʒ vj. camphorę gra. viij. croci gr. iij. Vbi
dolor

dolor vrget vehementius vtendum est opio,
sed ab eius vsu oculos decoct. meliloti tepido
aut simili fouendus. Collyrium album.

Collyrium
album.

R̄ gummi Arabici, tragacanthi, amyli ana
℥ j. cerussæ lotæ ℥ j. s. opij gr. vij. cum oui al-
bumine fiat collyrium, vsus tempore ℥ ij. in la-
cte muliebri dissoluatur. C R. Esciente morbo.

R̄ cerussæ plumbi lotæ cum aqua ros. & sic
cata ℥ ij camphoræ ʒ s. cum oui albumine fi-
at collyrium: vsus tempore dissoluatur in la-
cte. Toto reliquo tempore morbi licebit vti
sief albo cum opio, si vehemens dolor est: im-
minuta dosi opij, si non tam vehemens: omni-
no sublato opio, si leuis est: sed addere oportet
in augmento sarcocollæ nutritiæ in lacte mu-
lieris ℥ j. & vt procedit morbus in declinatio-
nem augenda sarcocollæ dosi est, & tandem
sola sarcocolla nutrita in lacte & vino, vel aqua
fœniculi, dissoluta vtendum est. Mucilago
psyllij initio: cydoniorum in augmento: lini
aut althææ in statu: fœnugræci in declinatio-
ne conuenit, sed ab vna ad alteram, paulatim
transeundum est. I N declinatione.

In aug-
mento.

Mucila-
gines.

R̄ sarcocollæ nutritæ ℥ iij s. croci, spicæ
aloes an. gr. vj. Aloe lauetur in aqua fœniculi
huius pulueris ℥ ij. in aqua fœniculi dissoluan-
tur aut aqua ros. si quid ruboris & caloris su-
perest. Aliud. Ouum crudum coctū & ita in-

In declina-
tione.

DE OPTHALMIA.

duratam calidum per se, vel è lacte muliebri subactum applicabis. Pulvis citrinus, quo v. tendum est in augmento & statu,

Pulvis citrinus.

R^x sarcocollæ 3 v. aloes lotæ in aqua ros. 3 j. tragacanthi 3 f. opij 3 f. & gra. vj. Quo tempore ouum crudum integrum sine testa per se vel cum lacte muliebri exceptum toto apponi potest. Roborando oculo vinum astringens dilutum aqua fœniculi, in qua spica aut stœchas coxerit competit. Frontalia.

Frontalia.

R^x Mannæ thuris, mastice ana 3 ij. agitentur ex oui albumine. Aliud.

R^x farinæ fabacæ M. j. cum oui albumine f. emplastrum. Aliud.

R^x myrrhæ, thuris ana 3 ij. farinæ volatilis M. f. cum oui albumine f. frontale. Aliud.

R^x boli armeni 3 j. aquæ ros. 3 iij. aceti 3 j. cum duobus albuminibus ouorum f. frontale. Balneum in declinatione imperari potest.

Balneum.

Errhina quoq; gargarismi & masticatoria. Neque omittendæ sunt frictions initio ductæ superne deorsum, ad diuertendum.

Frictiones.

DE DEBILITATE VISVS

Caput XV.

Myopes qui dicantur.

Mῶπας Græci vocât, qui à primo ortu nō nisi admota oculis cernūt, idq; exerris propè oculis, palpebris constrictis atq; coniuventibus

pentibus, id quod efficit tunicarum oculi ra-
 ritas, tenuitas humoris, subtilitas spiritus vi-
 sorij, qui priusquam angulum faciat, dissolui-
 tur atq; euanescit. Sunt qui eo nomine etiam
 vespertinam aciē appellant, cum interdiu ob-
 scurè, noctu & sine lucerna acutius videant.
 Rara affectio hominibus, ab eadem causa, nisi
 quod illis infirmitas maior est, hic lucē qui-
 dem diffluit spiritus, nocte cogitur atque tem-
 peratur. Contra verò *νυκτῶπις* interdiu vidēt, *Nyctalop-*
 caligant ad lucernam, quanquā & hoc nomen *pes.*
 nocturnæ cecitatis ad myopas etiam transfe-
 rant, vt Octavius. *Α'μαύρασις* & *ἀμβλυοπία* hebe-
 tudinem atq; obscuritatē visus ita distinguūt:
 quod illius multæ causæ notæ sunt; huius nul-
 la causa manifesta est. Quia enim pupilla dura
 sit, neq; vitiū vllū apareat in oculis, videndi ta-
 men libertas intercepta est. Cuius tamen con-
 iectura quadam curationem molimur, medi-
 camentis quæ *ὀφθαλμικῇ* & *ὀφθαλμικῶ* appellant;
 quia videlicet cū nullum accidens manifestū
 insit oculis, acuunt tamen visum atq; insta-
 rant; causa verò vtriusque mali, vel in humo-
 ribus oculi, vel in natura visorij spiritus, vel
 in tunicarum habitu, vel quia interceptus est
 aut resolutus neruus opticus. Summatim in
 ijs, quæ natura ad legitimam videndi faculta-
 tem instituit, spiritus neq; crassior neq; tenui-

Quid ad be-
 ne uidendū
 requiratur,

DE VISVS DEBILITATE.

or esse debet, sed aerea natura, tum substantia tum qualitate moderata, iusta etiam quantitate: quæ omnia pendent à natura sanguinis & pituitæ, in quibus substantia est spiritus. Temperatus enim sanguis eundem spiritum gignit: intemperatus verò vitiosum reddit. Subtilior spiritus obscuro in loco melius habet, ut in vespertina acie. Tenebris enim cum colligitur, crassescit, & frigidior redditur. Idem efficit, ut & minima cernamus, & pingamus calamo, sed tantum ea, quæ in proximo sunt. Contrà verò crassior spiritus, ut in senioribus, remotius posita intueri potest, tantum cernit maiuscula, eademque calamo fingit, ex quo inuenta est ratio Opticorum in specularibus, ut conuexa, minores: concaua, maiores: plana æquales formas & literas repræsentent. Ut enim oculares radij maiorem minorēue angulum describunt, ita formæ oculis proponuntur. Hæc vitia magna ex parte ab humorum vel vaporum crassitie excitantur, multòq; maximè si derepente orta sunt, & grauitas sentitur in radice oculorum.

Curatio
Sang. mis-
sio.

A P E riatur itaque primum cephalica, si res postulat, alioqui si cacochymum corpus est, purgetur hoc modo.

Purgatio.

R̄ pul. hieræ picræ Gal. ʒ ij. pul. hieræ dialococynthitos ʒ i. castorei ʒ ss. se. fœnic. nucis moscatæ

moscata ana grana vj. cum succo rutę, formetur pilulę. Possunt & pilulis cochijs, pilulis lucis, alephanginis mixto agarico purgari. Molles teneatur aluus pilulis factis ex 3 j. aloes 3ij. terebinthinę vel casisę: alioqui polypodio, cartamo, mercuriali, senna, parietaria, iusculo concoctis. Tum errhinis, apophlegmatismis, sternutatorijs vtendum erit.

Cucurbitula occipitio fixa cum scarificatione, ea vi obstructions liberat, vt ea ipsa etiam dum hærente, aliquando visus sit restitutus. Constrictio colli ita spiritum impellet in oculos, vnde inde ampliatis vijs & spiritu liberior, visus reddatur, aut certè acuat.

Cucurbitulę.

Post hæc extrahendus sanguis est ex angulis oculorum. Rasis etiam è fronte. Mesue è naribus.

Sang. mis-
sio à capite

TOPICA infinita propè describentur, quę ex varijs authoribus colligi possunt. Tradunt capreas noctu non minus cernere, quàm interdiu, & ideo caprinum iecur, si vescatur, restituere vespertinā aciē ijs, quos nyctalopas vocāt: idem iecur assum & cum sale comestum iuuat: aut sanie, quę inde effluit, dum assatur, oculos illinunt. Alij vaporem elixati iecoris oculis excipi iubent. Sunt qui hirci potius quàm caprę, & hirci montani iecur imperant. Nónnulli configunt caryophyllis, alij

Topica.

Hepar ca-
prę.

DE VISVS DEBILITATE.

**Mali granati
succus.**

irrorant aqua sceniculi, hocq; remedium commune faciunt myopibus, qui tantum nocte vident, Octavius & Herophilus, quod nun probat Aetius. In senectutis magis, quàm oculorum vitio succum mali granati optimo melli equaliter commiscebis, aliquot dies insolabis, aut calidis cineribus coques. Alij granatum acidum, deposita duriore testa contundunt, melli miscent, concoquunt, ac tandem vehementer exprimunt, eidem remedio, fœtori oris, firmandis gingivis, ozænis.

Herbæ.

HERBÆ conueniunt sceniculum, ruta, chelidonium, euphrasia, verbenæ, asparagus, betonica, chamædrys, raphanus, balsamita, pimpinella, caryophyllata, apiū, maiorana, marrubium, parietaria, hyperici flores, meliloti & rorismarini. Aromata, macis, cinnamomum, nux mosc. lignum aloes, spica, santali. Conseruæ enulæ, acori. Horum omnium vsus est, vel quia eduntur, vel quia musto feruent, aut in puluerem redacta sicca collyria faciunt, aut melli commiscetur, vt eorundem succus, aut in alembico destillantur. Redditur aqua efficacior, si quid mellis liquidioris cōmisceas dum distillantur, atq; hac etiam fortior, cum mel scylliticum in alembicum conijcitur.

**Lactuca
syluest.**

Lactuca syluestris olim laudata est, cuius rei argumentum quod Aelianus scribit, accipitrem

pitrem tinnunculū (quercerellam esse volūt)
acerrimo lactucæ syluaticæ succo, oculos illi-
nire, atque ita laborantem aciem instaurare.
Quod deinde medici secuti sunt, atque hinc
oculorum medicina hyeracia, quasi accipitra-
ria vocata est.

Aqua quam scribunt restituisse visum cæ- *Aqua pro-*
co nouern annorum. *bara ad o-*
culos.

R^z succi apij, fœniculi, verbenæ, chamæ-
dryos, pimpinel. caryophyllatæ, saluiæ, cheli-
do. rutæ, centinodiæ, morsus gallinæ, caryo-
phyl. farinæ volatilis, ana ʒ j. piperis crasse
triti, nucis mosc. ligni aloes ana ʒ iij. omnia
immergantur in vrina pueri incorrupti, & se-
xta parte vini maluatici, bulliant breui tem-
pore, tum exprimè & percola, repone vase vi-
treo bene obturato, hora somni singulas gut-
tas singulis oculis instilla.

Dum efferuescit mustum, euphrasia inijci-
tur, vinum repurgatum asseruatur, singulari
remedio. Eiusdem herbæ puluis sorbili ouo
inspergitur, aut inde sal *ὀξύδωρον* paratur. *Vinum eu-*
phrasie.

R^z salis communis ʒ j. euphrasiæ siccæ *Sal oxyde-*
ʒ ij. macis, cinnamomi ana ʒ j. misce. Flores *isicum.*
roris marini, amphora vitrea concluduntur,
quæ duplicato linteo cerato obtegatur in are-
na, vt mos est Chymicis, id est alchymistis, li-
quor redditur efficacissimus oculorum clari-

DE VISVS DEBILITATE.

Accipiter. tati. Accipiter vnguento susino decoquitur, vinum absinthites aut rhodinum, antimonium, tutia in aqua fœniculi extincta. Pica a-
Pica auis. uis in testaceo vase cremata & in cinerem redacta, vehementer laudatum remedium à practicis.

℞ fileris montani, maioranæ, euphrasæ, rutæ, chelidoniæ, summitatum fœniculi ana ℥ iij. zingiberis, spicæ nardi, piperis longi, caryophyllorum, tūtix extinctæ & nutritæ, sarcocolæ nutritæ in lacte asinæ, ligni aloes ana ℥ j. fellis aquilæ aut accipitris, balsami ana ℥ i. mellis ros. ℥ j. conquassentur conquassanda, liquabilia liquefiant, misceantur, & æstate quidem 40. diebus insolentur, semper agitando & obuertendo vas: hyeme in cineribus moderatè calidis, similiter macerentur, reponantur vase vitreo ad vsum. De vsu viperarum alio loco. Vt vis medicamenti facilius penetret, aqua tepida è coto vel molli linteolo fouebis oculos. Frequens vsus trypheræ minoris, chebul. conditi. mithridatici, & theriacæ, sed magis hyeme commendatur. His autem vti oportet iam bene purgato corpore, vt etiam sinapismis & cauterijs. Rationem vitæ & reliqua remedia localia ex alijs colligito.

DE CATARACTA.

Caput XVI.

Cata-

Cataracta Barbaris præcipientem decubium humoris significat: hocq; nomen positum à practicis, quia suffusionem existimant fieri defluxu aquæ in oculum, unde & aquam descendantem in oculum appellant. Galenus 2. de Symptomatum causis & 7. de placitis Hippocratis & Platonis suffusionis causam facit, crassitudinem tenuis humoris, qui pupillæ meatum intercipit, ne possit communicare radius externus cum crystallino humore. Tenuis is humor, albugineus à quibusdam, medius est inter rhagoidé & crystallinū humoré, quo crystallinus humor præcipuū instrumentū visus, partim fouetur, partim (*alijminuitur*) munitur, vt lux refringatur, nec lædat crystallinū. Pupillæ foramen via est spiritus animalis, aut etiā radiorum, qui à rebus externis ad videndi facultatē importantur. Præclusa itaque via, quia videlicet humor ille albugineus longè crassior seipso factus est, suffusio fit, quæ ὑπόχυσις & ὑπόχυμα dicitur à Græcis. Nascitur hoc vitium sæpe consortio stomachi, sæpe etiā primario vitio cerebri, atque priusquam ad curationem accedas, id ipsum diligenter distinguendum. Distingues autem ex cap. 1. lib. 4. de locis affect.

QUOD si vitio stomachi, vomitu, purgatione ex hiera picra, frugaliore vita, & inte-

Curatio si
ob stomachi
vitium
contingat.

DE CATARACTA.

gra concoctione, consensu Græcorum & Arabum, curari debet. Oportetq; & vomitum & purgationem ex hiera sæpius reuocari.

**Curatio si
ob cerebri
uitrium.
Differentia
suffusionis.**

IN alia verò quæ primario affectu cerebri fit, natura suffusionis primum consideranda est. Nam vel incipit, vel ad statum progreditur, vel omnino confirmata est, & hæc quidem desperata est. Itaq; pupillam primū aspicio, colorem suffusionis, concretionem, motum, magnitudinem distinguo. Si quid præcessit, aut adest, interrogato: ætatis, temporis, conditionis totius oculi rationem habeto.

**Quæ suffu-
sio curabi-
lis.**

Desperata suffusio est, quæ pupillæ figuram commutauit. Pura atque pellucida tum pupilla tum suffusio. Suffusionis color cœruleus aut auri similis, aut ferri nitētis, aut aquæ maris, curabilis est. Quæ verò grandinem refert aut gypsum, quæ nigra est: in summa, quæ sine splendore cernitur, incurabilis est, fereque confirmata ad candorē vergit sine splendore.

**Quæ incu-
rabilis.**

**Concretio-
nis signa.**

CONCRETIONEM ita distingues. Oculo incolumi clauso, suffusum digito apprimes, si humor ille tenuis consistit, neq; ampliat, sed statim vt prius coit, nondū desperata res est. Si verò dilatatur quidē, sed dissoluitur, maturitas est vt punctione vacuari possit. Cataracta quæ locum mutat incurabilis, hoc est, quæ hac atque illac conuertitur. Quæ ve-

rō com-

po compressa dilatatur, non etiam commutat locum, melior est. Exigua facilius, magna difficilior curatur. Interrogabis autem, num precesserit grauis aliquis morbus, acerbior capitis dolor, vel ictus. Tum enim, vt etiam si adsunt, peior suffusio est. Aetate media facilius curatur, prima & extrema, difficilior. Caelo sereno & tranquillo, atque etiam temperato commodius curatur. Addunt Astrologi de crescente Luna, cœnante verò, aut eadem plena, atque vbi vel in ariete, vel alijs eiusmodi signis, curationem differunt. Nec omittendum quod Galenus docet, vt oculus sanus claudatur atque comprimatur. Si enim oculus suffusus, inde non intumescit, nec pupilla ampliatur, desperatio est: alioqui vitio succurritur. Phantasmatum, splendoris, idolorum causæ & diuersitates, & quæ suffusis oculis obuersantur, lege apud Galenum. 2. de Symptomatum causis.

Principijs ergo obstandum est. Demosthenes apud Aetium, & alij quidam Græci venam secant in cubito. Clysteribus acribus, ijsdemque purgationibus, sed exigua quantitate & per interualla repetitis. Cucurbitulis in occipitio cum scarificatione apophlegmatismis, errhinis per interualla vti iubent. Cornelius Celsus addit sectionem venæ frontis, san-

Curatio.

DE CATARACTA.

guinis detractionem è naribus, vitionem venarum temporalium, quæ certe locum habere possunt, vbi grauis capitis dolor est, atq; inde defluxio in oculos.

Victus ratio.

O P T I M V S victus, qui pituitam extenuat sine vaporibus. Vitandum vinum est, pisces liquidiora omnia iuscula assa elixis meliora.

Clysterum materia.

Collyrijs primum leuioribus, deinde paulatim maioribus vtendum est. Clystere è centaurij decocto vel similibus, comparandi sunt, alioqui vel hieræ picræ ʒvj. vel hieræ diacolocynthidos ʒss. aut alia eiusmodi pharmaca in clysteribus dissoluenda sunt.

Purgationes.

P V R G A T I O ex hiera picra, cui aliquid hieræ diacolocynthidos admixtum sit. Exempli gratia.

℞ pulueris hieræ picræ ʒij. pulueris hieræ diacolocynth. ʒj cum succo fœniculi, formetur pilulæ, capiat hora somni. Hæc purgatio decimo quoque die aut decimo quinto reuocanda est.

Theriacæ usus.

Per intervalla mithridatij aut theriacæ ʒss. aut ʒij. aliàs ieiunis, aliàs hora somni, aliquando quatuor horis post pastum, imperanda sunt semel in hebdomada.

Cap. ablutio.

Poterit aliquando imperari ablutio capitis ex decocto absinthij, betonicæ, stœchados, maioranæ, fœniculi, in lixiuio facto è cineribus sarmen-

ſarmentorum, adiecta etiam vini portiuncula quarta aut sexta parte.

Collyria è melle, succo fœniculi aut herbarum proximo capite descriptarum, comparari debent. Adijciatur quoque fellis aliquid leuioris aut fortioris, ſemper, habita ratione molitiei, duritiei, temperamenti oculi. Alia enim remedia pueros & ſenes, ruſticos & vrbanoſ, cœruleoſ & fuluoſ oculoſ, cœſioſ & nigroſ iuuare poſſunt.

Collyria

IN pueriſ lactantibuſ aliquando nutriciſ inſpiratio ſatiſ eſſe poteſt. Nutrix itaq; mandet dentibuſ ſemen fœniculi, ſagapenum, ammoniacum, galbanum, aut eorum aliquid, quę ſuſfuſoſ iuuant, atq; vbi oſ incaluit, leuiter inſpiret halitum oculo lactantiſ. Hoc conſilium etiam adultiſ prodeſſe poteſt. Secundum eſt, vt ex eadem materia oculoſ ſuffumigeſ.

Curatio puerorum.

Aqua è melle diſtillata, & ſuffuſioneſ & albugineſ interim percurat. Quę deſtillatur è melle roſ. lenior eſt, deinde quę è melle comuni, poſt etiam è melle ſcylitico. In iſſ aquis aliquando modicum ſacchari candi liquandum eſt. In diſtillatione proximo capite numeratę herbę & materia, tum etiam ſagapenum, ammoniacum, galbanum cômifceri poſſunt. Aut ſi iã diſtillata eſt aqua, in ea maceran

Aqua mellis.

Aquę deſtillandę.

DE CATARACTA.

Collyria
fortiora.

tur. Similiter & vis aquarum fœniculi, maioranæ, & cæterorum augeri potest. Collyria fortiora.

℞ fellis accipitris, balsami ana ʒ ij. adde, si vis, ellebori albi, piperis ana ʒ j. cum aqua raphani fiat collyrium. Aliud.

℞ cerebinthinæ ℥. s. sulfuris viui ʒ ij. mellis ros. ʒ iiij. plantaginis & arnogloss. ana M. ij. fiat distillatio in alembico. A fortioribus collyrijs si mordetur oculus, statim oui candido, aqua ros. aut lacte muliebri temperandum, malum est. Plura remedia ex proximo cap. & alijs répetes.

Punctio ab
acu.

Punctiois vero quæ acu fit tempestiua occasio est, cum materia suffusionis mediocriter concreuit, cuius formulam descriptam habes cap. 21. lib. 6. Pauli, & lib. 7. Cornelij Celsi.

DE HAEMORRHAGIA

Caput XVII.

HÆmorrhagia Græcis peculiariter intelligitur profluuium sanguinis è naribus, quanquam ex vocabulo, quodcunq; sanguinis profluuium intelligi potest: quale est, è sede, vtero, ore. Rarum est, quod quibusdam contingit peculiari natura, vt aperta è trunco corporis, hypochondrijs, thorace, facie, venæ clausura, redundantem sanguinem depleant: quibus

quibus eadem remedia conuenient, quæ in hæ-
morrhagia è naribus. Hæc autem aliàs critica *Differentia hæmorrhagiz.*
est, aliàs consuetudine naturalis: nōnunquam
omnino præter naturam est.

IN duobus primis generibus sanguis sup-
primi non debet, nisi viribus iam metuitur:
multò etiam minus ac tardius ætate iuuenili,
temperamento sanguineo, aut vbi consueta a-
liqua euacuatio, intermissa est: quales sunt
hæmorrhoides, vomitus sanguinis, phlebotomia,
& menstrua in mulieribus. Vbi vero sup-
primendus est, remedia sunt vincula, cucurbitulæ,
phlebotomia, sanguisugæ, anacollemata
indita naribus, aut admota reliquis corporis
partibus.

Curatio.
Quando &
in quibus
corporibus
sanguinis si
sti debet.

Vincula ergo digitis pedum & manuum, testiculis, articulis intervallo trium digitorum, auriculis iniicienda sunt.

Frictiones etiam deorsum ductæ, immersiones extremorum in aqua calida, vel frigida conueniunt.

Phlebotomia è cephalica eiusdem lateris, aut vtrâque, si vtrinque profluit sanguis: idque angusto vulnere tutiusq; aliquoties diuersionem repetere, quam semel ducto sanguine, animi deliquium excitare. Quod tamen animi deliquium Paulus, & aliquot alij probauerunt. Galenus in Prorrhetico non expectandam

DE HÆMORRHAGIA.

animi deiectionem præcipit: atq; experimen-
to certum est, animi deliquio, sanguinem non
restitisset.

Sanguifugæ.

Sanguifugæ post aures, aut in fede, ijs ma-
ximè, quibus consuetæ supprimuntur hæmor-
rhoides.

Cucurbitulæ statim post vincula, & ante
phlebotomiam hypochondrio eiusdem lateris
affigendæ sunt. Affiguntur & scapulis & sum-
mæ ceruici, & cum scarificatione, si opus fue-
rit, & vires tolerant.

Anacollemata.

Anacollemata vero, & quæ induntur nari-
bus, magna ex parte refrigerant, quorum vsus
post alia supradicta remedia tempestivius est,
iam reuulsa in partes contrarias materia, hoc
est in partes inferiores corporis, aut postero-
res capitis: alioqui vsu refrigerantium pluri-
mi quidam deterius habuerunt, inde conuul-
si, aut oborta spirandi difficultate, suffocati. Et
hæc remedia infirma, omnia comperit Gale-
nus præ maioribus illis remedijs, ex quinto
Methodi libro de Sanguinis missione. Ana-
collematis ergo & alijs topicis post reuulsio-
nes vtendum erit, habita ratione naturæ capi-
tis & partium quibus admoventur. Anacolle-
mata fiunt ex argilla, farina volatili, farina tri-
ticea incorporatis cum oui albumine, addito
momento aquæ rosarum & aceti. Potest quoq;
aliquid

aliquid adijci boli armeni, sanguinis draconis, coralli rubri, & rerum eiusmodi quæ astringunt: quale hoc est.

R^x argillæ ʒ ij. boli armeni ʒ ss. acaciæ, hypocistidos ana ʒ ij. cum oui albumine & modico aceti, fiat emplastrum, applicetur fronti & temporibus.

Induntur in nares quæ refrigerant, astringunt, inuiscant, aut crustam ducunt, interim mixta portiuncula narcoticorum. Verum & narcotica & caustica cum periculo esse solent. Sine metu sunt, succus plantaginis, succus rubi, mespilorum, cornorum & alij eiusmodi. Læugines arborum, quæ folijs insident, aut quæ veluti nucamenta pendent è specie populi vel masculæ salicis, quam Galli marsault appellant, medio mense Martio colliguntur, macerantur in aceto, siccantur & vsui adseruantur. Vfus tempore induntur per se naribus aut cõuenienti medicamento induuntur atque ita imponuntur.

Quæ naribus induuntur

Spongia aceto acerrimo imbuitur, imbuta, pice liquida circumducitur, tum scitili vase reposita crematur, in puluerem redigitur, pulvis efficacissimus est, & per se insufflatur naribus, vel liquidis medicamentis commiscetur. Aliud.

Spongiae præparatio

R^x thuris ʒ ij. aloes ʒ j. cum oui albumine

DE HAEMORRHAGIA.

incorporentur. Penicillus è mollissimis pilis leporis, aut floccus è lanugine aut nucamento supra dicto, in eo medicamento immergitur, & ita imponitur naribus. Penicilli etiam conueniunt è tela araneorum, cui infideat gyris, id est, farina volatilis etiam cum boli armeni puluere, aut sine hoc.

℞ succi basiliconis ꝓvj. aceti ꝓij. camphoræ ꝓij. misce: linamenta hoc medicamento imbuta induntur naribus.

℞ aquæ plantaginis, rosarum ana ꝓvj. aceti, vini albi astringentis ana ꝓij. camphoræ ꝓj. misce, & in miscella madefac linteamina, quæ coto inuoluas, hepatis, pedibus ac manibus, testiculis & mammis appones. Applicari etiam potest testiculis pannus aqua frigida madidus.

℞ aquæ panis porcini ꝓj. camphoræ ꝓij. attrahatur in nares. Terra sigillata, bolus armenia, sanguis draconis, trachisci de carabe, oui albumine & aceti momento dissoluuntur: hinc madefactus penicillus naribus imponitur. Radix alias præoniæ peruinçæ subiecta, linguæ sanguinem sistit, herba vero fronti apposita aut naribus indita. Fragaria herba trita similiter iuvat. Vtile est olfacere camphoram in aceto dissolutam.

Balneū frigidum.

Quidam temerario remedio, cum reliqua
omnia

omnia non iuuissent, cum cui profluebat sanguis, in balneum deduxit, atque demersit ad collum, & ita restitit sanguis. Verum ab hoc remedio certum exitium est, si vires vehementer laborent. Vulgus vtitur corallo è collo suspensio. Lapis iaspis, onyx, id est cornelina, hæc Cornelina. matites, lapis sanguinarius eidem remedio esse creduntur. Sunt qui applicent parti vbi debet fieri reuulsio,

DE ANGINA. Caput XVIII.

A Ngina inflammatio est faucium aut musculorum, qui ad fines asperæ arteriæ sita sunt, nonnunquam etiam exteriorum cervicis. Desperatio est, cum nusquam apparet, cum grauissimus dolor est, febris, cum os hiat, lingua exerta est, intercepta deglutiendi via, & potus per nares refluit: aut si ad initia cervicis cauitas est, intro adducta vertebra. Hæc ut minuantur, ita leuior morbus est.

O P O R T E T ergo statim initio collocare Curatio. ægros loco satis amplo nec frigido: ita residere in lecto, ut caput altius attollatur.

L I Q V I D I O R A sunt alimenta, parcissime viuant quantum vires possint tolerare. Abstineant ab his omnibus, quæ fluxiones incitant, quale vinum est, vaporosa, & calida se-

Videtur ratio.

DE A N G I N A.

rè omnia. Vitent etiam glutinosa, quæ cum etiam non detergeant, vias iam oppressas angustia intercipiunt.

*Sanguis mit-
tendus.*

Primis diebus atq; adeo initio morbi sanguis detrahendus est, adhibito prius hoc consilio. Mulieribus tum gravidis, tū quibus supprimuntur menses, angina accedit aliquando. In gruida, sanguinem detrahes nullo metu ad $\frac{3}{4}$ ij. vel iij. plus minúsue, vt scopi phlebotomiæ indicabunt: minus, si fœtus maior est, vt post septimum mensem. Quod si mulieri gruidæ, etiam tum menses fluunt, multo liberius sanguinem è cubito detrahes: hîc enim & ab angina matri, & ab abortione fœtui periculum est. In ijs vero, quæ vterum non gerunt, & menses supprimuntur, venam è crure vulnerabis, copiosiusque detrahes, tum ad venas brachij, quæ morbo conueniunt phlebotomum transferes. Hoc consilium multis alijs morbis, quibus corripiuntur mulieres, commune est. In alijs, siquidem manifesta signa plenitudinis, è saphena, id est malleolis: si mediocria, è media cubiti: alioqui è cephalica sanguinem detrahes mediocri vulnere: ne si amplius sit nimium viribus detrahatur: si angustius, esfluat tenuis sanguis, crassus relinquatur. Hyeme etiam vbi anginæ ferè phlegmaticæ, parciore tractio, sed foramen maius esse debet. Vere, & reliquis

reliquis temporibus copiosior, vulnusque angustius imprimatur. Cucurbitulæ ex libro de cucurbitulis collocentur.

Mollis alius esto leuibus clysteribus, multo magis, si febris est: in quibus interim dissolues calsiæ fistulæ z j. vel catholici aut hieræ picræ z f. Huius hieræ vis, summè probata est. Nam cum angina multos Romę suffocaret, ea que veluti pestis tota vrbe grassaretur inuentum remedium à Medicis, vt post frugalem cœnam D ij. plueris hieræ in pilulas coactos exhiberent, quo auxilio quicunque vsi sunt, periculum declinauerunt tam atrocis morbi. Paulus omissa phlebotomia acrioribus clysteribus vtitur, dissolutis z iij. hieræ diacolocynthi. Sed quod ante dictum est, prius quàm iniiciamus clysteres acriores, leuioribus vti oportet, qui inueteratum stercus emolliant & detrahant, Vt.

R χ chamomillæ, meliloti, maluarum ana M. j. furfuris. p. j. in decoctione dissoluatur calsiæ pro clystere z j. f.

Purgationes quoque leues ex calsia, manna ad z j. aut eo plus in decoctione passularum, hordei, florum cordialium, tamarindorum, sebesten, prunorum. Suspectum pharmacum est, quod Asclepiades imperauit ex aloe & colocynthide, tū quia in pilulas conformat,

Clyster

Purgatio

DE A N G I N A.

tum quia fortius est. Dissoluta enim liquoribus, non coacta in pilulas pharmaca, magis conueniunt, propter difficillitatem deglutendi.

Gargari-
sma.

D V M hæc fiunt gargarismis vtendum est, initio quidem repellentibus, deinde admixta vi resoluente & detergente. Post etiam si fuerit opus maturantibus, atque vbi dolor grauior est, & sentitur exulceratio, lenientibus. Horum materiam & compositionem repetes ex sexto κατὰ τόπους, capite quadragesimo tertio, & libro 8. Aetij. Recentiores medici ijsdem etiam vtuntur.

R decoctionis rosarum siccar. ℥ iiij. diamoron ℥ ij. ex sorbis, cornis, moris rubi aut alioqui immaturis, è granatis acidis poterit ex primi succus, & quarta parte sacchari, aut mellis rosarum dulcorari: dianucum & diamoron initio dissoluantur in duplo liquore astringente, quales sunt superadiæti succi. Decoctum rosarum, plantaginis, sorborum, cornorum, mespillorum & similium astringentium, vel in aquis inde distillatis.

Conseruæ sunt cornorum, sorborum, mespillorum, mororum immaturorum: quarum ℥ j. in duplo liquore astringente dissoluta, reprimentem gargarismum efficit. Et hic quoque laudandus reprimendo & leniendo.

R suc-

R^z succi expressi è cassia fistula ʒ i. decoctio
nis rosarum aut aquæ plâtaginis symphiti, pru
nelle, salicis ʒ ij. vel decocti sebesten ʒ ij. aquę
è sorbis, cornis, aut mespilis distillatæ ʒ iiij.
misce pro gargarismate.

V T augetur morbus, ita repellentium mo
dus minuendus est, & augendus resoluentiũ.
Itaque plus mellis admiscemus, vtimurque hy
dromelitæ plus minúsue diluto, in quo rosæ,
plantago, nenuphar præbullierint, syrupo ro
sarum, syrupo etiam de papauere, de nendæ
phare, aut etiam de iuiubis, vbi fluxio tenu
ior est.

Vbi ijs remedijs nihil proficimus, venę sub ^{Venę ser}
lingua incidendæ sunt. Alij ex Asclepiade & ^{dio.}
Archigene venam frontis, & quæ ad angulum
oculi pertinet. Hippocrates tercio de morbis,
venam quæ sub mammis est, nonnulli ve
nas ceruicis. Verum tutius est post vniuersa
lem euacuationem perseuerante malo, cucur
bitulas cum scarificatione ad initia ceruicis af
figere, &c. Postea venas sub lingua, vel phlebo ^{Cucurbitu}
tomo aperire, vel scalpello scarificare. Sanguis ^{culæ.}
sugæ ijsdem locis quibus cucurbitulæ affigi
possunt. Quæ vbi detractæ fuerint, cucur
bitulæ inducuntur, perpetuo virium habita
ratione.

De cinere hirundinum, humano stercore,

DE ANGINA.

canino, & alijs quæ melli mixta, aut aliter præparata, anginæ conueniunt, lege postremos libros Galeni de simplicibus: vt de Afellis & alijs remedijs, commentarios κατὰ τὸν νοῦν.

**Asperitas
gutturis.**

L Enies dolorem & asperitatem gutturis aqua, in qua mica panis albissimi coxerit, aut panis ita coctus vehementer exprimatur, colluatur os succo. Eodem modo è furfurum tritici pinguium cremore. Lac etiam per se, mucilago, seminis cydoniorû, lini, althææ, aut hic Sorani efficacissimus gargarismus.

**Sorani gar-
garismus
ad asperita-
tem.**

R Liquiditæ recentis rasæ & conquassatæ ʒ iij. mellis ros. ʒ j. aquæ fontanæ ℥ ss. coquantur omnia ad crassitudinem, è colatura fiat gargarismus. Penidia quoque in lacte dissoluta, ptisanæ succus, hordeatum, lac amygdalarum dulcium, similiter valent gargarizando. Maturantia.

R ficuum pinguium ʒ iij. hyssopi p. j. fiat decoctio ad dimidiam, colatura colatur.

**In metu
suffocatio-
nis.**

ANG Inosi sæpissimè periculò suffocationis laborant. Quod si periculum inde natum est, quia erupit tumor, & sanies in pulmonem & cor defluxit, desperatio est, nisi summo beneficio naturæ adiuentur: alioqui sæpe fit, vt cum nimis increuerit tumor, omnino intercipiat vias spiritales, vbi certa mors est, nisi occurramus. Itaque extremo malo extrema remedia

remedia sunt tentanda. Repetenda sectio venarum sub lingua. Cucurbitula magna & cum multa flamma initio ceruicis affigenda est. Collum & thorax onere leuanda sunt, atque inungenda oleo de lilijs, aut scœnugræco. Caput ijs attollendum est vt propè sedeant. Aer frigidus introducendus est. Locus sit lucidus & perspiratus. Cucurbitulæ quoque in pulpis scapularum, in mento & maxillis: Alij etiam in sutura coronali, & sub mammis coaptant. Rasis etiam vesicante phœnigmo vtitur, initio ceruicis. Tumque gargarismis acrioribus vtendum est, vt hydromelite in quo p. j. hyssopi, aut origani coxerit, aut radix gentianæ, cucumeris agrestis, iridis. Aut.

℞ seminis sinapi ʒ ij. conquassentur & in aceto accerrimo macerentur, incorporentur cum modico melle, deinde dissoluantur in ʒ ij. mulsæ ad gargarismum.

QVOD si ijs artibus nihil proficimus, vltimo auxilio Asclepiadis vtendum est, tum etiam omnium ferè Medicorum. Hiante ore lingua deprimatur, culter ligneus acutus indatringitur, vt tumor disrumpatur, tū prono capite sanies repurgetur. Vbi in faucibus manifestus est tumor, vellicandus est vnguibus, aut aperiendus ferro.

Alij spongiæ partem ad magnitudinē auel

Quæ tumores
rem rumpant.

DE ANGINA.

lanæ suspendunt è filo, & ita ab ægro deuorari iubent. Intumescit spongia, atque dum vi retrahitur, tumor è rûpit. Hoc alij bolo, carnis salis semi coctæ ita subtenso & decorato, tum vi retracto moliuntur: alioqui scarificandus est locus sub maxillis, sub mento, in collo, vitatis neruis & arterijs. Sic enim aliquando sanies effluit, alioqui cucurbitulæ, scarificatis locis, apprimendæ sunt.

**Emplastrũ
ènido hi-
rundinis.**

E nido hirundinis in aqua decocto aut oleo cõmuni vel chamæmelino emplastrũ faciũt, quod inducũt collo. Alij è stercore humano recenti. Quidam, quod tolerabilius est, è lana succida insuccata in oleo communi, oleo liliorum, chamæmelino aut simili, quorũ consiliũ est, vt materiam foras euocent.

DE TVSSIS.

Caput. XIX.

**Tussis cau-
sa.**

TVssis causa sola intemperies, partiũ cõsensus, vt lumbricis vel huiusmodi acri humore stomachum infestantibus: & quod sæpe fit, à cerebro defluxio, aliàs calida, aliàs frigida: tum etiam humor in pulmonibus conceptus, aliàs crassus, aliàs tenuis, interim viscidus: nonnunquam etiam asperitas arteriæ.

**Curatio.
Tussis à
frigore.**

V T recte cures causa cognoscenda est. In-
temperie frigida (quod sæpe fit hyeme rigète)
domi-

domicilium calidū, animæ retentio, vini dulcis & calidi potus, partium pectoralium munitio, ex linteis calentibus, pedum calor & capitis, sufficienti medio esse possunt.

DE FLUXIO tenuis, maximè si copiosa est, retinenda est incrassantibus, multo magis si acris est: id quod intelliges ex oculorum & faciei rubore, titillatione, aut etiam mordicatione oris interioris, sapore, urinis multum coloratis, tum etiam antecedentibus causis. Hęc enim tussis, etiam si initio levis est, tabem denuntiat. Itaque statim initio medicamentis vtendum est, quæ inspissent, & obtundant materiam, conueniunt itaque aqua hordei, syrupus violarum, de papauere, mucilago psyllij, semen cydoniorum, decoctio papauerum, adiecta sapa, vt & somnum concilies, & fluxionem incrassatam cohibeas, nec attenues.

Tussis à tenui & calido humore

Mellitissimis plurimum vtuntur Medici in tussi, quibus tamen abstinendum est, vbi fluxio est tenuis. Mel enim attenuat, sed loco mellis, vti oportet, vocato melle passulato, ficato, quod syreum nonnulli vocant, succo glycyrrhizæ, aut prunorum. Hęc autem ita comparabis, Passulas, ficus, pruna, iuiubas, sebestē, horum aliquot in aqua coques, ad putrilaginem, tum cum vehementi expressione percolabis & iterum coques ad mellis grassitudinem.

Mel.

Mellis passulati præparatio.

dinem. Hinc vtimur etiam mucilagine gummi tragacanthi, gummi Arabici, extracta in aqua rosarum, in aqua violarum & in corporata in aliquo succorum prædictorum, vt gratia exempli:

R^z mucilaginis gummi tragacanthi extracte in aqua rosarum 3 vj. incorporentur in mellis passulati, succi liquiritiæ ana 3 j. s.

*Pil fluxū
inhibentes.*

QVOD si vigiliæ vrgent, & dolor maior est, admisce pilularum de cynoglossa 3 ij & affunde aliquid syrupi de papauere, violati, aut rosati, finge pilulas, pondo 3 j. quas contineat in ore.

AT que vbi maior fluxio est, secta cæphalica diuertenda erit: deinde etiam purgationem è cassia, manna aut penidijs admixtis, Vt.

R^z cassiæ 3 j. penidiorum 3 vj. dissoluan. in aqua hordei, passularum decocto aut liquiritiæ. Sæpe vtendum est hordeato cum saccharo viol. Partes quoque colli & thoracis, si incaluerunt, illinendæ.

*Linim en-
tum.*

R^z olei violarum 3 ij. mucilaginis seminis psyllij extractæ in aqua vngulæ caballinæ 3 j. ceræ lotæ ex aqua violarum q. s. f. linimentū.

Cauteriū.

NIMIS vrgente malo cauterijs etiam vtendum est, tum in sincipite tum etiam in ceruice & scapulis. Multa repetenda ex capite de catarrho.

A frigido
humore.

Purgatio

Materiæ
preparatio

Theriac

IN materia frigida neque phlebotomia, neque purgatione vtendum est, nisi corpus admodum plenum sit, tumque cassia addita terebinthinæ, vt sint cassiæ 3 vj. terebinthinæ 3 iij. f. bolus cum saccharo, vel dissoluantur in ficuum decocto, aut simili. Possimus etiam vti agarico, in pilulis formatis cum rhabbaro, cum puluere hiæræ picræ, hiæræ diacolocynthidos cum elephanginis pilulis, aut etiam fortioribus, sed melius fuerit vti prius melocrato, in quo vel hyssopum vel thymum, vel marrubium, aut aliquid tale incoxeris, aliqui vti syrupo capillorum veneris, de hyssopo, de marrubio & similibus.

IAM purgato corpore, incidendum, detergendum, siccandum: sed in siccantibus cautio est, vt ne nimium calefaciant, qualia sunt acria: diuretica inimicissima expuitionibus ex thorace, nec statim initio vtendum est, maxime si materia crassa, aut viscida est. Præterea vtimur semine apij, vrticæ, nasturtij, scyllæ, erisymi, raphani, fœniculi, & torrefiunt atque in puluerem rediguntur, tum horum 3 ij. commiscuntur 3 vj mellis despumati.

Laudant vt per interualla bis aut ter in hebdomada, mithridaticum, aut theriaca ad magnitudinem auellanæ ex vino albo, sumatur.

ANIMADuertendum quoque hoc loco,

liquidioribus potius vtendum esse, quàm crassis & solidis medicamentis, vbi repurgandi cōsilium est. Contra verò solidis, vbi coquendū. Deinde etiam, non vtendum esse viscosis, nisi habeant aliquid deterfionis. Vbi exasperata arteria est, conueniunt viscosca sine mordicatione, quale est tragacāthum, gummi Arabicum, oui luteum sorbile, butyrum, mucilago seminis cydoniorum, lac per se, mel passulatum, succus iuiubarum, ficuum, dactylorum veterum non recentium: nam recentes exasperant. Hordeatum, lac amygdalarum dulcium, penidia, saccharū viol. & alfeni ex dulci oleo. Vbi coquendum est, aliquid croci, thuris, myrrhæ, & eorum quæ leniunt, medicamentis adiiciendum est. Semen iridis, vrticæ desiccant: mel, saccharum detergent: aromata, sed non nisi aliquo liquore, diluta, imperanda sunt. Plura remedia capite de asthma & pleuritide.

Suffumigia Suffumigia initio quidem, si modica fluxio est, nec etiam capitis plenitudo. In fine verò roborando capiti & thoraci.

Senes tussiculosi. SENES tussiculosi potu vini dulcis tepido, butyro recenti, addito saccharo dulcoratis, condimentis, & interim decoct. caulium, leuibusque remedijs, curandi sunt.

Narcotica. NARCOTICIS aliquando vtimur, vbi tussis molestior est, & perpetuæ ferè vigilæ. Vtimur

Vtimur ergo syrupo de papauere, cū decoctio nepalmularum aut pilulis de cynoglossa, pondere 3 s. aut his.

Rx spicæ celticæ 3 j. cinnamomi 3 ij. croci gra. viij. castorei gra. vj. opij in sapa macerati gra. iiij. omnia excipiantur melle, fiantq; parua pilulæ, pondo 3 j. teneat in ore. Tutior est vsus narcoticorum, iam purgato corpore, & thorace non ita pleno.

Vehementer commendant syrupum myrtillorum sedandæ tussi: calidę quidem, cum iulep rosarum: frigidę, cum decocto passularum, aromatizzato modica spica. Syr. Myrtillorum.

DE ASTHMA TE.

Caput XX.

Asthma suspirium Latinis, à pituita crassa & viscida inclusa bronchis pulmonis, unde anhelitus molestissimus: magisque iacentibus, quàm sedentibus. Affectus senibus familiaris, & ijs qui metalla, hydrargyrum, arsenicum, & alia eiusmodi tractant: hyeme magis etiam extrema & phlegmatica conditione, excitari solet. Asthmatis causa.

SVPERIORE cœnaculo, loco lucido, & calore plus quàm imperato, altioribus, mollioribusq; stragulis, capite & thorace subleuato, Curatio.

DE ASTHMA TE.

multò etiam magis cum dormiunt, collocare oportet.

Viciis ratio.

Frugalis vita, potus vini tenuis & veteris dulciusculi, mellita alimenta, vel condita, ijs rebus quæ leniunt, incidunt, tergent. Iam liberior potus esse debet, cum repurgandi consiliū est. Omnino abstinendum frigidis, astringentibus, nimisque calefacientibus.

Venæ sectio.

PHLEBOTOMIA concedi potest ætatibus medijs, si nihil est in scopis vniuersalibus mittendi sanguinis, quod repugnet: si vehemens malum est, si suppressi menses, aut hæmorrhoides, alioqui inedia, aut parcissima vita aliquot diebus imperanda est.

Scopi curatio.

Vtendum clysteribus, leuiter mollienda aluius est, materia in thorace concepta, incidenda, abstergenda, diluenda, repurganda tum pharmacis, tum ijs quæ sputa ducunt. Materia repurgata, desiccantibus vtendum est. Roborandæ sunt partes. Peregrinatio, nauigatio in mari, vectio in curru, aer maritimus: alia quoque eiusmodi quæ calefaciunt & siccant, imperanda sunt. Clysteres primum molles sint, ex remollientium decocto cum calsiæ & vj. in ea dissolutis.

Aliqua verò ex parte præparata & purgata materia dissoluemus ℥.ss. diaphœnici, & iij. hietæ diacolor. & vj. benedictæ in pectorali decoctione.

ctione. Leniter album emollies ꝓ j. casia & ꝓ s. penidiorum dissolutorum in hac decoctione.

R² liquiritiæ, passularum enucleatarum ana ꝓ iij. iuiubarum, sebesten ana numero vj. florum anthos & borraginis ana p. j. spicæ ꝓ j fiat decoctio, in colatura dissolue, etc. Laudatur melicratum hoc modo paratum.

Materia
preparatio.

R² scænugræci M. j hyssopi p. ij. ficus numero vj. fiat decoctio ad ꝓ s. in colatura dissolue mellis crudi ꝓ iij.

Melicrat
preparatio.

Laudatur quoque ius galli decrepiti, tum quia morbo conuenit, tum etiam, quia ventrē leuiter subducit. Oribasius hoc modo coquit; Gallum rufum & decrepitum infarcit sale, tū incoquit cum porro, anetho multo & oleo. Loco olei butyro, vtitor, aut alio pingui. Potest concoqui cum polypodio, semine cartami, cumino, aniso, hyssopo, satureia, thymo, & alijs eiusmodi. Decoctio quoque poterit dulcorari melle albo, aut saccharo.

Ius galli;

Per interualla quoque fortioribus purgationibus vtendum est, vt pilulis factis ex puluere hieræ picræ, & agarici trochiscati ana ꝓ ij. aut pilulis elephanginis, masticeinis, de hiera, assaieret, cochijs & similibus. Massæ earum pilularum ꝓ ij. cum ꝓ ij. agarici & oxymelite scyllitico, formentur in pilulas. Pulueri

Purgatio.

DE ASTHMA TE.

quoque hieræ diacolocynthidos ꝓ ij. agarici ꝓ, ꝑ. trochiscati coniunguntur, ex syrupo de hyssopo: Alioqui.

Rꝛ catholici ꝓ vj diaphœnici ꝓ ij. cum infusione ꝓ ij. agarici, cum molico spicæ & hydro melite quantum satis est, fiat potus.

**Pectoris
purgatio.**

I A M bene purgato corpore, Thorax repurgandus est: cui rei materia convenit ex lenientibus, incidentibus, detergentibus, postremo etiam siccantibus.

Lenientia.

Passulæ, ficus, sebesten, iuiubæ, liquiritia, penidia, saccharum alfeni, semen althææ, lini & similia leniunt.

**Incidentia.
Detergen-
tia.**

Incidunt & detergent hæc. Aristolochiæ radix, gentianæ, enulæ, centaurij, semen melanthij, scyllæ, iridis, vrticæ, bombacis, origanum, thymum, satureia, calamentum, pulegium, brassaica, absinthium, abrotonum, hyssopus, allium, porrum, piper, castoreum, gutta ammoniaca, scrapinum.

A proprietate.

Hęc à proprietate, Asselli seu vermes hydreis subiecti, vermes serici, pulmo vulpis & erinartij, stercus lacertæ, interiora oculi philomelæ cremata, & in pulverem redacta. Guaiacū quoque, seu lignum sanctum manifesta ratione hic conueniunt.

Desiccantia.

Desiccant sulphur viuum, & arsenicum rubrum. Ijs autem omnibus sic vti oportet. Nam
è radi-

è radicibus, herbis, seminibus, decoctis, melicratum parari debet. Deinde reliquorum, quæ à proprietate iuuant, in puluerem redactorum ℥ ij. plus minusue, melicrati ℥ j. inspergi debent. Alioqui ex alijs succus expressus mellis commiscetur, aut horum puluerum ℥ ij. mellis ℥ ij. commiscantur, quale hoc erit.

℞ hyssopi M. j. ficus nu. vj. fiat d. ad ℥ ss. *in Melicratum.*
qua dissolue mellis ℥ iij. aut iij. aut ij. fiat melicratum, cui insperge pulueris facti è pulmone vulpis ℥ iij. pro duabus dosibus. Aliud.

℞ pulueris gentianæ, enulæ, aliptæ moscatæ, diaireos, vnus cuiusque ℥ ij. mellis q. s. Optimum est vti melle scyllitico prius in Comitiali descripto, similiter oxymel. scyllitico per se, aut cum decoctione pectorali, melicrato hyssopi, aut simili.

Per interualla quoque theriacæ, aut mithri *Theriaca,*
datij ℥ j. per se, aut cum modico aquæ scabiosæ, vngulæ caballinæ, vino albo, tenui, veteri, plurimum conuenit.

℞ styracis pinguis, terebinthinæ ana ℥ iij. spicæ ℥ j. cum melle despumato, fiat electuarium.

S E D interim dum hæc fiunt, thorax fricans *Topica.*
dus est, atque inungendus oleo amygdalarum dulcium, chamæmelino, anethino, de cheiri, id est, de violis luteis, iasmino, de lilio, laurino,

D E A S T H M A T E.

irino, costino, de spica, ordine ducto à leuioribus. Aut poterit ex his linimentum fieri, cum æquali parte mucilaginis seminis lini, althææ, fœnugræci, & ceræ quantum satis est : gratia exempli.

R̄ olei iasmini ʒ j. s. mucilaginis seminis althææ ʒ j. mucil. sem. fœnugræci extractæ in aqua scabiosæ ʒ s. cum cera quantum satis, fiat linimentum pro thorace. Post vnctionem lana molli, coto aut lana sordida thorax contegendus est.

In suffocationis periculo.

I N periculo suffocationis & nimis oppresso spiritu, cucurbitulæ scapulis affigendæ & cruribus, dandumque vt ore contineat, aquæ hordei ʒ iiij. sacchari ʒ j. croci gr. iiij.

R̄ salis ammoniaci, seminis nasturtij, pulmonis vulpis ana ʒ j. croci gr. iiij. dissolue in iulep. viol. ʒ iiij. pro duabus dosibus. Tumq; frictiones & vincula extremorum conueniunt, & ea quæ in angina dicta sunt.

Desiccantia.

D E siccandum iam bene purgato corpore & thorace hoc modo.

Suffumigium.

R̄ styracis, mastice, terebinthinæ, arsenici rubri ana ʒ iiij. concorporentur in vitello oui, deinde cum hoc medicamento, frustula ligni iuniperi illinantur, postea siccantur, & siccatis fiat suffumigium, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphuris viui, & arse-

& arsenici rubri pari pondere. In debilioribus arsenico abstinendum est, vtemurque solo sulphure incorporato in terebinthina, styrace, mastice.

I A M bene procedente morbo, cucurbitulis sub mammis, sed breui mora vtendum est, vt tantum attrahant, non etiam discutiant. Similiter dropaces, sinapismi, phœnigmi, exulcerantia, thoraci aptanda sunt.

EXtremum est cauterium in medio pectore. Cauteriũ. Crudelius est auxilium vstionis quod ab Aetio describitur, capite de Asthmate.

IN vigilijs dabis ꝓ s. philonij, quod etiam an Philonium. helitum iuuabit. In siti vehementi aqua hordei cum saccharo vtendum: iulep violarum, liquiritia ore contenta conueniunt.

DE PLEVRITIDE

Caput XXI.

Pleurisis dolor est lateris acutus, pungens, cui assidua febris, difficultas spiritus coniuncta sunt, pulsus durus & serratus, supinus serè decubitus. Nam in latus sanum conuersis, tumor suspenditur, atque ita distenditur membrana, quæ patitur, ideoque asperatur dolor. Vbi verò ægra lateri incumbunt, ex eo quod subiecto corpore supprimitur, ampliatur doloris sensus, fusa latius materia, tum

D E P L E U R I T I D E .

quia pulmo lateri affecto innititur. Hic tamen decubitus altero tolerabilior est. Optimus autem qui in Asthmate præscriptus est. Noctu ferè exacerbat dolor ac diebus imparibus.

Causæ.

A B exercitio , frigidus potus , vini intemperantia , inspiratio gelida & aquilonia , multo magis si præcessit auster , ac derepente succedit frigus , venena interim , concussio etiam externa , huic malo occasio esse consueverunt. Materia ferè biliosa aut sanguinea , quam partim ex sputis , partim alijs excretionibus & antecedente vita conijcies. Raro pituitosa & melancholica. Interrogandusque æger est , num suppressa sit solennis aliqua purgatio , vt in mulieribus menses : in viris hæmorrhoids , aut anniuersarium profluuium , aut alioqui statum certis interuallis ex aluo , naribus , vlceribus. Ex ijs enim vitium lateri contrahi potest , quibus ea pars infirma est , quæ etiam hyeme ideò facilius patitur , quod infirmatur frigore : frigus enim omnibus partibus thoracis inimicissimum est.

**Pleuritis
ab alijs
morbis
distinguen-
da.**

H O C modo igitur methodum distinguendæ pleuritidis instituito. Quibusdam corporibus à natura datum est , vt hepar fibris quibusdam costis inferioribus copuletur. Itaque cum laborant hepate , imago pleuritidis repræsentatur. Alijs materia quedam crassa & viscida in

mem-

membranis pectoris colligitur, toto etiã thorace, vnde etiam dolor grauis, dyspnœa, tussis & ficta pleuritis. Nam nec pungit dolor, nec febris incenditur, vt nec si flatus membranarum aut intercostalibus musculis impactus est. Aliquãdo etiam muscoli inflammantur, sed pulsus hic alius, nempe mollis, dolor grauis est, non pungens, & omnia ferè leuiora sunt. Membranae quoque thoracem distinguentes si inflammantur, par negotium vitæ faciunt, atq; verus lateris dolor. Sæpe etiam inferioribus costis inflammatis, diaphragma atque hinc stomachus grauiter laborat, magno periculo. Morbus hic proximo vere plurimos & eos maximè, qui vel temere vel negligenter curati sunt, sustulit. Omnia ergo hac ratione distinguenda sunt, vt etiam vniuersalia morbi tempora, è sputis maxime, tũ vrinis, alui excretionibus, & alijs, de quibus Aphorismo 12. lib. 1. & lib. 2. Prognost. & 1. de crisi bus. Ex ijs enim tempora distinguas, tempusq; euentumq; crisis pronuntiabis, meliusq; auxilia institues.

VITAE ratio methodo illa vniuersali, quæ ab Hippocrate 1. Aphorism. indicatur, æstimanda, nunc etiam consuetudo adiicienda, cum ægri in ediam non ferant, & alijs ciborum potusque generibus assueti sunt. Initio aqua hordei, ex hordeo pulicula, principijs liquidior,

Vitus ratio.

DE PLEVRITIDE.

post etiam crassior, ac deinceps mixtis amygdalis, tum amygdaloga, post etiam eadem ex pullorum iusculis dissoluta, tenellæ pullorum carnes, intrita madida, quæ & infriatas carnes & syntrimmata appelles licet, vulgo collyria et colatilia iuscula. Præter hæc vulgi expressiones, tortiua iura, atque his omnibus liquidiora, instauratitia, distillata, quæ ad *προπομάτιον ἁλῶν καὶ ὀφθαλμῶν* genus referre potes. Hæc autem defectis viribus, vt mos est. Non integra virtute nutries tenuius.

Syntrimmata.

Syntrimmata ergo è pulpis galli decrepiti, postquam longa decoctione remolliueris, & exactè infriaueris, conficies, atque eo iure, in quo gallus coxerit, dissolues: alioqui id quod conficitur à natura, melius ex assis pulpis, quæ alis copulantur, & sub his positæ sunt. In capis, perdicibus & iuuenibus gallinis, detrahendum lardum est prius, quàm infrantur, atque dum assantur, aqua violarum, scabiosæ, borraginis conspergi possunt.

Tortiua iura.

Tortiua iura ex eodem modo assis capis, perdicibus, & ceteris succulentis, ideoq; prius quàm legitimè coctæ carnes sint, etiam dum succosæ, prælo bene mundo supprimantur, sed & exossari prius melius est, deinde ita contorqueri, vt vberem succum reddant, qui interim hio saccharo, id est, saccharo viol. dulcorari possit. In-

fit. Instaurantia hac formula conuenient.

R̄ conferuæ borraginis, violarum, capillo
veneris ana ʒ j. conferuæ enulæ ʒ s. diamar- Restaura-
tio destilla-
lata.
gariti frigidi, diatriasantali ana ʒ s. quatuor se-
minum frigidorum excorticorum, seminis
limonum, cardui, bombacis ana ʒ ij. aquarum
destillatarum è violis, scabiosa, borragine, bu-
glossa, vngula caballina ana ʒ iiij. aquæ deco-
ctionis galli decrepiti, alterati cum borraginis,
buglossæ, calendulæ & modico hyssopi ʒ s. iiij.
cum carnibus vnus capi iuuenis bene carno-
si, & mica panis, fiat distillatio in alembico se-
cundum artem.

R̄ supradictæ distillationis ʒ s. cum sac-
chari violac. ʒ j. s. & ʒ j. cinnamomi, coletur
per manicam Hippocratis. Minori sumptu gal-
lus decrepitus ad putrilaginem coquitur cum
vitulina, expressio fortis cum iusculo, defor-
betur, cuius alimenti vim maiorem æstimant,
si cum nummis aureis, aliquando etiam gem-
mis, nodulo inclusis, & inditis ventri galli. Præ-
terea vocata gelatina cōcreto succo carniū,
vires fouendæ sunt.

Permuli pleuritici vinum appetunt, quo Vinum.
tamen interdicens est, nisi virtute colla-
bente, animi deliquium metuatur, tumq; buc-
cella panis in vino tenui & modico aquæ vio-
larum immergatur, sæpius naribus admouea-

DE PLEVRITIDÈ.

tur, aut sugatur, interuallis. Acida, astringentia, quæ refrigerant vehementius aut calefaciunt, vitanda sunt.

Decubitus. Loco lucido, mediocriter elato, molli culcitra, capite ac thorace eleuato, collocandi sunt: qui si decidunt in pedes, lignum aliquod aut aliud corpus pedibus obijcitur, vt in ea figura persistant.

Curatio. HÆC vbi ita fuerint prouisa, statim initio de maioribus remedijs cogitandum est. Maiora remedia sunt purgatio & phlebotomia.

Euacuatio per medicamenta. Si subsistit aluus clyster mollis injici debet, in quo 3 vj. aut 3 s. cassiæ dissoluatur: purgatio interim satis esse potest, nec perpetuo phlebotomia opus est. Placuit enim Hippocrati cum dolor ad hypochondrium inclinaret, vt pharmaco potius, quàm phlebotomo vteremur. Pharmaca verò præcipua credidit elleborum nigrum, aut peplium. Galenus vero hieram diacolocynthidos, quæ elleborum, non scammonium recipit. Posteritas Medicorum leuioribus inuentis, veterum pharmaca reliquit. Leuissimum ac plurimum vsitatum cassia, datur hæc ad 3 j. s. 3 x. 3 j. 3 vj. eaque dissoluenda est aqua hordei, sero lactis, passularum, liquiritiæ, eiusmodique pectoralium rerum decocto; vel cum saccharo in bolum cogenda est. Datur enim, sed ferè aucto morbo mel aereum, id est, man-

est manna. Vbi verò obstructionis coniectura est in primis venis, Rhabarbari ꝓ ij. vel ꝓ j. in aqua hordei, endiuie aut similium infunduntur, & cum modico cinnamomi fit potus. Neque metuenda eius astrictio est. Nam & mastiches ꝓ iij. fouendo vñtri pleuriticorum veteres imperarunt, alternis diebus, maxime paribus, in quibus ferè quies est, aut leuior morbus. Clyster mollis iniici debet, si non descendit aluus, alioqui, quod vtilius est cassie ꝓ ss. aut ꝓ vj. in bollū cum saccharo cogendę sunt, dandęque vel mane vel vesperi, horę dimidio ante cibum. Consilium vsus pharmaci augebit, si dolor leuius est, si natura ægri non ita *ύδαρκα*, aut aliena opinio à phlebotomo: alioqui si grande malum est, etiam si ad hypochondrium declinet dolor, tutius auxilium phlebotomia est Galeno. Prius etiam quàm de pharmaco decernas, interroganda ægri natura est. Alij enim difficilius purgantur, alijs vel leui pharmaco immodicè turbatur aluus: ij ergo à phlebotomo habere commodius possunt. Quod si incognita ægri natura est, & pharmaco vti decet, medicamentum eligas tum quantitate tum qualitate medium, ne vel non purges, vel supra modū euacues. Tempestiua purgatio turgente materia, prima die, aut non vltra secundam. Nec omnino agarico, aut hiera

DE PLEVRITIDE.

diacolocynthidos iuterducitur, quin vti licet dolore in ventrem declinante, non ita vehementi affectione, atq; vbi à pituita malum est. Imperabis ergo catholici 3 v j. Rhabarbari & agarici infusorum, vt decet, ana 3 ij. cum hydromelite quantum satis sit, fiat potus. Eodē modo & catholici 3 iiij. pulueris diacolocynthidos cōmisceri possunt. Diaphœnicū quoq; & diaprunum pauperibus imperari possunt.

Venæ
sectio.

PHLEbotomia remissionis tempore, & eo die, quo leuior est paroxysmus, cōmodior est. Itaque etiam vesperi & nocte media, vrgente malo, & oblata occasione sanguinem detrahes: nec perpetuo semel illis ducendus est. Nam suspectis viribus vacuationem partiri melius est, vt mane 3 vj. vesperi 3 vj. depleantur. Est præterea cum derepente fit noua affluxio, vt inde omnia symptomata recrudescent, sputa quoq; vel cruda sint vel retineantur, tumq; & sexto die & octauo, vt Anaxioni, aut etiam tardius sanguinem mittimus. Hocq; remedium secundo, ac tertio reuocamus, si quidem non repugnant vires, in quo tamen cautio esse debet. Nam aliquando vbi antea, signa omnia salutem pronunciauerint, crisis tempore, quæ ferè fit ad septimum, decimum quartum aut alium diem criticum, vehementer pleuritis exacerbatur, symptoma-

ta om-

ta omnia increſcunt: tum nihil mouendū eſt, ſed omnia naturæ committenda ſunt. Deſperatis rebus, nihil quoque mouendum eſt.

IN pueris etiam bimis, ſenibus octogennarijs, mulieribus grauidis, remediū hoc temperari debet, non omnino prohiberi. In pueris venæ interim anguſtiores non apparent, idque magis in pinguiuſculis, qua in re ſanguisugis vti licet, decurtata harū corda vt vacuationis modus certò finiatur. Suppreſſa aliqua per partes inferiores vacuatione, vbi malum inde ortum eſt, in inſigni plenitudine, in materia virulenta, cumque ſtatim initio materia in caput rapitur, ac mentem commouet, è venis cruris eiufdem lateris, ſanguis trahendus eſt, alioqui è baſilica eiufdem lateris. Vacuationis modus è pulſu, ſanguinis motu, colore & corpore præſcribendus eſt. Si initio purus & rubeus effluit, vacuationis modus eſt, cum iam liuidus excernitur. Si aquoſus initio & crudus, claudenda vena eſt, cum iam rubetior & flauior apparebit. Si baſilica non apparet, media vulneretur, atque cum iam vulnerata eſt, pollex ramo cephalicæ imprimatur. Animaduertendum pleuriticos iugari phlebotomia locis perflatibus ab aquilonibus, lædi vero regionibus quæ obuertuntur aſtris. Hic ergo vel purgatione vtendū eſt, vel temperan-

Venæ ſectio pueris & ſenibus non omnino interdicitur.

DE PLEVRITIDE.

da sanguinis detractio. In biliosa pleuritide Arabes plebotomia interdicit. Hippocrates quoque hac sententia prohibuisse visus est: Sanguinem (inquit) non detrahes, vbi expuitur sanguis, si regio repugnat, si æger pleuriticus est, si natura eius admodum biliosa. Galenus Hippocratis sententiam recipit, nisi quòd non probat, sanguinem non detrahi, spuentibus sanguinem pleuriticis.

Fomenta.

HIPPocrates prius quàm veniat ad maiora remedia, fomentis vtitur, quæ aliquando satis esse possunt, aliquando morbum iudicant.

Pleuritis biliosa.

Itaque si sputa biliosa, vesica suilla ex aqua calida ad diminium implenda est, admo- uendaque lateri, alioqui cotum vel lana mollis infusa in aqua tepida, expressa, subinde admo- ueatur lateri. In ea aqua, si vis, incoques violas, melilotum, chamæmælum, fouebis quoque oleo violarum & chamæmælino. Si crassa & viscida sputa sunt.

Pleuritis phlegmatica.

℞ millij frixi M j. furfuris frixi p. i j. salis torrefacti ℥ j. Interim dum friguntur, vi- no tenui conspergi possunt, & si perfrixerit latus, aqua vitæ, vel hyssopi, aceto etiam, si cor- pus carnosum est & calidum, neque vehemen- ter vrgeat tussis. Inde fiunt sacculi, qui calidi lateri applicantur. Possunt hi sacculi in vino aut aceto immergi in quibus vel hyssopum
vel

vel origanum, vel thymum, aut aliquid tale co-
xeris. Inunges tum ex anethino & rutaceo. E-
iusmodi sacculis quoque cumini semen, bac-
cæ lauri, sicca hyssopus, origanum, rosmari-
num, & similia misceri possunt. In tenui &
cruento sputo, sacculus ex milio, furfure & sa-
le descriptus, sed siccus & calefactus applicari
debet. Inunctio ex chamæmælino, ex amygda-
lino. Oportet autem omnia quæ lateri admo-
uentur, esse tenuia, mollia, calida, videndum-
que ne quæ calida admoda sint, tempore refri-
gescant, calorq; linteis calentibus, aut alia arte
fouendus est,

S V N T qui nullis eiusmodi remedijs vsi
neq; maioribus illis auxilijs, certas antidotos
commendant, quales sunt: Dens apri in sco-
bem comminuitur, dantur 3 ij. ex vino albo
tenui. Aliud Radicis lappæ siccæ, quæ purpu-
reum colorem gerit, aut floris eius 3 ij. è mulsâ
propinantur. Aliud. Coralli rubri & testæ a-
uellanarum rubrarum ana 3 j. datur è mulsâ.
Possunt hæc quidem têtari, nō neglectis alijs
remedijs. Cucurbitularū in pleuritide pluri-
mus vsus est, de quo in libro de cucurbitulis.

Curatio
per anti-
dota.

V T I mur quoque plurimum aqua hordei,
aqua sacchari, syrupo violarum, de iuiubis, o-
xymelite, hydromelite, decocto pectorali, syru-
po capillorum veneris & de liquiritia.

DE PLEVRITIDE.

Aqua hordei pro uario scopo paranda.

Aqua hordei si quidem detergendum est & sitcandum, ex integro hordeo parari debet. Si leniendum, si extinguenda sitis est, fricanda asperiore linteo & deglubenda est. Si nutriendum magis, proportio hordei ad aquam augenda est, magisque coquendum est, dum diffringatur hordeum. Ferè parant aquam hordei, ut sit aqua vigecupla, sæpe etiam quartam partem syrupi violarum commiscent, aut modicum sacchari violarum, vel, ut in ptisana vulgari, liquiritiam rasam concoquunt.

Aqua sacchari.

Aqua sacchari deterget, coquit, lenit, nutrit. Sit autem sacchari \mathfrak{z} j. in xx. partibus aquæ, coquantur ad dimidium. Possit tamen sacchari modus augeri, ut etiam aliquando sub quadruplum saccharum sit, quale hoc est.

R \mathfrak{x} aquæ coctæ, vel aquæ hordei $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. j. sacchari communis, vel violati \mathfrak{z} iij. atque aliquando colatur aqua illa cum dicto saccharo & modico cinnamomi, cum videlicet nutriendum magis, coquendum, detergendum, repurgandum, & roborandum.

Syrupus violaceus.

Iulepi violarum vsus est, ut leniamus sitim & calorem temperemus, leuiter concoquamus, & facilius sputum reddamus.

Syr. de iuiubis.

Syrupus de iuiubis, lenit, maturat, temperatus est. Conuenit quoque ut violatus incrassando sputo.

Oxyme-

Oxymelitis suspectus vsus est in pueris, Oxymel.
 macilentis, ijs quibus neruosum genus infir-
 mum est, quibus asperior tussis, vigiliæ maio-
 res, sputa quoq; tam crassa, vt prope sicca sint,
 similiter & si æger debilior est. Tempestius
 autem vsus fuerit, si nihil horum repugnat, si
 fluxio, tenuis non est, si sputa mediocriter
 crassa, hoc est, non ita resiccata.

Hydromelite, vt aqua sacchari, vtendum Hydromel
 est, nisi quòd calefacit magis, & omnino maio-
 ri vi præditum est.

Decoctione pectorali ad sitim, ad conco- Decoctum
 quendum, leuiter detergendum & inciden- pectorale.
 dum vti licet.

Syrupus capillorum veneris incidit, de- Syr. capill.
 terget sine manifesto calore. ueneris.

Syrupus de liquiritia, ad omnia supradi- Syr. de li-
 ca utilis, & pectus roborat. Itaque vt postula quiritia.
 bit vsus, modo his, modo illis vtendum est,
 Veteribus quoque melicrata probata sunt, ex
 aqua in qua radix violæ purpureæ, stœchas,
 chamædrys, chamæpytis, horum vnum coxe-
 rit. Atque initio supprimendæ fluxioni sus-
 fitu vtuntur,

℞ vernicis ʒ j. masticis, rosarum ana ʒ Sussitua,
 i j. fiat puluis pro suffitu cum stupis canabi-
 nis. Item.

℞ diatragacanthi frigidi ʒ s. teneat alter-

natim in ore. Plura in cap. de catarrho.

**Conco-
quentia.**

IN coquendo vero quod influxit, vtendum est, lacte amygdalino, butyro per se. coquit enim, lenit, modicè educit: poteritque modicū sacchari violarū immisceri, vt paulò plenius educas, postea verò aliquid mellis, ita magis repurgabis, magis etiam, si ad ʒ ij. butyri, ʒ ij. diaireos simplicis admisceas, vel amygdalas amaras, persicorum nucleos, aut similia amara torrefacta, & in puluerē redacta. Butyro quoque quarta pars terebinthinæ lotæ in aqua maluæ cōmisceri potest. Parabilia quoque remedia sunt, melicrata, in quibus radix althææ coquendo, hyssopus, thymum & similia incidendo, & repurgando, coxerint.

Looch.

In eandem rem comparāt looch, initio quidem cum multo diatragacantho, postea verò cum multo diaireos: fereq; in remedijs pleuriticis lenientia, detergentia, incidentia repurgantia commiscentur: quale hoc est.

R Electuarij diatragacanthi frigidi ʒ j. sacchari candi, penidiarum, pilularum albarum ana ʒ iij. diaireos s. ʒ. ij. syrupi violarum & iuiubarum ana quantum satis est, fiat looch. Vbi verò magis repurgandū & extenuādum, augebimus electuarium diaireos, minuemus diatragacanthum. Loco penidiarū, mel albū: loco syruporum prædictorū, syrupum capillorum.

lorum veneris, & aliquid oxymelitis miscebi-
mus. Iam victo morbo, ad hos vsus, vinum al-
bum tenue & aquosum concedi potest.

IN unctiões lateris fiunt ex oleo viola- Vnctiões
pectoris.
to & alijs, vt prædictum est, oleo de cheiri, de li-
lio, mucilagine seminis cydoniorum, althææ,
lini, fœnugræci, extractis in aqua violarum, vn-
gulæ caballinæ, scabiosæ, hyssopi, butyro, sor-
dibus lanarum, terebinthina, axungia gallinæ,
anseris, anatis, suis, & quæ plurimum lauda-
tur, vrsi. Addûtur pulueres, iridis, thymi, hyf-
sopi, marrubij, gentianæ, sinapi, cinis bras-
sicæ & sarmentorum vitis, non initio quidem,
sed iam progressu morbo. Sic enim ferè poste-
riorum Medicorum vsus est. Veteres autem
vehementioribus remedijs vsi sunt. Latus la-
na sordida leniente & concoquente integitur.
Postea etiam in fine morbi, lana sulphurata.
Formulæ sunt.

R̄ olei violat. amygdalarũ dulcium ana ʒ
ʒ. misce, cui adde post initia, mucilaginis semi-
nis cydoniorum ex corticatorum ʒ vj. mucil-
laginis seminis lini ʒ ʒ. ceræ modicum, fiat li-
nimentum pro latere. Postea etiam.

R̄ mucil. sem. althææ & cydoniorum a-
na ʒ vj. mucilaginis sem. lini & fœnugræci a-
na ʒ ʒ. olei cheiri, adipis vrsi ana ʒ iij. œsypi ʒ
ij. ceræ modicum, fiat linimentum. Aliud,

DE SPVTO SANGVINIS.

R^x dialthææ ʒ ij. cum oleo amygdalarū dulcium, fiat vnguentum molle, atq; vbi iam resoluendum est, adde pulueris ireos aut similis ʒ ij. Tumq; bonum fuerit folium bralsicæ ad ignem calefactum & butyro illitum, superponere lateri, atq; vbi ad suppurationē vergit semen nasturtij & sinapi cerato commisceri possunt, quo tempore.

R^x radiceis althææ & liliorum repurgatorū ana ʒ j. ficus pingues numero duas. Coquantur omnia in vino albo, deinde cum axungia & oleo de lilijs, pistentur in mortario, fiat emplastrum molle, cui insperge seminis nasturtij & sinapi in puluerem redacti ana ʒ j.

Cauteriū.

Scarificatio.

T E Ntatis omnibus ijs remedijs, siquidem desperatio est & vires tolerare possunt, cauteriū actuale aut potétiale, quod vocāt, lateri inferendū est. Scarificatio quoq; cū cucurbitula eo modo, quo in lib. de cucurbitula dictū est.

DE SANGVINIS SPVTO.

Caput XXII.

Sanguis e thorace.

A pulmonibus.
Cause & signa.

Sanguis expuitur à thoracis venis, niger, grumofus, fœtidus, cum doloris sensu.

A pulmonibus flauus, tenuis, spumofus, sine doloris sensu: atque hinc rupta, exesa, aut aperta vena. Rupta, affatim erumpit, à clamore, casu, concussione pectoris, perfriktione, plenitudi-

nitudine. Plenitudo verò ex ratione vitæ, suppressis mensibus, aut solenni aliqua vacuatione. Exesis, sensim & per intervalla ab humore acri, quem vel caput demittit, vel ratio vitæ, aliquando etiam inedia collegit. Apertis, ex calidiore & humidior ratione vitæ. Ruptis, glutinantia, quæ citra morsum siccant. Exesis, cibi boni succis & pharmaca sarcotica. Apertis, astringentia conueniunt.

Expuitur sanguis ab arteria aspera, tumq; Ab arteria aspera. dolor sentitur, omnino paucus sanguis expuitur ex faucibus & ore cum screatione non tussi. Tussis enim excitatur cum ab arteria, pulmone, thorace, sanguis excernitur, ex gingivis, tantum leui sputatione eiicitur.

Alijs à capite defluit non adeo paucus, ni- A capite. ger, levis, linguam & palatum commaculans, titillans, ad nares grumos relinquens, ex vulnere, frigore, ebrietate, & capitis plenitudine, Qui si parte aliqua in arteriam defluit, tusses excitat leues, facileq; gargarismis astringentibus suppressitur.

Sanguis quoque aliquando euomitur è Sanguinis uomitus. ventre, liene, hepate, proximisque venis, niger, grumosus, multus. E stomacho vero, aut œsophago admodum exiguus reiicitur. Hæc omnia igitur, prius quàm remedia instituas, distinguenda sunt,

DE SPVTO SANGVINIS,

Catario.

SI sputū sanguinis ex pulmonibus venerit, inedia, silentium, levis respiratio, veneris & vini abstinentia, quies tum animi tum corporis imperanda sunt. medicatis alimētis vtendum est, quæ morbo conueniant. Si à capite defluxio est, supprimenda ex ijs, quæ capite de catarrho dicta sunt. Componenda tussis, quæ vexat grauius. Sanguis, viribus integris ex interna brachij, angusto vulnerere, modica quantitate, sed bis aut ter vna die, aut duobus, detrahi debet. Si plenitudo in causa est, largius. Si suppressis mensibus, vena cruris aperiēda est, & alijs artibus mēses irritandi. Inijcienda vincula coxis & brachijs, ad articulos, & in ijsdē locis adhibenda frictio. Cucurbitulæ hypochondrijs, ilibus atque inguinibus affigendæ, sanguisugæ in pectore aptandæ sunt.

**Sanguinis
missio.**

**Medica-
mentorū
sylua.**

T V M remedijs quæ intro assumuntur & topicis vtendum est. Comparantur illa ex astringentibus, portulaca, plantagine, polygono, omphacio, sumach, galla, cortice glandium, radice rubi, consolidæ, althææ, centaurij maioris, hæmatite, electro, coralla, balau-
stijs, rosis, bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, gummi arabico, tragacantha, thure, mastice, myrrha, melle cocto. Hæc postrema ruptis magis conueniunt, vt illa aper-
tis. Oportet autem vitare omnino quæ nimium
astrin-

astringunt, propterea medicamenta hæc ex glutinantibus, astringentibusque mixtis componuntur, vt si aperta vena est, astringentia: si rupta, glutinantia superent. Sed quia horum vis non facillè penetrat, necesse est aliquid admiscere eorum, quæ tenuium sunt partium, qualia sunt aromata, spica, cinnamomum, fantali, doronicum & similia. Atque vbi immodicè perturbat tussis, etiam narcotica misceri debent, opium, semen papaueris albi, hyosciami albi & cicutæ, cortex radicis mandragoræ, philonium, theriaca vnius anni.

X E N O crates apud Galenum hœdi sanguinem nondum concretum, cum pari mensura aceti elixabat, dabatque tribus deinceps diebus, dosi 3 iij.

Sanguis
hœdi.

Frequens vsus antiquis, maximè initio atque vbi grumorum suspicio, oxycrati diluti, hoc est, aceti ita commixti aquæ, vt bibi possit. Acetum quoque in vsu fuit, sed animaduertenda sunt, quæ de oxymelite proximo capite annotauimus.

Oxycratis.

Coagulum cerui, hœdi, leporis, Græcis & Arabibus hac in re commendantur, quod mirum esse possit, cum natura sunt acri, dirigente & exiccante. Auerrhoes & Arabum familia, parte aliqua refrigerare, astringere, & reprimere scribunt, aut elementari qualitate aut

Coagulas

DE SPVTO SANGVINIS.

proprietate quadam. Certum est experimen-
to, quod & Dioscorides scripsit, & in lacte pro-
bari potest: dissoluta coagulare, coagulata dis-
soluere. Deinde modica quâtitate exhibetur.
& ex ijs quæ vim acrimoniæ refringant. Do-
sis ciceris magnitudo ex oxymelite vel posca,
si grumi dissoluendi sunt: aliòqui ex aqua fer-
rata, plantaginis, & similibus.

Potus.

Rz coralli rubri torrefacti & in aceto ex-
tincti, terræ sigillatæ ana ʒ f. spicæ ʒ f. cum ʒ
ij. succi portulacæ, aut polygoni, vini grana-
torum, lactis vstulati, fiat potus. Aliud.

Destillatū.

Rz carnium limacum coctarum in vino au-
stero, & aqua plantaginis ꝥb. ij. conseruæ con-
solidæ maioris & rosarum ana ꝥb. j. cum de-
coctione limacum, fiat distillatio in alembico.

**Restauran-
tia.**

Rz supradicti distillati ꝥb. j. coletur per ma-
nicam Hippocr. cū sacchari rosati dissoluti in
aqua plantaginis ʒ ij. santali spicæ ana ʒ f.

V B I viribus metuitur expressiõibus v-
tendum est, è perdicibus, turturibus, quarum
ventres astringente materia farciantur, aut di-
stillata hoc modo imperanda sunt.

Distillatū.

Rz Conseruæ rosarum, cornorum, sym-
phyti, ana ʒ ij. electuarij diarrhodon Abbatis,
diamargaritonis frigidi, diatrium santali, aro-
matici rosa. ana ʒ ij. spicæ, cornu cerui, coralli
rubri puluerisatorum, ana ʒ j. f. trochiscorum

de

de terra sigillata, de carabe, de spodio, ana ʒ iiij. seminis acetosæ, portulacæ, plantaginis ana ʒ j. aquarum portulacæ, ros. plantaginis, vini granatorum ana ʒ iiij. decoctionis duarū turturum & vnus perdicis ʒ iiij. cum mica panis albissimi, infusi in vino granatorum, & carnibus vnus capi, fiat distillatio, coletur per manicam Hippocratis, vt prius.

R̄ testarū oui detracta mēbrana interiore ʒ ij. puluerizētur, dētur cum aquę plang. ʒ iiij.

R̄ succi saluix ʒ ij. sacchari ros. ʒ. s. detur ieiunis. R̄ gummi Arabici, rragacanthi assii, boli armeni, ana ʒ j. coralli torrefacti, cinnamomi ana ʒ s. ex lacte cocto. Eodem modo succus ex supradicta materia ad ʒ ij. aut iiij. per se exhiberi possunt, poteritq; inspergi ʒ j. eorum quæ comminuni possunt, aut decoquantur in aqua pluuiali, in lacte, aut aqua fer rata, vel simili. Similiter hordeata, lac amygdalinum ex eiusmodi liquoribus parari debent, ijdemq; pulueres inspergi possunt.

A D M Ouenda thoraci, non quæ astringūt Topica,
vehementer, horum enim vis ad pulmonem non penetrat, cogitque sanguinem in pulmones. Sed iam vacuata copia, sedato motu, vinum astringens cum oleo rosarum, myrtino, cydoniorum: hyeme etiam nardinū conuenit, cum lana sordida in eo madefacta & ap-

DE SPVTO SANGVINIS.

pressa pectori. Loco vini, aceti vsus est æsta-
te, bene carnosio corpore, robusto genere ner-
uoso, nec vrgenti tussi.

Cataplas-
ma.

E thure, terra sigillata, bolo ac oui albu-
mine incorporatis catablasmata fiunt adiun-
genda thoraci, adiungunturque post vsum
lanæ sordidæ prædictæ. Quod si malum ex
perfrictione ortum est, tapsia, sinapi, & quæ
ex his conficiuntur medicamēta, ex vsu sunt.
Oportet autem hæc sinere, dum calor medi-
camenti penetret.

Philonium

IN grauiore tussi, philonij aliquid impera-
mus, quod aliter Græcis aliter Arabibus de-
scribitur. Philonium Græcorum.

℞ piperis albi ʒ xx. opij ʒ x. croci ʒ v. se-
min. hyoscyami albi ʒ xx. spicæ nardi, euphor-
bij pyrethri ana ʒ j. excipiantur melle cocto.
Philonium Arabum.

℞ papaueris albi, seminis hyoscyami ana
ʒ xx. opij, terræ sigillatæ ana ʒ x. hæmatitis
lapidis, croci ana ʒ v. castorei, spicæ, euphor-
bij, pyrethri, margaritarū non perforatarum,
carabe, zedoariæ, daronici, galliæ moscatæ
ana ʒ j. camphoræ ʒ j. cum melle rosato co-
lato incorporentur. Dosis est, à ʒ s. ad ʒ j. cum
succo arnoglossæ, aut vino diluto modico a-
qua rosarum. Meminisse tamen oportet, nun-
quam vtendum esse eiusmodi narcoticis re-

cens

tens paratis, sed semestre spatium expectandum esse, aut eo plus. Neque statim ijs vtendum est, sed tentatis prius leuioribus remedijs, & vbi natura robusta est. Multa ex 5. Methodi colligenda sunt, quæ ad sputum sanguinis pertinent.

D E P H T H I S I.

Caput XXIII.

PHthisis vlcus est pulmonis, quod ferè sputum sanguinis sequitur, aut tussiculam ex acriore defluxione, aliquando etiam ruptos abscessus thoracis, cum videlicet effuso puro in spatium thoracis atq; ita putrescente, nec in tempore repurgato, pulmones exulcerantur. Signa phthisis, tū ex alijs tum ex Hippocrate, & Galeno aphorismo 60. lib. 2. Prognosticorum: & cap. 14. lib. 2. Chronicorum Aureliani. Phthisim sequitur totius corporis languor atque extenuatio, curuantur vngues, cauantur oculi, succedit mortifera illa facies, de qua Hippocrates, capilli defluunt, & sequituralui profluuium, & mors.

Signa

HOC malum, vt incurabile, maxima pars veterum, in nulla spe habuerunt. Itaque initio ibi tergendum vlcus atque resiccandum. Vbi iam satis detersum est, atque iam nihil sanibulum repurgatur, glutinare oportet. Sed dum

Curatio

DE P H T H I S I.

Mel.

hæc fiunt , extenuatio corporis instauranda est. Vtemur ergo mulsæ initio ex aquæ potabilis ℥℥.j. mellis ℥ j.℥. Per omnia vbi detergentum, melle crudo vtendum est: vbi glutinandum melle cocto. Postea verò fœnugræci loti, subinde abiecta priore aqua, decoctione vtimur, in qua octaua pars vel sacchari in calidior conditione, vel alioqui mellis, dissoluitur. Similiter è fricto lini semine, è ciceribus rubris, è nuce pinea resinosa, ex iride illyrica, aristolochia, porro, & similibus descriptis in cap. de Asthmate, alioqui cum quadruplo melle eclegmata fiant, tritis atque in puluerem redactis, quæ possunt comminui.

Ecclegmata.

Cicer rubrum in aqua madeat, atq; ita tumebit, tum siccari debet, torrefieri in latere calente, teri subtilissimè. Eius pulueris ℥ ij. insparguntur mulsæ aut incorporantur, melle.

Marrubiū.

Marrubij M. j. decoquitur in ℥℥. vj. aquæ ad dimidias, colaturæ addi debet ℥℥. j. mellis plus minúsue, idq; totum decoquitur ad crassitudinem.

E succi marrubij ℥ ij. succi caulium, scyllæ, hyssopi & similibum & mellis ℥℥. j. coctis ecclegmata f. quorum vim augeri volunt, si ℥ ij. pulmonis vulpis, ad ℥ j. ecclegmatis admisceas.

Nux pinea.

Nucem pineam resinosam, cum ℥ j. liquiritiæ deco-

tiæ decoques in ꝑb. vj. aquæ colaturæ addes penidiorum ꝑ iij. rursus coques ad crassitudinem: conuenit vbi tenuis sputatio, cumque lenire & coquere oportet. Similiter è butyro, melle & terebinthina, duobus horum aut tribus mixtis. Varianda autem remedia eiusdem generis, ne fiat satietas: diuersi verò generis, cum mutantur indicationes.

Atque dum hæc fiunt, hordæatis cum saccharo aut melle, lacte amygdalino, vino albo, tenui & subdulci, lacte, alijsque rebus quæ vires refouent, vtendum est.

Virium res
Instauratio

I A M purgato vlcere instauratis viribus, alimentis partim mediæ materiæ, partim resiccantibus & glutinantibus vtendum est. Gestatio mollis conuenit, aer siccus, balneum dulce, inunctio, theriaca, mithridatium, emplastra siccantia adiuncta pectori, dropaces atque etiam sinapismi conueniunt. Bolus armenia, terra sigillata & similia imperanda sunt. Hæc ferè placuerunt veteri medicinæ. Posteritas Medicorum eadem obseruauit; quædam etiam addidit. Lacte plurimum vsa est, asinino & caprino, in summa seroso cum detergendum est: vaccino, ouillo & muliebri cum refouendum est: vstulato, vaccino aut etiam cum aqua pluuiali cocto, cum glutinandum est. Itaque initio asinino & caprino cum modico

Lactis usus

DE P H T H I S I.

mellis , ne cogatur aut aceſcat in ventriculo ,
modico quoq; ſalis vtendum eſt. Refouentur
vires lacte muliebri, quod exugat eger è mam-
ma mulieris , alioqui vaccinum bibat recens
mulctum, cū modico ſacchari. Hordeata quo-
que & lac amygdalarum ex lacte vel pullorum
decocto, confici debent. Refouendis viribus la-
ctis cremor cum multo ſaccharo , conuenit.
Vbi glutinandum eſt.

**Lactis præ-
paratio ad
glutinandū**

℞ lactis ℥b. j. aquæ pluuialis , in qua roſæ
maduerint ꝑ iij. ſimul bulliant , ſubinde ferro
candente aut calybe intincto: alioqui.

℞ lactis à quo butyrum extractum ſit ℥b.
ſ. teneatur nocte vna ſub dio, fortiter agitetur
& deſpumetur, cui adde ſacchari roſati ꝑ ſ. bo-
li armeni ꝑ j. ſæpe vtatur. Hoc modo igitur v-
teris lacte.

**Saccharum
roſaceum.**

Saccharum roſatum maximè commenda-
tur. Initijs, recenti: cum glutinandum eſt, ve-
teri potius vtemur. Similiter conſerua roſa-
rum & ſyrupus roſarum. Conſerua datur per
ſe aut cum ſyrupo myrtillorum, aut aqua hor-
dei, in qua cancri fluuiatiles coxerint.

**Cancrorū
præparatio**

Cancri crudi feruefacti prius in aqua & re-
purgati in quadruplo lacte vaccino , aut con-
uenienti, concoqui debent ad dimidias , deina-
de caudæ deſquamatae vel per ſe comeduntur
vel integræ contunduntur, & inde ſuccus in lac
in quo

in quo coxerint, exprimitur. Bibitur lac hoc, aut inde amygdaloga vel ordeatum comparatur, maximè vbi viribus consulendum est, tumque aliquando vitellum oui vnà dissoluimus. Coqui possunt ex aqua hordei. Teste verò cancerorum in fictili vase cremari debent, & glutinando asseruantur. Eodem modo limaces & testudines præparant. Verum oportet multò diligentius expurgari.

Pulmo vulpis in frustula diuiditur, abluatur ex vino, incoquitur leuiter in aqua rosarum, decocto sumach aut simili, tum rursus lauatur, siccatur, vsus tempore in puluerem redigitur 3 ij. cum syrupo myrtillorum exhibentur, vel hoc modo:

Pulmonis
vulpis præ
paratio.

℞ pulueris pulmonis vulpis, capillorum veneris, seminis fœniculi ana 3 ij. incorporentur cum succo liquiritiæ 3 ij. mellis cocti, quantum satis est, cum affusione modici syrupi de myrtillis.

CONSOLIDANT hæc: Caseus recens, lac vstulatum, testæ cancerorum, bolus armenia, terra sigillata, sanguis draconis, olibanum, mastix, carabe, gummi Arabicum, corallium, rosæ, balaustia, myrtus, & alia eiusmodi. Dantur ex vitellis ouorum, & alia quidem ex lacte vstulato, succo cydoniorum, rosarum, granatorum, syrupo myrtillorum, rosato de siccis. Est

Consolidantia.

DE PHTHISI.

quoque hic Philonij perfici vsus, quod proxime descripsimus.

Nutrientia

Nutriendum aliquando iure galli decrepiti, alterati cū herbis, & cæteris rebus quæ conueniunt. Conueniunt fructus, ficus, vux passæ, pistacea, nuclei pinei, dactyli dulces, pyra cocta & saccharo conspersa, videndumq; maxime circa initia, ne nimium siccantibus utamur: quibus cum volumus uti lenientibus commiscemus, aut multo liquore diluemus. Distillatum refouendis viribus conuenit.

**Restaurans
destillatū.**

Rx conserue horraginis, violarum, rosarum ana ʒ j. s. conserue ireos, epulæ ana ʒ s. electuarij de gemmis sine speciebus, diarrhodon Abbatiss, diatriumfantalorum sine camphora, diamargaritonis frigidi ana ʒ ij. margaritarum perforatarum, coralli, ambræ citrinæ ana ʒ j. passularum, ficuum, sebesten, liquiritiæ ana ʒ vj. nucleorum pini, amygdalarum ana ʒ s. gummi tragacanthi, gummi Arabici, ana ʒ ij. seminis anisi, fœniculi, vrticæ, quatuor seminum frig. communium, seminis papaueris albi ana ʒ j. terræ sigillatæ, boli armeni, rosarum siccarum ana ʒ iij. aquarum pimpinellæ, vngulæ caballinæ ana ʒ iiij. decoct. limacum, cancrorum, duarum iuuenum gallinarum ana ʒ ss. j. cum carnibus vnus capi iuuenis bene pinguis, vnus perdicis, mica panis in vino odorifero

rifero infusi & expressi. ꝥ. j. sacchari albissimi, fiat distillatio. Desperatos vrunt aut relegant ad mare.

DE PALPITATIONE Cordis. Caput XXIII.

P *Amor* quem formidinem cordis quidam veterum appellant, motus est præter naturam ab excretrice incitatus, cum id quod nocet aut nocere videtur, expellere contendit. Idipsum verò aliquando aqua est concepta in cordis panniculo præter modum aucta. Aliquando vapor quidam crassus cordi inclusus, aliàs etiam aliunde importatus, vt è matrice, ventre, & proximis visceribus. Interdum venenosus per arterias & venas illatus. Inflammatio quoque & tubercula, palpitationis esse causæ possunt, vt & intemperies. Quæ omnia ex cordis temperamento, totiusque corporis antecedente vita & alijs signis coniectura artificiali distingues.

SI sanguinis copia in causa est, si aqua concepta panniculis, si inflammatio, aperienda est vena dextra basilica. Auicenna & Arabes dextram, si sanguis causa est: sinistram basilicam, si vapor, aperiunt. Sinistra quoque aperitur, si materia non ventriculis cordis, sed corpore concepta est. Quod si malunt ab inferioribus

Curatio.
Vene se-
cio.

DE CORDIS PALPIT.

partibus inuehitur, aut insignis plenitudo est, venæ crurum secari debent. Galen. 5. de Locis affect. omnes adiutos phlebotomia scribit, & extenuante victu, quibus cor palpitabat: id autem, quia verisimile sit vaporem esse crassum, unde cor palpitat.

Purgatio.

Neq; inutilis est purgatio, si cacochymum corpus est, siquidem ex vitiosa materia excitatus vapor, palpitationem inuehit. Quod ad reliqua attinet, distinguendum est, sit ne causa frigida, an calida, ut inde ratio vitæ instituat, quæ vim medicatam habeat & malum corrigat.

**Inter ca
quæ co
quuntur.**

MAteria itaque calida, ambra, styrax, calamita, muscus, lignum aloes, caryophylli, cinnamomum, cortex citri & citrangelorum, crocus, nux moscata, macis, seminis maioranæ, basilici, vinum aromaticum odoriferum, enula, fœniculum, petroselinum, galanga, zedoaria, amomum, cardamomum, cubebæ, rosamarinum, menta, polium, calendula, theriaca, mithridatum, potio moscata, electuarium lætificans Galeni, diambra, diamargaritum calidum, diarrhodon cum speciebus, alipta moscata, gallia moscata, plirisarcoticum, capus, perdix, & volatilia eiusmodi, confixa lardo, conspersa cinnamomo, assa cum aspersione vini aromatici.

FRIGI-

FRigida, violæ, nenuphar, rosæ, santali, camphora, acetum, omphacium, berberis, cerasa & pruna acidula, acetosa, succus malorum granatorum pomorum oderiferum, acetositas citri, limonum, citrangulorum, persica, carabe, coriandrum præparatum, cydonia, pyra, lac acetosum, diarrhodon Abbatis sine speciebus, diarmargariton frig. diatrium santalorum, condita ex ijs, vt conseruæ & syrupi.

Frigida
quæ.

Ambigunt aurum, argentum, margaritę, coralli, os de corde cerui, rasura eboris, cornu cerui, vnicornis, fragmenta hyacinthi, smaragdorum, sapphiri, blattæ byzantiæ, spodium, doricum, melissa, borrago, buglossa. Sed horum quædam ad frigida, quædam ad calida referri possunt. Ex ijs trochisci comparantur, fiunt epithemata, poma odorifera, stragulæ & vestes, suaui odore imbuuntur. Potiones conficiuntur, quæ & palpitationi cordis & syncope conueniunt.

Ambigen-
tia.

AVRO & argento sic vtendum est: Calefi-
ant in medijs carbonibus, deinde quadre-
sies recalfacta, quadregies extinguantur in
vino aut liquore conuenienti, liquor postea bi-
bitur. Horum quoq; vim relinqui volunt, si cõ-
suantur in ventre volatiliū, dum elixantur,
aut assantur. Retinentur in ore & saliuā deglu-
titur. Hoc modo argentum sitim lenit. Alij

Auri & ar-
genti usus
in Medi-
cina.

DE SYNCOPÆ.

tenuissimis bracteolis vtuntur, quæ folia vocant, & condita electuaria vegetiora reddunt. Rursus alij in puluisculum tenuissimum comminuunt, & ita cum iusculo galli decrepiti, cum colatitijs expressionibus, distillatis exhibent. Sed hæc metalla venena credita sunt antiquis. Est & aurum potabile in eundem vsam.

DE SYNCOPÆ.

Caput XXV.

Causæ euacuationis spirituum.

Syncope est præceps virium lapsus, ex insigni spiritus euacuatione, alteratione, interceptione. Euacuatur spiritus, quia subtilior factus est, quia corpus rarius est, in acri vehementique calore, in vehemente animi motu, cum ijs, quæ excernuntur immodicè, doloris grauitate, morbi magnitudine, fame, abscessus subita eruptione, & maxime in parte principe, aut quæ arterijs plena est, aut neruosa parte affecta, longo labore, ore ventriculi insigniter affecto, vel ab humorum frigidorum copia, vel ab humorum acrimonia, lentore, crassitie: aliquando etiam intemperie, in cruditate, quâ præsertim sequitur alui solutio, intemperie partium principum & consentientium. Vteri affectibus, intemperie calida & sicca, nimis attenuatis humoribus, vitalis virtutis imbecillitate.

Alteratio-

Alteratione verò, intemperie totius corporis, principalium & earum partium quæ con-
sentiant corruptione, vel ab aere pestilente,
vel à venenis externis, humoribus venenosis,
à materia putri retenta in ventre, & intestinis.

Causæ altera-
tionis spi-
rituum.

Interceptione, ab humorum copia, à cras-
sitie & lentore humorum, qui vias spirituales
intercipiunt. Distinctis causis curationem
institues, colligesque ex primo artis ad Glau-
conem, quæ ad hanc rem pertinent: similiter
ex 12. Method. med.

Spirituum
interceptio-
nis causæ.

In euacuatione, refouendæ sunt vires, pau-
co alimento dato breuibus interuallis, distil-
latis, expressiōibus, gelatina, iusculis, vino, a-
romaticis. Puluisculus cordialis,

Curatio
syncopis à
resolutione

℞ margaritarum splendidarum ʒ ij. rasuræ
eboris, ossis de corde cerui ana ʒ j. vnicornis
grana iiij. sacchari violati ʒ ij. vtatur medio co-
chleari cum syrupode acetositate citri. Alius.

Pulvis cor-
dialis frig-
dus.

℞ corticis citri ʒ j. margaritarum splendida-
rum ʒ ij. seminis citri conditi, seminis melo-
num & acetosæ ana ʒ ij. limaturæ auri, fragmē-
torum smaragdi, hyacinthi, sapphiri ana ʒ j. sac-
chari rosati ʒ iiij. misce, detur medium cochlea-
re cum vino albo tenui, odorifero & parum vi-
noso, diluto cum aqua, in qua aurum sæpius
extinctum sit. Pulvis calidus.

℞ mastice, spicæ, ligni aloes, cinnamomi,

DE SYNCOPÆ.

**Puls cor
dialis ca-
tidus.**

caryophyllorum, galliæ moscatæ, nucis moscatæ, cubebæ, cardamomi maioris, granorum paradisi, corticis citri ana ʒ ij. moschi grana vj. cum vino odorifero, fiant trochisci pondere ʒ j. aut ʒ iiij. Alius.

R̄ electuarij de gemmis, confectionis alkermes, aromatici rosati, ana ʒ ij. macis cinnamomi ana ʒ s. sacchari in aqua borraginis dissoluti & siccati ʒ iiij. misce.

Epitherna frigidum.

**Epitherna
ta frigida.**

R̄ aquæ distillationis rosarum, violarum, borraginis, ana ʒ iiij. vini tenuis odoriferi ʒ j. specierum diamarg. frig. ʒ j. s. misce. Calidum.

R̄ vini odoriferi quartaria iiij. aquæ melissæ moscatæ ʒ iiij. misce. Inunctiones.

Inunctio.

R̄ olei de costo & iasmino ana ʒ j. ambræ gra. iiij. Alia.

R̄ olei violarum ʒ ij. cum gra. ij. Alij capurræ musci, fiat inunctio. Inunctiones & epithemata sub sinistra mamma fiunt.

Potiones.

Potiones fiunt in frigida, ex vino tenui odorifero, ex syrupo de corticibus citri, cum aquis mellissæ, borraginis, calendulæ.

In calida, cum syrupo de limonibus, de Persicis, oxysacchara simplici, syrupo acetoso, violaceo, de acetositate citri & similibus. Maxime commendatur syrupus de pomis, qui ita parari debet.

R̄ suc-

R succi pomorum oderiferorum cocti & Syrupi de
 depurati ℥ j. coletur per manicam Hippocra pomis præ
 tis cum sacchari violacei ℥ iij. cinnamomi ℥ ij. paratio.
 Vel recentiorum more, cum æqua portione
 aut paulò minus sacchari, fiat syrupus. Eligun
 tur poma omnino odorifera, partim acedula,
 partim dulciuscula, alioqui pomatio optimo
 vtendum erit, ex quo vel iulep, vel syrupus pa
 rari potest.

DE CHOLERA.

Caput XXVI.

Cholera morbus est acutissimus, ferè si
 ne febre, quæ vel vno die vel altero vel
 certe paucis diebus hominem rapit, substantia
 corporis effusa, partim assiduis vomitionibus,
 partim iisdem deiectionibus. Hippocrates cho
 leræ siccæ meminit commentario quarto, de ra
 tione victus in morbis acut. cuius naturam &
 curationem ex eo loco intelliges.

*Cholera
 sicca.*

IN humida verò animaduertendum in pri
 mis est, vt si fieri potest vomitus compona
 tur, & relinquatur motus, qui ad intestinum
 est. Corrupta enim ferè, ac vitiosa materia quæ
 excernitur. Itaque initio retinenda non est, sed
 tum primū cū inde vires cōcidere videantur.

*Cholera
 humida.
 Curatio.*

Igitur initio aquæ tepidæ, aquæ hordei, ali
 quando etiam adiecto momento sacchari aut

mellis, vbi frigida materia est, imperandus est potus ad $\frac{3}{4}$ vj. Quod si βορβορυσμοίς & flatibus sollicitatur, cochleare medium seminis cumini poterit aquæ incoqui. Hac arte fluctuans in ventre materia, & ad vomitum incitata, repurgatur, ex quo sistendo vomitui intendendum est.

Vomitus
sedandus.

R^z iulep ros. $\frac{3}{4}$ iij. succi granatorum $\frac{3}{4}$ j. s. misce. Utatur breuibus interuallis, duobus aut tribus cochlearibus. Conueniunt & syrupus rosarum, myrtinus, de cydonijs, de granatis & similes, in causa frigida. Idem quoque in causa calida, sed conspersis pulueribus spicæ, cinnamomi, nucis moscatæ & similibus: alioqui syrupus de menta, de absinthio & similes. Oportet autem assumi cochleare, breuibus interuallis & sine aquis. Largior enim potus hic non conuenit. Laudatum ab antiquis remedium ex vini granatorum $\frac{3}{4}$ ij. succi mentæ depurati, $\frac{3}{4}$ s. vt utatur cum cochleari, vt prius.

Potus multus
nō cōt.

Admouenda
uentriculo.

IN causa frigida, vinum optimum tenue & odoriferum aliquando satis esse potest. Imperabis quoque, vt granatum integrum acidum, dulcoratum cum saccharo rosato, odoretur & eger, sugat interim eiusdem quoque grana, cum manducat, Conspergenda facies aqua frigida, aqua rosarum per se, vel in frigore, adiecto vini odoriferi momento, vel mosci modico.

Vten-

Vtendum quoque ijs quæ exterius admo-
uentur stomacho, qualia hæc sunt:

R^z santalorum rubrorum, rosarum ana ʒ ij.
galliæ mosc. ʒ f. camphoræ gra v, madeant in
aquæ ros. ʒ .iiij. aceti ʒ j. f. Panniculi in hac
miscella merfi & expressi, quantum fieri po-
test, frigidi toti ventriculo applicentur. Potest
inungi stomachus, oleo ros. de cydonijs, de spi-
ca, de absinthio, vt res exigit. Quod si time-
tur nimia refrigeratio, miscellæ supra dictæ,
succus mentæ, absinthij, aliquid quoque cin-
namomi, aut vini odoriferi austeri commisce-
ri potest.

Mastieis ʒ ij. aut iiij. cum oui albumine, cum
oleo cydoniorum, aut conueniente dissoluun-
tur, inde fit emplastrum, quod extendi debet
in aluta, formata ad modum scuti.

Emplastrū.

VVLGI experientia est, eboris tabellam
admotam ventri, vomitus compescere. Sed in-
terim dum hæc fiūt, somnus & quies quātum
fieri potest, concilianda sunt.

Tabella ex
ebore uo-
mitū sedat.

CONsulendum viribus, partim odoribus
partim alimentis. Perdiculas ergo, aut recen-
tes pullos columbarum confixos baculis myr-
ti, rubi, cinnamomo, vti res exigit, & consper-
sos interim dum assantur aqua rosarum, vino
granatorum, vino austero odorifero, primum
quidem calidos & plenos fumo, naribus

Virium cō-
seruatio.

DE CHOLERA MORBO.

ægri admoueabis. Ex eo tortiuo prælo succum inde exprimes, expressam materiam naribus ægri admoueabis, succum sorbendum exhibebis. Dabis gelatinam cum succo granatorum distillatam, qualem in sputo sanguinis.

Cucurbitula.
ta.

QVOD si nihil continet æger, prius data aqua tepida, cucurbitulam magnam affiges ventri, & interim dum ea cucurbitula affixa est, cibum exhibebis Breuibus interuallis, cucurbitulam figes, & refiges, & ita nutries.

Dropax.

Consensus est veterum Medicorum dropacismum impositum ventri, singulare esse remedium assiduè vomentibus. Parabis dropacem ex iiij. partibus pitæis, & vna olei cydoniorum simul liquatis, deinde in alura extensis, postremo calidum medicamentum ventri applicabis.

Laudantur vincula articulorum, frictiones mediocres, fons ex oleo, multo magis ubi conuulsio est, vel imminet. Fouetur spina, musculi conuulsi, articuli. Cucurbitulæ quoque & ventri & scapulis affigi possunt.

Symptoma
tum corre-
ctio.

QVOD si refrigerantur extrema linteis calentibus inuoluenda sunt. Si spasmi accidunt, redeundum ad curam spasmi. Si vrget sitis, sem. cucumeris in aqua temperari debent, donec intumeant, tum cortex exterior detrahatur: quod est reliquum, in aqua coquitur, aqua

qua

qua refrigerata bibitur. Cōtra syncopen, tum alijs remedijs, tūm buccella panis imbuta vino, admotā naribus, contenta ore, vtendum erit. Trochisci Rasis.

R̄z masticeis, boli armeni, thuris, ana ꝑ ij. f. Trochisci
Rasis.
cārabe, cardamomi ana ꝑ ij. camphoræ, galliæ
moscatæ, caryophyllorum ana gra. v. cum suc-
co granatorum, fiant trochisci pondere ꝑ iiij.
detur vnus, superhibatur ꝑ j. succi granatorū,
iulepi ros. syrupi cydoniorum, aut similis.

Clysteris hic duplex vsus est, initio reuocan- Clysteres.
dis vomitionibus, & hi simplices esse debent,
postea verò collabentibus viribus, qui leniter
reprimant & astringant.

DE IMBECILLITATĒ

ventriculi Caput XXVII.

Imbecillitas stomachi frequens magis con- Stomachi
imbecilli-
tas conuale-
scens.
ualefcētibus, etiam ab imperfectā crisi, quo
reuocāda sententia Hippocratis: Si à morbo
cibum assumens quis non coroboratur, pluri
alimento corpus vti significatur. Quod si non
assumentī cibū hoc accidit, scire oportet, quòd
indiget euacuatione,

IN conualescentibus ergo, quibus reddita
est appetentia, imbecillitas ventriculi non po- Curatio.
test tantum conficere, quantum appetit. Modi
dica ergo quantitate, sed breuibus interuallis,

DE VENT. DEBILITAT.

cibis boni succi, & qui facile conquoquantur, reficiendi sunt. In alijs quibus appetentia non redditur, reliquæ morbi in causa sunt, quæ optime vel rhabarbaro vel hiera picra ex decocto cicerum vel absinthij repurgantur.

Debilitas
ventriculi
in sanis.

In sanis verò debilitas vel à sola intemperie, cuius indicia sunt: Calidæ quidē, æstus in medio corpore, sitis assidua, os & lingua arida, inæstatio corporis: aliquando etiam extrema vel frigida vel temperata, nec pro ratione æstus calentia, à cibis nidorosi ructus: Frigidæ verò, frigoris sensus in parte infirma, nulla sitis, salivatio aliquando multa, ructus acidi: alia ex arte medica Galeni. Causa quoque nonnunquam materia est, eaque vel quantitate peccat vel qualitate. Rursus vel corpori stomachi atque ventriculi imbibita est, vel in capacitate fluitat.

Intemperies quoque aliquando complicantur, quorū omnia signa collige ex arte medica.

Curatio calidæ intemperiei.

Intemperies contrarijs: Calida quidem frigidæ potu, frictione articulorum, cerato Galeni, cuius hæc est descriptio.

Cerotum
Galeni.

Rz ceræ lotæ in aqua rosarum ʒ ss. olei rosati in aqua rosarum similiter loti ʒ ij. liquefiant in vase duplici, quod cum fuerit refrigeratum, diu malaxetur cum aqua frigidissima, vel succo plantaginis. Imperanda ratio vitæ, quæ refrigeret

frigeret, & contra æstum, ac sitim.

R² seminis cucumeris in aqua macerati & excorticati ʒ ss. tragacanthi dissoluti in oui albumine ʒ ij. Liquefiant in vase duplici. Cum eodem oui albumine fiant hypolotides, aut pilulæ quæ teneantur sub lingua. Quod si syrups vtimur, his omnino abstinendum est, qui acetū recipiunt, nisi humiditas coniuncta sit.

In frigida, volatiliū carnes confixæ cinnamomo, aut lardo, consperso puluere cinnamomi, & ita assatæ. Alimenta omnia calida, vinum odoriferū, aut etiam colatū cū saccharo, cinnamomo, granis paradisi, modico zinziberis & similibus. Fetus è sacco mollissimis plumis anseris pleno, & alijs quæ postea dicētur.

De sicca autem intemperie curanda, dicitur in febris hæcticæ curatione.

Humiditas, si fluit, vomitu eiicienda est: vbi imbibita est, & qualitate peccat, pharmaco repurganda est. Si tātum quantitate peccat, & præter modum stomachum & ventriculum remollit, astringentibus medicamentis mixta aromatum parte ad resiccandum, vtendum erit. Si crassus & viscidus humor est, incidendus oxymelite, aut alijs eiusmodi, tum pharmaco deiiciendus est.

Materia eorum quæ infirmum stomachum è frigore confirmant, cinnamomum, cortex

Curatio frigidae intemperiei.

Siccae curationis ratio.

Humidae intemperiei curationis ratio.

Roboratio refrigerati.

DE VENT. DEBILITAT.

citri, caryophylli, mastix, lignum aloes, zinziber, mirobalani chebuli conditi, macis, menta, absinthium, galanga, squinathum, carui, ammi, flores anthos, vinum aromaticum, nux moscata, piper: Aromaticum rosatum, diagalanga, diacuminum, diatrionpipereon, diacydonium cum aromatibus: theriaca, mithridatium: syrupus de menta, de corticibus citri, mel anthosathum: oleum nardinum, de spica, de menta, in quo aromata calida coxerint, vt piper, cinnamomum.

**Calefactum
roborantia**

Frigida, corali, santali, ambra citrina, coriandrum præparatum, ebur, cornu cerui & vnicornis, cydonia, pyra astringentia, rosæ, diarrhodon Abbatis, miua acetosa, diacydonium sine speciebus, scoria ferri, limatura chalybis, ceratum santalinum, oleum rosarum & de cydonijs, syrupus rosarum & de cydonijs, aliaque eiusmodi, quorum pars in controuersiam temperamenti venire potest, cæterum calidam intemperiem corrigere possunt. Horum omnium vsus, vel quia inde puluisculi & electuaria, potiones quoque confici possunt, aut topica, quæ exterius applicentur.

Ante omnia tamen videndum est ne nimium astringamus, ex quo siccitas immodica contrahitur: ne nimium humectemus, hinc enim virtus harum partiũ dissoluitur. Tepidis vtendum

dum non est, sed vel frigidis vel calidis, quia tempore victus stomachus, relaxatur.

REmedia externa, anteriore parte ad ster- Topica.
ni initia sub pectore aptanda sunt: quâquam
& posteriore parte ad 12. vertebram probata
remedia applicari possunt. Vtraque parte posi-
ta magis iuuabunt. Sed oportet ea quæ poste-
rius apponuntur habere aliquid tenuium par-
tium, quo per difficiliorem viam penetrare
possint.

Humidiori ventriculo conuenit.

R̃z ambræ citrini, masticis, irinis ana ʒ iij, Puluis ad
humidum
ventriculū.
rosarum siccarum ʒ j. s. fiat pul. detur ʒ j. cum
magno cohleari succi granatorum, vel serola-
ctis. Quod si frigiditas coniuncta est, addes cin-
namomi, squinanthi, maceris ana ʒ j. Humidi-
tatem quoque resiccant ferè omnia in frigi-
dis numerata, & vino incocta, quod astringat.
Sed vbi frigiditas coniuncta est, aromata
miscenda.

Ad frigidam dispositionem.

R̃z corticis radicis scæniculi ʒ ij. coquantur Potus refri-
geratio ven-
triculū.
in vini optimi ʒ iiij. ad dimidias. Quod si ma-
ior refrigeratio est, coletur vinum per mani-
cam Hippocratis cum ʒ j. cionamomi. Diatriō
pipereon, diacydonium Galeni cum aromati-
bus conueniunt.

QVOD si flatus adsunt, galanga, grana pa- Flatuloso
ventriculū.

DE VENT. DEBILITAT.

radiſi, cuminum, libiſticum, carui, bacce lauri, iuniperi, et ſimilia vino odorifero incoquenda ſunt, aut in puluerem redacta, macere & cinnamomo adiectis, incorporantur melle anthoſato. Theriaca et mithridatio hic vtendum eſt.

Calorẽ na-
turalem fo-
uent.

Calorẽ reſouent caniculi, pulli, manus ad-
mota ventri, raſura dibaphi, quæ plurimũ con-
uenit, vbi etiam humiditas eſt, cotton, ſacculus
ẽ molliſſima pluma anſeris, pellis leporis, co-
ton in vino odorifero decoctionis mentæ im-
merſum, expreſſum, ſiccatum & ita impoſitũ.
Ceratum ſtomachi cum Galeni vel hoc.

Ceratu ſto-
machale.

R̃z olei de ſpica ʒ iiij. ceræ ʒ. maſticis ʒ ſ.
liqueſiant in vaſe duplici, deinde adde cyperi,
macis, cinnamomi ana ʒ j. commiſce diligen-
ter, & raſura dibaphi excipe, quantũ ſatis eſt,
calidum quẽ appone.

R̃z dialthææ ʒ j. maſticis diſſoluti in oleo
de ſpica ʒ ſ. croci ʒ ſ. miſce, extendatur in alu-
ta pro ſtomacho. Hoc & dolorem lenit, & ſto-
machum roborat. Maſticis grana præmanſa,
& deglutita.

Aciditã
ſtomachi
leniẽ

Concaleſacto verò ſtomacho, vtendum eſt
cerati ſantalini ʒ ij. malaxatis cum oleo de cy-
donijs roſarum, deinde extenſis in aluta. Iulep
roſarum, vinum granatorum, ſyrupus aceto-
ſus ſimplex, ſimiles ſyrupi.

QVOD ſi humiditas calori coniuncta eſt,
aut

aut aliquis humor biliosus, vel in vêtre collect. *Calida & humida in-temperies.*
 vel aliūde inuectus, absinthio, hiera picra, rhabarbaro, cassia & similib. hac ratione vtédū est.

Absinthij decoctum, biliosa deterget & subducit, si quidem altius non fuerint imbibita: & hoc magis melicratum ex absinthio, aut decoctum absinthij cum octaua parte mellis rosati dulcoratum. Infestissimum verò absinthium, quibus pituita ventriculo inhæsit. *Absinthij usus.*

Hieræ picræ & rhabarbari vsus est, vbi imbibitus, humor est biliosus tunicis ventriculi, vtriusq; 3 j. aut 3 iij. ex decocto absinthij, cicerum rubrorū, sero lactis, aqua endiuizæ, satis esse possunt: alioqui 3 j. cassiæ aut catholici imperanda est. Sed ab his roborandus est stomachus. Nec enim, vt hiera & rhabarbarum, confirmare possunt. *Hieræ & Rhabarbari usus.*

Vinum absinthites descriptum à Dioscoride deterget, roborat, appetentiā reddit. Quod si deest, molliores absinthij cauliculos recentes leuiter conuassabis, vino odoro austeriusculo macerabis, & leuiter feruefacies, vel siccos eosdem cauliculos vino infriabis. *Vinum absinthites.*

In imbecillitate stomachi plurimus olim vsus medicamenti è cydonijs. Syrupus acetosus de cydonijs. Rasis & Arabum.

Rz succi cydoniorum per residentiam depurati, sacchari ana ℥b. j. aceti 3 iij. coque ad- *Syrupus acetosus de cydonijs.*

DE VENT. DEBILITAT,

spissitudinem. Conuenit calefacto stomacho
& inde infirmato. Poteris tamen imminuere
modum sacchari, vt erit auctus calor: aceti, vt
erit sensus stomachi. Miua Rasis.

Miua cy-
doniorum
Arabum,

℞ succi cydoniorum struthiorum maturo-
rum per residentiam depurati ℥. j. sacchari
℥. f. coquantur & despumentur. Tum.

℞ zinziberis, spice, cinnamomi, caryophyl-
lorum ana ʒ ij. masticis ʒ iiij. omnia pulueriza-
ta nodulq includantur, & in prædicta miua ca-
lida macerentur: deinde refrigescat & nodulus
exprimatur. Græcorum Miua de cydonijs.

Miua cydo-
niorū Græ-
corum,

℞ succi cydoniorum, mellis optimi ana ℥. j.
℥. acetis acris ℥. f. aut non ita acris ʒ viij. zinz-
iberis ʒ v. piperis albi ʒ ij, succus cum aceto &
melle, modice coquatur, dispumetur, tum in-
de pulueres, & coque ad crassitudinem.

Moderatis omnibus oris ventriculi affectio-
nibus præter quam, quæ ex æstu vehementi o-
ritur, modò descripta duo medicamenta
conueniunt. Aliud.

℞ carnis cydoniorum, mellis ana ℥. j. ace-
ti albi ℥. j. simul bulliant & agitentur, tum ad-
ijce piperis ʒ j. zinziberis tantundem, petro-
selini macedonici ʒ viij. hoc magis adstringit.
Vetri calida intemperie affecto, aut bilioso pi-
per & zingiber subtrahuntur. Ventri tem-
perato, tantum dimidiū piperis & zinziberis.
subtra-

subtrahitur. Aliquando miuæ aromaticæ ʒj. theriacæ aut mithridatij ʒj. commiscetur, daturque ex vino odorifero.

QVOD si etiam dolor coniunctus est, in primis phlebotomia conuenit, ex interna brachij: perseuerante malo, ex vtraque basilica, & hoc magis, si grauis dolor est, si repentinus, si difficilis ructus, & spiritus, si febris est, si dolor in dorsum & scapulas extenditur. Historia est in 5. Epidemiorum de muliere quadam, quæ in vehementissima dolore stomachi, nullis alijs adiuta remedijs, sanata est ducto ex vtraque manu sanguine.

Intemperies
uentriculi
cū dolore.

Sanguinis
missio.

Postea vero leniendus dolor est: & si quidem venter respuat, cucumeris semen & hordei in aqua frigidissima macerari debet, & decorticari, tū adiecta parte liquiritiæ rasæ & recentis coquantur, aqua dispumetur, refrigerata vel niue, vel alijs modis supradictis, propinetur: Vesica ea aqua, vel alioqui frigida ex dimidio plena, sæpius admoueatur.

Doloris sedatio.

QVOD si materia aliqua concepta ventriculo dolorem facit, ea vt prius, commodè repurganda est. Cucurbitula vmbilico, aut ad latera vmbilici affigenda est: dextrum quidem, ab hepate: sinistrum, si à liene in ventrem fluxio est. Suntque omnino tria genera eorum, quæ dolorem leniunt. Primum, quod rescin-

DE VENT. DEBILITAT.

**Dolorem
leniunt.**

dit causam, vt pharmacum & medicamentum, quod intemperiem corrigit. Secundum verò eorum quæ verè anodyna sunt, quale chamæmelum, melilotum, anethum, flores rosmarini, croci, rosarū, violarū, quibus aliquid mentæ, absinthij & eorum quæ stomachum roborant, adiiciendum est. Similiter & furfures, milium, sal, dolorem leniunt: sed frigi debent & sacco includi.

**Sacculi ad
dolorem.**

℞ furfurum M. j. millij conuassati p. ij. salis ʒ j. frigrantur in sartagine, deinde sacco includantur, perfumetur sacculus vino diluto aqua rosarum, & effuso in laterem candentem. Aliud.

℞ florum anthos, ros. viol. chamæmeli, anethi, meliloti ana p. j. summitatum absinthij p. s. fiant sacculi, perfumentur vt prius, & applicentur calidi. Alioqui.

℞ mentæ, absinthij ana p. ij. chamæmeli, florum anthos ana p. j. calami aromatici, squinanthi, mastice ana ʒ j. fiat decoctio in vino odorifero, in decoctione cotton aut rasura bibaphi immergatur, exprimatur & identidem calida applicentur. Materia quoque expressa, ventriculo toti applicetur. Sed videndum ne refrigescat, statimque oleo conueniente vngere oportebit.

Narcotica.

VBI supradictis remedijs non concedit dolor, nar-

lor, narcoticis vtendum est, primum quidem leuioribus, quales sunt syrui rosarum, papaueris, myrti, syrupus violaceus, de nenuphare, cum portiuncula opij, aut ℥ j. philonij.

℞ syrui rosarum & de absinthio ana ℥ j. opij gra. j. bulliant vna leui ebullitione, deinde cum ℥ iij. iuris pulli, detur in potu.

℞ philonij in causa frigida: in calida verò, requiei descriptionis Nicolai, vnus ℥ s. in vino tenui odorifero.

℞ pilularum de cynoglossa ℥ j. dissoluatur in syrui rosati & de papauere ana ℥ s.

Trochisc. stellæ, spicæ, masticis, cinnamomi, squinanthi, castorei, myrrhæ, olibani, piperis, aloes, absinthij, seminis hyosciami albi & mandragoræ, opij ana partes æquales. hoc est, ℥ s. fiant trochisci cum vino dulci, pondere ℥ ij. detur j. cum vino odorifero. Albucasis non reuelandum remedium.

℞ opij ℥ j. cum alilorum capitibus duobus, conquassentur, fiat distillatio in alembico, eius aquæ modicum bibatur. Eadem arte poteris opium commiscere rebus stomachicis supra enumeratis, & inde aquam elicere. Alia narcotica superius descripta. Remedia quoque plurima ex libro octauo κατὰ τόνους petere licet.

Singultus conuulsio quædam est, & prauus motus oris ventriculi, vel ipsius etiam ventriculi, vi retentrice officium negligente, & robustiore expultrice.

Causæ.

SINGultus causæ inanitio, & repletio. Qui ab inanitione, ferè lætalis est, sequiturque insignes euacuationes, vt sanguinis è vulnere, è locis muliebribus, aut aliunde: sequitur dysenterias, diarrhœas, & cætera eiusmodi: ardores quoque & graues inflammationes viscerum: de quo priusquam præsagium instituas, vide num sit à repletionem, minus enim periculosus est, sæpeque cum multa per ventrem euacuantur, singultus à repletionem est, quia pars materiæ, quod ex reliquo corpore confluit in ventrem, tunicis ventriculi imbibitur. Singultu excluduntur non solum quæ in corpore ventriculi, sed etiam quæ in stomacho & œsophago continentur. Sunt qui ad inanitionem & repletionem, adiungant causam singultus perfrictionem oris ventriculi, de quo octauo *κατὰ τό-*
μος, & aphorif. 13 & 39 lib. 6.

Curatio eius qui ab inanitione.

IN inanitione etiam si desperata res est, iuandus tamen æger est distillatis, colatitijs iusculis & expressiõibus, cibis humectantibus, inunctio-

inunctionibus, inunctione dorſi & ventriculi ex oleo violaceo. Hydrælæo quoq; ex aquæ & olei partibus æqualibus adhibendus eſt ſotus.

SI perfrixit, calefaciendus eſt per ea quæ non tam aſtringant, quàm rarefaciant. In perfrictione enim ſtomachus neruoſum corpus, condensatus eſt, ideoq; non tranſpirat, ex quo repletio fit, à qua ſingultus. Vino itaque odorifero cum tantillo cinnamomi & galangæ, malo occurrendum eſt. Stomachus & ſpina oleo de caſtoreo, de piperibus inungenda ſunt, aut inde cerata conficienda, perpetuo ſeruata ratione ne adſtringamus, donec acquieuerit ſingultus.

Curatio eius qui à refrigeratione.

VB I ſtaruum multitudo iſſdem ferè remedijs ſedatur, vino quoq; in quo ruta, roſmarinum, ſemen dauci, cumini, carui, cubebæ, bacce lauri aut iuniperi, galanga, libiſticum & alia eiſmodi coxerint: aut eadem cum vino odorifero, maluatico, aut ſimili colabimus per manicam Hippocratis. Aqua vitæ cum tantillo cinnamomi. Anethum quoq; quadam proprietate, vt volunt, ſingultum ſedat.

Curatio eius qui à ſtatibus.

Electuaria ſunt ex nardo gallica, zinzibere, ſeſeli & proximè enumeratis remedijs cum melle. Mel anthoſatum hîc conuenit, vt confectio de baccis lauri, theriaca vetus & mithriaticum.

DE SINGULTU.

Singultus à
materia
calida.

QVOD si materia aliqua est continens causa singultus, ea vel calida est vel frigida. Calida vacuetur vomitu, si fieri potest, alioqui ʒ iiij. rhabarbari, vel tantūdem pulueris hieræ picrę in sero lactis, vino granatorum acidorū & maturorum, aqua endiuizę, decocto cicerum rubrorum infunde, expressionem exhibe: tum si perseverat singultus, aqua frigida propinetur, & subinde hæ pilulę imperentur.

Pilulę in
calido.

R̄z spodij, seminis endiuizę, portulacę, ligni aloes ana ʒ j. pulpę tamarindorum ʒ j rhabarbari electi ʒ ij. confice cum oxycrato, aut vino granatorum. Aliud.

R̄z syrupi rosarum, acetosę, oxysaccharę simplicis ana ʒ ij. in quibus infunde summitatum absinthij ʒ s. fiat infusio in calidis cineribus, tum duobus aut tribus cochlearibus refrigerati remedij, per intervalla vtatur.

Cerati santalini ʒ iiij. cum oleo rosarum malaxentur, deinde commisce spodij, rosarum ana ʒ j. cum succo semperuiui, agita, inde finges duo scuta in aluta, alterum stomacho ad sternum, alterum ad 12. & 13. vertebam dorfi applicabitur.

Singultus à
materia
frigida.

IN causa frigida vbi crassa & viscida materia, melicrato hyssopi, vel oxymelite simplici materiam præparabis, tum, vt mouebitur per vomitum, aut ventrem, repurgabis ex hiera pi

cra

era dissoluta in decocto cicerum rubrorum: dabis autem hieræ modum, ab ʒ ss. ad ʒ j. Conueniunt in hoc singultu acetum scylliticum, oxymel cum cinnamomo aromatizatum, melicratum ex rebus incidentibus hyssopo, thymo, pulegio, satureia & similibus. Maxime probant galangam.

R̄ ergo vini albi tenuis odoriferi iij. in quo leuiter ferueant galangæ ʒ j. cinnamomi, seminis anethi ana ʒ ss. Conuenit & castoreum in vino odore. ad ʒ ij. Sed quia fædo est odore, cinnamomo, semine apij temperari potest. Cōueniunt & hæc, squinanthum, azarum, maiorana, aristolochia, enula, zinziber conditum, acorus conditus, diatrion pipereon, diacuminum, diagalanga, theriaca vetus.

Exterius verò oleum de lilijs, de amygdalis dulcibus, & iam sedato singultu atq; vacuata materia, ea quæ roborant astringendo.

FIT aliquando, vt materia quædam venenosa sit, cui hoc puluere occurrendum est.

Singultus
uenerata
materia.

R̄ seminis anethi, cardui, citri ana ʒ j. mellissæ, corticum citri ana ʒ ss. coralli rubri, galangæ, macis, cinnamomi, ana ʒ ss. margaritarum, fragmentorum smaragdi ana gr. viij. cornu cerui & vnicornis, ana gr. iiij. cum saccharo borraginato & vino albo tenui, & odorifero, fiant lozangia vel puluis.

Cucurbitulæ.

Quod ad cucurbitulam attinet, iam vacuata materia, primum scapulis, tum pectori & umbilico, postremo ventriculo & 13. vertebræ affigi debet.

In contumaciori morbo.

QUOD si nec ijs quidem resistit singultus, ijs locis phœnigmi aptari debent. Alij in malo contumaciori imperant ellebori ʒ j. galangæ, cinnamomi ana ʒ j. macerentur per noctem in vini maluatici ʒ iiij. colatura bibatur. Alij etiam stupefacientibus vtuntur, de quibus proximè. Nec omittenda sternutatio, quorum formulas superioribus capitibus descripsimus, clamor, & cætera eiusmodi, quemadmodum & repentinæ animi commotiones, timor & terror, &c.

DE BVLMO.

Caput XXIX.

Bούλιμος genus est, quod *φαγιδονα* appellatur, ingens atque insatiabilis appetentia. Eius multæ sunt differentiæ, vt causæ euariāt.

ALIIS longum iter per frigora & nives, aut alioqui externum frigus inde affecto stomacho *βουλίμω*, causa est. Sed initio quidem multa appetunt, postea vero concidit appetentia. Propterea hoc genus ita definit Galenus. *βουλίμω* casus est appetentiæ à frigiditate exteriore, ex indigentia totius corporis, & imbecillitate stomachi, qui vt refrigeratus nimium & resic-

& resiccatus est. Propterea vniuersalis cura- Curatio:
tio in calefacientibus & humectantibus, tum
balneis tum fomentis, & eduljjs posita est. Ap-
petunt ergo ij initio quidem vehementius, sed
tempore nihil appetunt.

ALIA quoque species est, cum acris & Ex mordax
ci humore.
mordax humor inhæsit tunicis stomachi, vt
nulla iam sit appetentia; atque ita contabe-
scit corpus.

Meminit & alterius generis in Libro de Ex uermē
lato intesti-
norum.
Theriaca.

QVIbusdam nascitur in intestinis latus
vermis. Is si diutius ieiunum est, lancinat inte-
stinum & ventrem: vbi vero cibus ingestus
est, exugit atq; depascitur, ex quo destitutum
corpus alimento emarcescit. Aliud quoque in-
diciū est huius vermis proditum ab Aristot-
ele. Quod in egestionibus alui similia semini-
bus cucurbitæ aut cucumeris apparent. Ex-
cludendus hic vermis eo modo quo dicetur
capite de Vermibus.

RVRsus frequentissimus est bulimus in Ex morbo.
his qui cōualescunt, magis etiam si fuerit mor-
bus longior. In ijs enim non solus humor &
spiritus, sed & solidæ partes detrimentum sui
acceperunt. Quā in re vtendum erit præcepto Curatio:
Hippocratis. Quæ longo tempore extenuan-
tur corpora, lentè reficere oportet: quæ vero

breui, breuiter. In breui enim morbo humoribus quidem & spiritibus aliquid detractum est, integræ autem atq; incolumes solidæ partes sunt. Quorum instauratio partim odoribus propter spiritus, partim odoratis alimentis & ijs liquidioribus, propter spiritus & humores: partim etiam solidis, si quidem partes elementares attenuatæ sunt. Ad hæc leges Aphorismum, Facilius est impleri potu, quàm cibus, & quartum de Sanitate tuenda: septimum Methodi: & finem artis paræ.

Summa est vt alimentis boni succi, quæ facilè coquantur, distribuuntur & nutriant, modica quantitate, breuibus interuallis, reficias. Qui propterea quod sæpe sitiunt, vino refo- uendi sunt hoc modo.

Potus.

Lædit vinum vacuo stomacho ante cibum, statim enim differtur in corpus, nervos lædit, vnde tremor, conuulsio, delirium.

Ex immodica verò quantitate, aut non conuenienti qualitate ciborū, recidiuq; fiunt. Tempestius est vini potus in medio cibo.

Post cibum, interim dum alimentum conficitur, abstinendum vino, tùm quod inde fluitat cibus, aut priusquàm fuerit confectus, in corpus rapitur. Quo tamen tempore, si vehementer sitiât, tantùm exhibendum est potus, quantum sufficit, vt desiderium obtundatur.

Iam

Iam confecto cibo, & vt distribuatur com-
parato abunde bibant.

DE CANINÀ APPETEN-
tia. Caput XXX.

Non multum à præcedente morbo dif-
fert, appetentia, quæ canina dicitur. In
hoc enim conueniunt, quod multum comede-
re cogantur. Canina verò, hoc est, contumax
& insatiabilis appetentia, peculiariter est, in
qua multos cibos ingurgitant, sed eosdem mo-
re canum statim reuomunt, quia videlicet na-
tura, multitudinem non sustinet. Nascitur fe-
rè à frigido acidoq; humore tunicis stomachi
imbibito, quo modo spongia liquorem aliquē
exorbet. Nonnunquam etiam ex sola intem-
perie nasci volunt.

Causa.

Intemperies contrarijs corrigenda. In vi-
tioso humore conueniunt quæ incidunt, deter-
gent, calefaciunt: diuretica quoque, eaq; pani,
vino, edulij, mixta aut aliter exhibita, qualia
sunt melicrata è thymi, origani, hyssopi, satu-
reia, pulegij, allij, porri, & similibus decocto;
aut qui ijs respondent syrûpi.

Curatio.

Purgandus quoque humor est ex ʒij. hie-
ræ picræ & conuenienti melicrato. Quod si a-
marorem aloes non ferant, hieræ picræ puluis
incorporandus melle est, aut ʒi. s. electuarij de

Purgatio.

DE CANINA APPETEN.

hiera imperanda est : Alioqui pilulæ fiant ex pul.hieræ & agarici troch.ana ʒ ij.quæ illinantur melle, aut puluis ex ovo sorbili exhibeatur.

Potus multus vini , etiamsi non sitierint, conuenit. Sed in medio cibo, aut pleno ventre verisimilius, quàm vacuo. Vinum giliuum sit, aut vermiculum, nulla prædium astrictione, vetus, dulce, vel acriusculum. Et hæc contra causam faciunt.

Symptomatis curatio.

CONTRA verò symptoma edulia pingua, oleaginosa, quæ relaxant corpus ventriculi, quod acido humore adstrictum est, & vehementius appetit. Omnia frigida, & quæ astringunt, vitanda sunt. Stomachus oleo fouendus est, in quo thymum & proximè dicta materia coxerit.

Vomitum sedantia.

SED quia aliquando consuetudo fit vomitus, nihil retinetur, atque adeò intabescit corpus, modica quantitas alimenti semel exhibenda est, quam etiamsi non retinet ventriculus, cucurbitula ventri infigenda eo modo, quo capite de Cholera diximus.

DE HEPATIS INFLAMMATIONE. Caput XXXI.

INflammat iecur gibbis partibus & cauis, vtrumq; proprijs indicijs distingues, ex ca. 6. lib. 5. de locis aff.

Cura.

C Vratio alia Græcorum, alia Arabum, con *Curatio.*
 venit tamen de phlebotomia. Statim ergo ini-
 cio clyster mollis iniici debet ex ꝥb. j. decocti
 communis, ꝥ iij. olei violacei, in quo dissolue-
 re licet ꝥ vj. calsiæ, mellis rosati, & sacchari ru-
 bri ana ꝥ l.

Reddito clystere eo tempore, quo æger mi- *Venæ se-*
 nus calere videbitur, declinatione accessio- *ctio.*
 nis, venam basilicam diuidito: quæ si non ap-
 pareat, media aut etiam cephalica vulneranda
 est. Probatum quoque antiquis medicis, vt ve-
 næ extremæ manus aperirétur. Galenus eam
 eligit, quæ ad policem vergit, Paulus quæ ad
 minimum. Rasis quæ ad medium. Sed ex his
 parum sanguinis effluit. Grauis autem inflam-
 matio est, & febris quæ vacationem deside-
 rat, & subitam & copiosam, etiam ad animi de-
 liquium, nisi nobilitas partis repugnaret, quæ
 sanè graui detrimento subitam plurimamque
 vacationem non sustinet, ex quo temperan-
 da est euacuatio.

QVOD attinet ad topica, Arabes refrigeran- *Topica se-*
 tibus vtuntur, quale hoc est: *cundum*
Arabes.

R succi solatri tepidi ꝥ iij. cū linteolo aut
 stupis canabinis, fiat epithema. Aliud.

R aquæ ros. ꝥ iij. aceti ꝥ l. santalorum ru-
 brorum & citrinorum ana ꝥ j. camphoræ ꝥ j. *Topica se-*
cundum
Græcos.

DE HEPATIS INFLAM.

aromatum admixtum sit , quod astringendo roboret. Vtrisq; scopus est, vt refrigeretur hepar. Græcis præterea, vt vis eius conseruetur: Arabum remedia qualitate propria refrigerât, Græcorum verò per accidens. Nam apertis poris, resoluta in fumos materia , calorem hepatis euacuant. Græcorum.

Fotus secundum
Græcos.

℞ summitatem absinthij, carnis cydoniorum concisorum ana ℥ iij. decoquantur in aqua & oleo ad consumptionem aquæ, cum stupis canabinis aut linteolis in expresso oleo mersis, foveatur regio hepatis. Alioqui.

Olea.

℞ olei de absinthio & cydoniorum ana ℥ j. ceræ ℥ i. liquefiant in vase duplici , refrigerata malaxentur, cum succo endiuizæ, cichorij aut simili. Olea conueniunt, rosatum, de cydonijs, de mastice, de absinthio, spica, squinantho, in quo fantali coxerint, quæ astringendo roborant. Relaxant verò oleum de amygdalis dulcibus, chamemelo, anetho, meliloto, in quo althææ radix coxerit, oleum lini.

VBI fluxio maior est, maior quoq; infirmitas visceris, plus astringentium, alioqui plus relaxantium miscendum est. In summa lenientibus, resoluentibus, laxantibus, roborantibus acribus vfi sunt veteres, aliquando etiam remollientibus, vbi iam durities suspecta esset. Mucilagines conueniunt cum semine cydonio-

doniorum, althææ, lini, fœnugræci.

QVOD ad potiones attinet, vitanda sunt Potiones
quæ refrigerant & adstringunt, nisi aliquid
commistum sit, quod detergeat & aperiat, pro
pterea aromata antiquis probata sunt. Vti li-
cet squinantho, spica nardi, calamo aromati-
co, cinnamomo, folio, assaro, santalis, campho-
ra. Materiaverò potionum ex hordeo, syrupus
acetosus, iulep factò ex aqua, vel decocto ca-
pillorum veneris, cichorij, endiuiz, fumariz,
cuscutæ, glycyrrhizæ, hepaticæ, quatuor se-
minis frig. maiorum & minorum cum octa-
uo parte sacchari, & momento cinnamomi,
spicæ & similium: syrupus de cichorio, endi-
uia, capillis veneris, fumaria, sed plurimum
diluti, non cum dupla aut tripla aqua, sed po-
tius sextupla aut octupla, diluendi verò supra
dictis aquis.

ELEſtuaria quibus confirmatur hepar, pro-
ximo cap. dicentur. Probatum etiam hoc oleū
antiquis etiam inflammato hepate.

Et rutæ p. ij. squinanthi ꝓ j. lini seminis ꝓ ij. Oleum pro
medium capitis papaueris, coquantur omnia
in oleo. batum.

Ceratum santalinum cum oleo convenien-
ti malaxatur; capiantur ꝓ iij. cerati, malaxen-
tur, extendantur in aluta, fiat scutum ad for-
mam crescentis.

Emplastrū
maioraus.

Emplastrum de meliloto & althæa, vbi maturandum est apostema. Malaxantur cum oleo de lilij, aut in quo radices althææ coxerint: emplastrum factum ex contusis folijs brassicæ, & melle: emplastrum ex ficibus pinguibus, althææ radice, coctis in oleo. Quod si suspicio est infirmitatis, aliquid olei de absinthio & aromaticum commiscendum est.

Reliquiæ clysteribus & leuibus pharmacis subducendæ sunt, siquidem malum est in cauis hepatis.

Gibbæ hepatis inflammatio.

Q U O D si in gibbis & copiosior materia est, primum quidem iisdem remedijs, deinde etiam diureticis vtendum erit, radice graminis, cichorii, endiuicæ, acetosæ, apij, petroselinij, fœniculi, rusci, asparagi, & alijs, quæ postea plenius dicentur.

Laudata herba agrimonia seu eupatorium ab antiquis, & maiorana.

Cucurbitulæ.

C U C U R B I T U L æ vsus tū initio tum inueterato morbo. Quidam enim è veteribus post tri- diē quā missus fuerat sanguis cum scarificatione affigebant dextro hypochondrio, relinquebant vulnus in crastinum atque iterum affigebant. Alij verò iam inclinante morbo, vt reliquias vacuarent, simpliciter applicabant.

DE HEPATIS DEBILITATE.

Caput XXXII.

INtemperies causa est tum substantiæ visce- Signa causæ
farum.
ris tum humorum qui venis & arterijs continetur, atq; imbecilla est attractrix, retētrix, alteratrix & excretrix.

Attractrice infirma, liquida deiiciuntur per aluum, vt alteratrice ventriculi infirma: sed hic cruda & incocta; infirma attractrice hepatis, nō ita cruda, sed ad chyli formam accedentia. Hepate verò attrahente, sed non alterante chylum, simile quid loturę carniū aut sanguinis quem aqua diluerit excernitur, postea etiam non rudimenta sanguinis, sed deteriore qualitate excrementa effluunt. Huius rei causa hæc est: frigidiorē hepate, alteratrix infirma est, ita quę rudiorem sanguinem, quem à mesenterio accepit non conficit. Itaque per interualla excernitur, & loturam carniū repræsentat: vbi verò resistit, crassescit tempore, angustias hepatis intercipit, iam non perspirat, suboritur febricola, interceptus humor putrescit atque aduritur, quo tempore non iam dilutus sanguis, sed veluti fœx sanguinis excernitur. Excretio illa lucet atque aliquando in atram bilem conuertitur.

In frigida intemperie color faciei pallidus,

Signa frigidæ intemperiei.

DE HEPATIS DEBIL.

pulsus tardus, vrina alba, aliàs tenuis, aliàs crassa, non ita frequens neq; copiosa deiectio, neque grauitèr olens, nisi cum iam corrumpitur. Appetentia aliquando corrumpitur, aliquanda intenditur, nulla sitis.

Signa calidæ intemperiei.

Calidam vero intemperiem sequitur color faciei flauus, celerior pulsus, vrina flauo colore saturata, prostrata appetentia, sitis vehemens, fastidium graue, agitatioque corporis, insignis febris, excrementa alui olida, biliosa, admodum crassa, crocea, mordacia. Vomitus quoq; virulenti, æruginosi, ex 8. κατὰ τέμνου cap. 7. & lib. 5. de loc. affec. & alijs.

Cyratio causæ calidæ.

IN calida dispositione fotu atq; irrigatione primum vtendum est, è chamæmelino, rosarū, masticino oleo, in quo absinthij comæ, vel daëtyli incoxerint. Laudatum remedium Græcis & Arabibus, frequens vsus cithorij, endiuiz. Oportet autem hæc, vel resiccata infriare aqua hordei, vel incoquere aqua purissima & adiecta sexta, vel octaua parte sacchari, potiones conficere. Augebitur autem sacchari modus vel minuetur pro ratione.

Cyratio causæ frigidæ.

Hæc eadem in frigida conueniunt, sed loco sacchari diluamus mel, aut vtemur syrupo de eichorio simplici cum aqua absinthij, cuscutæ & similium. Optimumq; fuerit eas aquas prius condire modico cinnamomo, aut adijcere aliquid

aliquid eorum, quæ aperiunt, quale hoc est:

℞ endiuizæ, cichorij sicci & puluerisati ana *Pulula*
 ʒ ij. seminis securidacæ ʒ j. cinnamomi ʒ f.
 fiat puluis, detur è vino albo tenui.

Laudant veteres melicratum è filicis radice *Melicratu*
 detergendo & liberando sine calefactione ma-
 nifesta, aut refrigeratione.

℞ radicis chamæpityos ʒ ij. rad. cichorij, *Potiones*
 ʒ j. squinanthi ʒ ij. coquantur in quartarijs tri-
 bus aquæ purissimæ ad dimidias, colaturam
 percola per manicam Hippocratis cum saccha-
 ri albissimi ʒ j. cinnamomi ʒ f. In frigida & im-
 becilli retentrice atque concoctrice.

℞ nardi celticæ ʒ vj. absinthij ʒ ij. cinnamo *Electuariu*
 mi ʒ f. cribrata melle excipe, fiat electuarium,
 aut decoque in aqua, atque inde melicratum
 compara.

IN frigore & in obstructionibus, olea con-
 ueniunt, in quibus elenij, iridis, gentianæ, co-
 sti radices coxerint. Eædem quoque radices
 infriantur & insperguntur melicrato, vel ex-
 cepta melle exhibentur. Cochleæ & lupi-
 num iecur trita, & in puluerem redacta ex vi- *Iecur lupi*
 no imperantur.

Electuarium de vino Arabû, quod Cyphoi *Electuariu*
 des ab Andromacho & Græcis appellatur. *de uino.*

℞ passularum mundatarum ʒ iiij. croci ʒ j.
 calami aromatici ʒ ij. f. bdellij ʒ f. cassiæ ʒ ij. f.

DE HEPATIS DEBIL.

cinnamomi 3 ſ. ſpica 3 iij. myrrhæ electæ 3 iij.
terrebinthinæ 3 iij. ſquinanthi 3 ij. ſ. ſiliquarū
carrubiorum 3 ij (Galenus 8 κατὰ τόπου, habet,
ramentorum aſpalathi 3 ij. Auicenna autem,
darſifahan) mellis 3 ij. vini ſubtilis, quantum
ſatis eſt, fiat electuarium. Addebant alij in ca-
lidiorē hepate ſemē hyoſciami albi, opij an. 3 j.

Materia ferè conuenit quæ penetrat, ape-
rit, lenit, aſtringendo roborat, abſtergit, in-
cidit, putredinem prohibet, exiccat. Vtuntur

**Penetran-
tia.
Aperiētia.**

ergo ad penetrationem cypero, ſquinantho,
croco, iride, aromatibus. Eadem quoque ape-
riunt, cui rei etiam piſtacea, marrubium, ab-
ſinthium, & alia, quæ cap. de obſtructione he-

**Lenientia.
Abſtergen-
tia.**

patis dicuntur. Leniunt ficus, paſſulæ, vi-
num granatorum dulcium, vinum ſubdulce
& tenue. Abſtergent mel, aqua mellis, tere-

**Incidentia.
Roborant.**

binthina, & quæ inde diſtillantur aquæ, a-
qua hordei. Incidit acetum, vinum granato-
rum maturorum & acidorum. Roborat ſqui-

**Putredinē
arcent.**

nanthum, abſinthium, eupatorium, roſæ,
ſpica. Præſeruant à putredine, & ſi quid eſt
virulentum corrigunt, inprimis cinnamo-
mum, deinde caſſia lignea, nardus, iuncus o-
doratus, calamus aromaticus, crocus, myrrha
electa, aſpaltus, paſſulæ, raſura eboris, cor-
nu cerui, vnicornu, vinum, mel, terebinthi-

**Exiccans
tia.**

na, aromata omnia. In exiccando vtuntur ſpo-
dio,

dio, cuius loco vti licet saccharo rosato admixto cinere, facto ex ossibus elephantis.

A proprietate conuenire volunt, rhabarbarum, spicam, passulas, iecur lupinum, carnes cochlearum.

A proprietate conuenient.

DE MORBO REGIO.

Caput. XXXIII.

REgius est verò signatus nomine morbus, Molliter hic quoniam, celsa curetur in aula, inquit Serenus. Hoc idem Cornelius Celsus. Debet enim omnibus curis esse vacuus ac solutus iëtericorū animus. Quin & splendido conclaui, lasciuijs, cantu, iucundis quoque sermonibus laxandus est. Varro quia curetur mulsa, morbum regium dictum existimat. Vocatur & hic morbus Arquatus vel arcuatus. Iëterus, quia iëtida, hoc est viueram animalculum, quo cuniculos excludunt: vel galgulam autem colere repræsentet. Quaratione & Aurigo nominatur.

CAVsa ferè obstructio, nonnunquam inflammatio aut intemperies hepatis: & obstructio quidem, vel hepatis, vel pororum bilis. Lapillus aliquando concretus est in folliculo felleis, aut adnatum tuberculum. Nonnunquam, quia cystis felleis multitudine intercipitur, vel quod vis eius excretrix infirma est. Venena

Causa.

DE MORBO REGIO,

quoq; aut bibita pharmaca, nec per aluum red-
dita, huius vitij causa extiterunt.

Signa.

PRI mum itaque est vt causam noscas: de-
inde vt eandem tollas, postremo icterum cura-
bis. Interrogabis ægrum, num sentiat grauitas-
tem, tensionem, dolorem in dextro hypochon-
drio: manum quoque admoueabis, vt intelli-
gas, num tumor & durities aliqua subsistat:
quæ omnia si absunt, & excrementa alui, vri-
næ similiter naturaliter habent, iudicabis inco-
lume iecur esse, cæterum effusam in corpus bi-
lem, quæ colorem defœdauit, & quia crassior
est exhalare ac resolui non potest.

Curatio
icteri cū he-
par sanum
est.

Signa ob-
structi he-
paris.

His ergo victum liquidiorum atque humi-
diorem imperabis, balnea aquæ dulcis, in qui-
bus quæ detergent ac resoluunt incoxerint.

Si verò adsint prædicta signa, venterque sub-
sistit, albida excrementa sunt, cineritia & ar-
gillofa, vrinæ spissæ, colore croceo saturatæ,
aut etiam nigræ, tum obstructionis certum in-
diciū est. Inflammatio perpetuo cum febre
est, de qua prius: obstructio ergo curetur, dein
delebitur icterus.

Curatio.

Primum itaque aperientibus & detergen-
tibus insigniter liberanda est obstructio. Ve-
rum si qua suspicio excrementi in ventre &
primis venis, cassiæ aut catholici ʒj. ex sero la-
ctis imperabis. Et quia in hoc morbo, aluus
ferè

ferè astricta est, vtilissimus est clyster, cuius clysteris materia sit ex his, quæ stercus durius emolliant, quæ resistantem bilem irritent. Sic enim placuisse veteribus Aphrodiseus scriptū reliquit.

R̄ ergo malux, bismalux, violariæ ana M. j. fur furum pinguium M s. fiat decoctio ad ʒb. j. plus minusue: in qua dissolue mellis communis, sacchari rubri, ana ʒ j. salis communis ʒ ij. olei communis ʒ iij. Hæc est formulâ, qua per intervalla vti oportebit, vbi diutius venter restiterit.

Venæ
sectio.

P O stea si sanguis multus est, basilicam aut venas extremæ manus aperies, ac pro ratione educes. Solitæ quoque hæmorhoides incitandæ sunt, & menses in mulieribus. Venæ sub lingua, non nisi inclinante morbo aperiri debent, tum enim ea phlebotomia tempestiva est.

Purgatio.

T V M de purgatione agendum est. Verum meminisse oportet, nunquam vtendum purgationibus, obstructo hepate insigniter, nisi prius viam feceris aperientibus & detergentibus.

Aperiunt oxalis, cichorium, endiuia, apium, adiantum, calamintha, fœniculum, gentiana, anchusa, aristolochia, melanthium, securidaca, chamæpitys, rosmarinum, serpillum, hypericon, marrubium, asarum, anisum,

Aperiētia.

DE MORBO REGIO.

petroselinum, amara omnia : aromata, terreni vermes, cornu ceruinum, ebur, cornu vnicornis. Quorum omnium herbas semina, radices aqua incoques, aut vino tenui, atque inde cum saccharo, vel melle potiones comparabis, aut redacta in puluerem ad ʒ ij. mulsæ aut vini albi tenuis, & similium ʒ iij. aut iiij. insperges.

Syrupi in vsu sunt de cichorio, endiuia, capillis Veneris, de byzantijs, de duabus & quinque radicibus, syrupus acetosus, de acerbitate citri, oxymel simplex.

Aquæ verò endiuia, cichorij, lupulorum, cuscutæ, fumarie, capillorum ventris, acetosæ, scolopendrij, raphani, apij, fæniculi, lappæ, rubiæ, libistici, eryngij, rusci, aspargi & similium. Oportetque initio primum vti leuioribus, idque per interualla. Acidus enim aperientium vsus vehementer lædit, atque vbi his vsus fueris, purgationes imperabis.

Purgam;

Rʒ feri lactis ʒ iiij. in quibus per noctem maderint ʒ ij. cartami conquassati: ʒ s. cinnamomi vel ireos florentinæ: alioqui rhabar. ʒ ij. infusas in aqua endiuia cum modico cinnamomo: idem pondus hieræ picræ, hieræ diacolocynthidos conuenire potest. Alioqui.

Rʒ pulueris hieræ diacolocynthidos ʒ iiij. rhabarbari electi ʒ j. cornu cerui, rasuræ eboris, cinnamomi ana ʒ s. dabis ex sero lactis aut
aqua

aqua hordei. Tum ad aperientia redeundum est, & iterum purgandum interuallis.

QVOD si his malum non cedit, medicamentis vtendum erit quæ fortius aperiunt & detergent, atque iam diagridio, colocynthide cathartica acuenda sunt: vt proximis grana viij. vj. iiij. diagridij admiscenda sint. Alioqui.

Si morbus
contumax
tior.

Rz diagridij ℥ j. florum anthos, borraginis & violarum ana p. s. cinnamomi, asari, radicis gentianæ ana grana viij. fiat infusio in sero lactis, in colaturæ ℥ iiij. dissolue sacchari ℥ s. fiat potus. Vomitus quoque etiam cum elleboro, de quibus antea, probati sunt.

ITA curato viscere color fœdus pellen-
dus est thermis siccis, deinde balneo ex chamaemelo, anetho, calamento, roremarino, parietaria & furfuribus: statimque à balneis lineatis asperis & materia balnei perfricandum corpus est. Potiones ex supra dictis aperientibus & detergentibus exhibendæ. Sternutatoria & errhina, qualia prius descripta conueniunt.

Curatio fœ-
dæ cutis.

Oculi & facies aceto albo, aqua hordei, succo granatorum, oxysacchara, succo coriandri, acetosæ, acetositate citri, his quidem tepidis & fouenda sunt & contingenda. Nunquam autem ad fœditatem coloris venies, nisi sublata

Oculorum
& Faciei
cura.

DE MORBO REGIO.

causa & curato viscere.

**Ad hepatis
duriem.**

QUOD si durū hepar est, fouebis ex acetō, in quo althææ & lilij radices, ficus passulæ coxerint, tūm ʒ iij. emplastri de meliloto, vel dialthææ, malaxatis oleo amygdalorum dulciū induces, vel ammoniaci ʒ ij. in aceto dissolutas applicabis. Superioribus remedijs vteris, admixtis ijs quæ leniunt & emolliunt.

**Icterus à
materia
venenosa.**

IN materia venenosa initio quidem vomitus, si eò materia vertitur: si ad intestina, clyster acris: si in habitum corporis, cucurbitulæ cum multa flamma conueniunt, & ea omnia quæ foras materiam attrahunt. Ex quo syrupi acetosi, de limonibus, oxyfaccharæ, acetositatis citri vsus conuenit, cum aquis acetosæ, endiuix, calendulæ, papaueris rubri, dictamni, tormentillæ, succo granatorum, berberorum, limonum, citri, lacte acetoso in quo flores cordiales leuiter bullierint. Deinde & rasuræ cornu vnicornis, cornu ceruini, eboris, electuarij de vino, paulò ante descripti, theriacæ & mithridatici vsus: dantur quotidie ʒ ij. aut ʒ j. cum ʒ j. acetositatis citri, aut liquore conuenienti.

Cutis foetida in uirginibus.

Virginibus quas hoc vitium defœdat, purgatio ex hiera imperatur ʒ j. s. ex aqua alkekengi, cuscutæ, endiuix, oxymelite: Alioqui.

R̄ pul.

R^z pulueris hieræ picræ ʒ iiij. rhabarb. electi, agarici trochiscati ana ʒ s. rasuræ eboris & cornu cerui ana ʒ s. cinnamomi grana viij. croci grana iiij. incorporentur omnia in ʒ s. catholici, deinde dissoluantur in sero lactis, aqua cuscutæ, asparagi, aut liquore simili. Imperetur quoque hoc electuarium.

R^z elect. diatriumsantalorum, diarrhodon *Electuariū.* abbatis ana ʒ s. vtriusque diamargaritonis, ana ʒ j. rasuræ eboris & cornu cerui ana ʒ s. sacchari in aqua cuscutæ & roris marini dissoluti quantum satis est, fiat electuarium per lozangias, ponderis ʒ j. dentur mane & vesperi, per se, vel cum liquore conuenienti in cochleari: Alioqui.

R^z radices gentianæ in puluerem redactæ ʒ iiij. cornu cerui & rasuræ eboris ana ʒ ij. cinnamomi ʒ j. sacchari ʒ s. detur sæpe medium cochleare ex vino albo tenui. Vtantur quoque per interualla decocto cicerum rubrorum, in quo radices petroselini & cichorii coxerint.

DE HEPATIS OBSTRUCTIONE. Caput XXXIIII.

Obstruitur hepar à crassis flatibus, sed facile discutiuntur: non ita facile à crassis viscidisque humoribus, fereq; sentitur lancina

Causæ & signa.

DE HEPATIS OBSTR.

nans dolor aut grauis, aliquando tensio, facies malè colorata est, squalor cutis & pulsus inæqualis, spiratio etiam aliquando difficilis, excrementa à natura euariant, fereque liquidiora sunt.

Curatio

CURATIO magna ex parte ex proximo cap. repetenda est. Incidendum, aperiendum, detergendum, à quo purgandum est, & si numeri (reliqua) consentiūt, è basilica aut venis extremæ manus, sanguis educi debet, nisi à suppressis mensibus, aut mariscis malum natum est, tum enim venæ cruris potius incidendæ sunt.

**Venæ sec.
tio.**

Materia incidentium, aperiendum, ac detergentium proximo capite descripta est. Peculiariter conueniunt syrupus acetosus, oxysacchara, syrupus capillorum Veneris, de cithorio, de endiuia, oxymel simplex, quibus initio, & vbi caloris suspicio, vtendum est. Item oxymelite scyllitico, syrupo de byzantijs, de duabus & quinq; radicibus, cū aquis cuscute, fumarie & alijs. Probatum est hoc à multis.

R̄ aquæ decoctionis hordei ℥ viij. acet℥ ℥ i. vini granatorum ℥ iiij. sacchari mellis albiana ℥ j. fiat Iulep clarificatum & aromatizatum cum modico cinnamomi, vtatur ℥ iij. mane & vesp̄i.

Purgatio

Purgatio ex hieræ ℥ ij. cum oxymelite, aut
quæ

quæ in fœdis virginû coloribus descripta est, ex rhabarbaro & agarico, addito aliquando diagridij momento, talesq; erunt pilulæ.

R̃ rhabarbari ʒ j. agarici ʒ ij. diagridij gr. iiij. cum oxymelite, formentur pilulæ, vel dissoluantur in liquore conuenienti.

CONTRA obstructions certissimum remedium esse volunt, frequentem vsu huius pulueris.

R̃ electuarij diarrhodon Abbatis, diatriû santalorum, rosatæ nouellæ an ʒ ij. detur ʒ j. in cochleari cum gr. vj. mali granati. Aliud, Ad obstru-
ctiões res-
medium
certum.

R̃ succi granati acidi & dulcis ana ʒ j. s. resideant per noctem in salubri loco: postridie addatur oxymelitis ʒ j. fiat potus. Aliud.

R̃ succi endiuixæ cocti & depurati ʒ j. oxy saccharæ simplicis ʒ ij. liberalis obstructiões, calorem temperabis, roborabis viscus, putrida excludes. Filicis radix & semen securidæ plurimum probantur antiquis.

DE HYDROPE.

Caput XXXV.

HYdropis tria genera: Ascites ab vtre, quia venter aqueo humore & seroso plenus, vtre rem repræsentat. Commotus his venter fluctuat, quomodo vesica ex dimidio plena. Continetur aqua inter epiploum & peri-

Ascites

DE HYDROPE.

toneum, quanquam & portio excurrit in spatium epiploï & intestini, cum à liene, colo, tenuique intestino, vel ijs partibus, vnde epiploium enascitur, malum ortum est.

²
Anasarca.

Alterum genus hyderos, aqua inter cutem quæ & *μυκοφλεγματία καὶ ἀνασάρκα*, cuius materia iam crassior est, effusa in cutem atque carnosum genus totius corporis. Hic si digitum imprimas, vestigium fit cauum.

³
Tympanites.

Tertium genus est tympanites, in quo plurimus flatus humori commixtus est, vnde distentio ventris, qui percussus ad instar tympani sonitum reddit.

Causæ.

C A V S A hepar est omnino refrigeratum, vel primario vel per cōsensum cū ventriculo, liene, lactibus, tenui intestino, colo, renibus, vtero, pulmone. Nascitur hæc affectio ex immodica euacuatione, aut eadē longius suppressa.

Curatio.

C O M munis ferè curatio medicamentis hydragogis, quæ aquas vel pituitam ducant, diureticis, topicis, & externis remedijs, quæ humorem siccent ac resoluant, quibus si nihil proficitur, ferro & igne vtendum est.

Phlebotomia.

L E V cophlegmatix peculiariter conuenit phlebotomia, & ea quæ magis incidant: vt tympaniti quæ flatus discutiant. Phlebotomia igitur in solo hoc genere aquæ intercutem locum habet: nec hoc quidem perpetuò, sed si

otio

otio & antea cta vita, si suppressa aliqua solenni vacatione vitium natū est. Morbi initio, prius quā in cachexiam abeat morbus, integris viribis, hoc Hippocrati, Asclepiadi & Galeno visum est. Oportet autem neq; semel, neque copiosè detrahare, sed modicè atque per intervalla, fereq; placuit, vt è malleolis detraheretur sanguis.

LEVIbus pharmacis & per intervalla *Purgatio.* datis euacuandi, vt octauo quoq; die, vel duo decimo, vt vires tolerant.

R̄ benedictæ ʒ i. dissolue in sero lactis.

Pilulæ de rhabarbaro maximè laudantur, quæ aliter à Rase, alter à Mesue describuntur. *Pilulæ ex Rhabarbaro.* Præferendæ sunt Rasis, quæ recipiunt rhabarbari, succi agrimonix, seminis endiuix ana ʒ. iiij. agarici ʒ v. foliorum laureolæ infusorum in aceto & siccorum ʒ x. fiant pilulæ. Dedit Rasis ʒ ij. s. sed ʒ j. satis esse potest. Leuiiores fient si sine folijs laureolæ formentur, è succo ireos, in quo mesereon, laureola, vel euphorbium maduerit. Similiter pulueris hieræ ʒ j. agarici trochiscati ʒ j. cum oxymelitæ formentur pilulæ. Quod si in oxymelite proximè dicta maduerint fortiores fient. Aliquando vti licet puluere diacolocynthidos ʒ iiij.

R̄ seminis cartami conquassati ʒ ij. aut *Succus radicis iridis* iiij. ireos florentinæ ʒ j. cinnamomi ʒ i. infun-

DE HYDROPE.

dantur per noctem in ℥ iiii. feri caprini.

Frequentissimus vsus est succi radicis ireos per residentiam depurati, & eius quod supernatat, capiantur ℥ ij. ℥ s. aut ℥ vj. cum æquali mensura aquæ mellis, aquæ destillatæ è terebinthina, feri lactis. Quod si ab hepate metus est, ne pharmaco lædatur, admiscendum aliquid, vt ℥ j. electuarij diatriasantalorum, vel diarrhodon Abbatis. Et hoc quoq; laudatū est.

Ius galli decrepiti.

℞ polypodij quercini ℥ ij. seminis cartami ℥ s. seminis anisi & fœniculi ana ℥ j. conquassata omnia in nodum, linteolo constringantur & vnà cum gallo decrepito coquantur, ius galli sorbeatur. Aqua extillata è pureis floribus ireos data ℥ vj. vel ℥ j. quantitate, cum ℥ j. electuarij diatrium santalorum & gr. viij. cinnamomi: efficacissimè aquam hydropicorum ducit. Laudantur aquæ alkeken-gi, medij corticis sambuci, eiusdem radicis, ebuli, aut ex eorundem floribus, smilacis hortensis, iuniperi, raphani, cuscutæ.

Aquas ducentia.

Cæterum cathartica eiusmodi, quæ aquas è corpore purgant, electuarijs diatriasantali, diarrhodon Abbatis, squinantho, spica, santalis meliores reddes.

Cucumeris agrestis ulus.

Cucumer agrestis in frequenti vsu fuit & Græcis & Arabibus, quo sic vtendum est.

Corticis radicis cucumeris agrestis ℥ j.
infria

infriatum insperge mulsæ, sine molestia pitui
tam ducit, nec stomachum lædit. Secretum
non reuelandum.

R^x succi cucumeris asinini & radicis eius, **Secretum**
succu laureolæ, succi ireos purpureæ, succi ab
sinthij & eupatorii ana ʒ iij. resideant, quæ su
pernatat aqua, abijciatur: crassiori vero parti
insperge rhabbari, agarici, ana ʒ i. spicæ
nardi, seminis endiuæ, scariolæ, portulacæ,
masticis, laccæ, tragacanthi, salis gemmæ, ana **Alij lappa**
ʒ j. mellis collati ʒ i. in vase vitreo reposita a-
gitentur sole vt fiat veluti conserua, detur ʒ j.
per interualla.

Optimum est vti sero lactis caprini, in quo
maduerit cacumen absinthij, cuscuta, gr. x. al-
kekengi, fumaria, semen maioranæ, squinan-
thum, spica.

Non habet par remedium Rasis, Syrupus
acetosus cum aqua cuscutæ, vbi & sitis extin-
guenda est, nec calefaciendum hepar, vb ob-
structio liberanda, & vrinæ deduci debent.

Grauius sitiunt hydropici, quibus tamen **Sitis**
potio danda est, non vltra quàm quòd vi-
tam sustineant, Vinum album tenue, subau-
sterum, in quod diuretica prius coniecta fue-
rint. Oxycrati vsus est, cum calor vehemens
accescit, liquiritia ad ipsos appellata, quòd pro-
hibeat siti hydropicos.

DE HYDROPE.

Vomitus.

Probatur alijs Metrodori factū, qui hydro-
picus, plurimū quidē bibebat, sed statim reuo-
mebat. In ijs igitur qui & facilē & sine mole-
stia vomunt, probari potest, nam & vomitus
utilis est hydropicis. Clysteribus quoq; acri-
bus & glandulis materia minuenda est.

Diuretica.

D I V retica conueniūt, berula, iuncus odo-
ratus, spica nardi, asarū, phu, meū, carpobalsa-
mum, cassia, radix dulcis, rosa, semen hyperi-
ci, dauci, smyrni, petroselini, calamus aromata-
ticus, seseli, cancerorū flumiatilium siccatorum
pulis, cum æquali parte asari. Ita etiam erina-
cei siccati in sole 3 j. mel scylliticū, cantharides
integræ, & alijs diureticis cōmixtæ, sed mini-
ma quātitate, vt ad gr. v. Hæc aut vel in pulue-
rē redacta, vel cōcocta, dātur, ex vino, oxyme-
lite, mulsa, aquis cōueniētibus, quales prius e-
numeratæ sunt, & ca. de Oppilatione hepatis.

Abominabilis vrinæ potus, sed maximè
probatuſ medicis: tolerabilior si ex puero im-
pube distilletur cum melle, & alijs diureticis.

Topica.

NEq; satis est phlebotomo, catharricis, diu-
reticis, vomitu, clysteribus & glādibus vacua-
re materiam, sed loca tumētia sacculis, vnctio-
nibus, fricationibus, balneis, emplastris & alijs
rebus huiusmodi resoluenda sunt.

S A C culi fiāt è macribus furfuribus, milio,
panico, sale, sulphure callidis, & ita appositis.

Sac.

Sacculi quoque ex arena & sabulo vel ci- Balnea
neribus calefactis sæpius apprimantur.

Materia balneorum & vaporationum in
thermis siccis, aquæ naturales, salæ, sulphuro
sæ, & reliqua eiusmodi, quæ si desunt, arte
componantur, liquefacto sale sub quadruplo,
eoq; plus minúsue, vel sulphure in aqua dulci:
Possunt quoq; incoqui anethum, ruta, chamæ
melum, calamentum, maiorana, rosmarinū,
pulegium, fœniculū, satiregia, hyssopus squi-
nanthum, stœchas, & similia.

Sunt qui veluti arcanum probent lapidem Lapis ser-
pentis.
serpentis. Coluber aquaticus à cauda funicu-
lo cōstringatur atq; ita suspendatur, vt sit sub-
iectum vas aqua plenum: euomet coluber la-
pidem, qui totam illam aquam consumet. La-
pis è vinculo alligetur, & apprimatur ventri
hydropici, paulatim aquam consumet.

Laudatur oleum scylliticum, vel in quo de Olea:
cima pars euphorbij, meserei, vel laureolæ co-
xerit. Sit autem oleum anethinum, aut simile.

R̄ terebinthinæ ℥. j. thuris, masticis,
myrrhæ ana ʒ s. ladani, nucis moscatæ, caryo-
phyllorum, galangæ, zedoariæ, cubebæ, ana ʒ j. s. foliorum laureolæ p. j. succi ebuli &
cucumeris asinini ana ʒ iij. redigantur in pul-
uerem quæ redigi possunt, misceantur, fiat di-
stillatio in alembico, qua inungantur loca tu-

DE HYDROPE.

métia. Cochleis tritis vti licet & emplastri modo affixis. Mirabile volunt hoc emplastrum.

**Emplastrum
mirabile.**

Rthuris, masticis, myrrhæ ana ꝑ j. bac-
carum lauri ꝑ ij. costi ꝑ s. cyperi ꝑ j. s. sterco-
ris caprini triti ꝑ iiij. mellis quantum satis ad
congregandum emplastrum.

Sinapismi.

Sinapismi, diaspyrathun, capite de lethar-
go prius descripta, stercora animalium calida
conueniunt: fricationes ex sale in hydrelæo
dissolutis, vel ex medicamentis calidis subti-
liter comminutis.

**Vesica-
toria.**

P E R S Euerante malo, phœnigmi ex radi-
ce schrophulariæ, ranunculorum & similibus,
emplastri modo impositi ad decem horas præ-
scribendi sunt. Oportetque vesicas configi,
vlcera aperta conseruari, superposito folio
brassicæ vncto è butyro vel oleo, grano cice-
ris aut ceræ momento. Permittetur aqua flue-
re ad sexaginta dies, alioqui cauteria inducen-
da ventri in ambitu vmbilici, & quibus par-
tibus tumor est. Scarificationes quoque con-
ueniunt.

**Paracen-
tesis.**

S E D si nihil proficitur ijs remedijs, ex-
tremum est paracentesis. De paracentesi ma-
gna olim controuersia, alijs medicis omnino
reprobantibus, alijs approbantibus. Vtriusq;
sectæ argumenta, colligit Aurelianus libro ter-
tio *ἡρόντων*, capite de hydrope. Illos enim deter-
rebat

rebat quòd plerunque moriuntur omnes, qui puncti fuerint. Qui verò remedium temperabant neq; in omnibus utebantur, atq; ita seruabant aliquos. Galenus, Paulus, Albucasis, Mesue, in ascite pungunt ad latera vmbilici, qua parte ilia inania sunt, & propè excarnes musculi. Alij quidè dextra parte si lien, sinistra, si hepar in vitio est. Alij verò ex eadè parte qua viscus est, à quo malum primum ortum est. Si verò intestina in causa sunt, quatuor digitis sub vmbilico, sed paululū reducto phlebotomo in latus. Hippocrates intercutaneos pueros incidit, de locis in homine. Aurelianus consensu veterum in intercute magis quàm ascite paracentesim probauit. In aqua intercutem Asclepiades quatuor digitis supra talū, tibiam compungit interiori parte, ea profunditate, qua vena inciditur. Qui locus compunctus, si parum aquæ reddit, femora, scrotum, pudenda, si quidem intumuerint, loca etiam supra manuum articulos incidenda sunt ex Zeonide & Hyppocrate. Formulam verò punctiōis ex sexto Pauli & alijs collige.

Tempestiua autem est pūctio prius quàm in cachexiam morbus abierit, firmis viribus, iuuenili corpore, si atra bilis hydropem non contraxit, si validus stomachus, si æger non febrit: aut si febrit, remissionis tempore. Hæc

Qui pūcti
gendi.

DE SPLENITICIS.

omnia prouidenda sunt prius quàm de paracétesi decernas, alioqui temeraria via est. Quæ etiam si adsunt, præmonendi tamen amici ægri, quanto cum periculo remedium tentetur: tentariq̃ue debet vbi alijs remedijs nihil profectum est.

DE SPLENITICIS

Caput XXXVI.

Splenitici
qui.

Spleniticos appellât, quibus induruit lien, Sgrauitas in latere sinistro sentitur. Difficultas est anhelitus, sitis, oris siccitas, pedum inflatio, color plumbeus, decubitus in sinistrum latus grauis, extat durities oblonga, dolor ad iugulum sinistrum tendit, pediculis scatent, nocte sudor grauis, fœtet anima, pudenda turgent, erumpit sanguis, gingiux corrumpuntur, venæ ad lienem nigricant, & squalescit cutis, vlcera maligna in tibijs nascuntur. Quorum aliqua vel omnia lienosos produnt.

Curatio.

INITIO molliendus venter cassia vel catholico. Quod si in inferiori parte visceris scyrthus est, clysteribus vtendum erit.

Venæ sectio.

POST hæc phlebotomia conuenit è basilica sinistra, in duos dies diuisa vacuatione, amplo foramine. Quod si vires suspectæ sunt, vena quæ ad medium digitũ vel minimum venit, incidenda est. Alij venam post aures diuidunt, & sanguine qui effluit, lienem inungūt.

Vete

Veteres enim naturali quadam ratione atque beneficio constare crediderunt, superfluum sanguinem languenti membro præstare medicinam, quod etiam veterinarij retinēt. Constat quoque certo experimento, venas apertas, quæ ad lienem nigricant, vehementer profuisse, vt inde inueteratum malum & contumax omnino curatum sit. Iisdem venis sanguisugæ & cucurbitulæ cum scarificatione affigi possunt. Sed hæc localia remedia iam bene vacuato corpore conueniunt.

P V R gandum quoq; corpus est, idq; interuallis, pharmaco quidem per os sumpto, si quidem magnus tumor est, aut superiori parte visceris. Clysteribus verò, si & exiguus tumor, & inferiore parte visceris collocatus. Evacuatio

Diuretica non ita profunt, quia à liene ad Diuretica; renes non ita comparata via est. Cæterum iuuare possunt alia ratione, quia videlicet incidunt & aperiunt.

Potiones & melicrata ex cortice radicis capparis, scolopendriæ, capillaribus, roremarino, radice tamarisci, semine agni casti, endiuæ, scariolæ, portulacæ, seminibus illis maioribus & minoribus, cortice & radice salicis, fraxini, genistæ & alijs, quæ capite de oppillatione hepatis descripta sunt.

Purgationes ex epithymo, folijs sene, pul

uere hieræ diacolocynthidos & alijs quæ ca-
pite de melancholia descripta sunt: ex sero ca-
prino, aqua fabrorum, aut ea in qua chalybem
sæpe extinxeris,

Aqua ex co-
sibus destil-
lās inter a-
cuendum.

Laudatur aqua depurata, quæ è cotibus de-
fluit cum enses acuuntur, lixiuium, oxymel,
acetum scylliticum, syrupus acetosus, syrupus
capillorum veneris, de pomis, aquæ & cæte-
ra, quæ partim capite de oppilatione hepatis,
partim capite de hydropisi dicta sunt. Cap-
parum vsus & oleo & aceto plurimum lauda-
tur, laudatur vas è ligno fraxini comparatum,
quo vtantur dum bibunt. Corallus quoque tri-
tus ex syrupo acetoso.

Durities
lienis.

D V R Ities verò, quod attinet ad topica,
mollientibus, incidentibus, resoluentibus cu-
randa est. Astringentia quoq; commiscenda,
vt inde roboretur viscus, plus minúsue pro ra-
tione fluxionis & infirmitatis visceris. Mol-
lies hoc vnguento, incides ac resolues.

Emplastrũ.

Rz olei de capparibus 3 vj. medullæ vitu-
li, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dis-
soluti ana 3 ij. aceti 3 j. ceræ quantum satis
est, fiat emplastrum molle ad formam linguæ
bubulæ. Remollit butyrum, adeps, ex capite
septimo, libri quinti de Simpl. & libri quuinti
κατὰ γένν, aliaq; per multa. Radix lilij, maluæ,
bismlauæ, brancae vrsinæ, id est acanthi. Scyl-
la quo-

læ quoque radices in oleo & vino austeroco-
 quantur ad consumptionem vini , deinde ad
 formam emplastri imponuntur. Ficus pingues
 similiter præparatæ, ammoniacū in aceto dis-
 solutum & ex oleo rosato, oleo in quo scolopē-
 drium cōxerit, oleo amygdalarum dulcium,
 de lilijs, de cucumere asinino, de hypericis, de
 behen, de capparibus. Cōuenit & emplastrum
 de meliloto, dialthææ, cerotum hyssopi, diachy-
 lon sine gummis cum mucilaginibus radicis
 althææ, lini, fœnugræci. Vbi iam remollita du-
 rities est, lapis molaris, pyrites , aut lapis alio-
 qui durissimus aceto acerrimo candens extin-
 guitur, linteis inuoluitur, & sæpius apponitur,
 alioqui fumus excipitur. Sed ijs vtendum est
 solum, cum iam aliqua ex parte remollitus tu-
 mor est: à quorum usu ad remollientia redeun-
 dum est, oportetque per interualla alternatim
 vri ijs remedijs. Postea verò fortioribus vten-
 dum erit, ac primum quidem opopanax am-
 moniaco miscendus est.

R^z ammoniaci ʒ j. f. opopanax ʒ ʒ f. dissol. Fortiores,
 uantur gummi in aceto , deinde malaxentur
 cum oleo de cucumere asinino. Iam quoque
 miscebitur emplastrum Agrippæ, & vt minue-
 tur tumor, veniemus ad emplastrum de fer-
 mento, ad dropaces, ad sinapismos, ad cauteria
 tum potentialia, tum actualia. Sacculis quo-

DE LIENIS FLUCTVAT.

que vti oportebit resiccantibus ac resoluentibus, nunquam tamen neglecto remollientium vsu. Sacculi.

Sacculi.

℞ milij parum conquassati p.ij. salis p.s. torrefiant in tegula calida, fiant duo sacculi longitudine dimidij palmi, interpastati in linteo trito & raro & perfumigati cum aceto acerrimo, in quo lapis durissimus & igne candens extinctus sit.

CONTRA RVGITVS ET FLV-
Etuantem aquam è regione lienis.

Caput XXXVII.

Causa.

FRequens hoc malum est ortum à frigore, quod post plenilunia, frigidioris celo, post vsu aquæ & frigidiorum, magis apparet.

IN hoc casu purgandum corpus est per interualla ex hiera tum simplici tum diacolocynthidos. Vel.

Purgatio.

℞ aloes succotrini ʒ iij. rhabarbari electi, agarici trochiscati ana ʒ j. s. ceterach, scolopendrij, seminis agni casti, & endiuiz ana ʒ s. cinnamomi, asari, spicz, rasuræ cornu ceruini, rasuræ eboris, coralli, ana gra. viij. cum aceto scyllitico, formentur pilulæ vtatur ʒ j. singulis hebdomadibus. Exciccanda quoq; aqua sacculis.

Sacculi aquam exciccantes.

℞ cumini p.ij. seminis agni casti, seminis rutæ, ana

DE COLICO DOLORE. 98

ana ꝓ j. grosso modo conuassata & in regula siccata, duobus sacculis, vt prius includantur, & calidi sacculi alternatim applicentur.

Vaporatio quoque conuenit ex durissimo lapide candente extincto in aceto, in quo ebullus, folia salicis & scolopendrium coxerint. Vaporatio

Vnctiones quæ in ascite. Radix acori in aceto cocta tum addita octaua parte seminis nasturtij, emplastri modo imponitur. Lepidium quoque per se tritum & calido aceto mersum. Videndum tamen ne refrigescant.

Conueniunt spleni à proprietate, splen asini domestici & syluestris, pulli equini, vesperilionis decollati corpus: cremantur hæc in vase testaceo. ꝓ j. pulueris; vel eo plus, ex oxymelite imperatur. Splenitica à proprietate.

DE DOLORE COLICO A MATERIA phlegmatica. Caput. XXXVIII.

Colicæ multiplex causa est. Ac primum de phlegmatica. Itaque colligitur pituita crassa & frigida, atque aliquando vitrea, ostio, intemperante vita, obstructis vijs per quas bilis in intestinū defluit. Hinc dolor excitatur quasi infixi pali, certoque loco insistit: sed vt plurimum ad inguen sinistrum & vtrunque renem ascendit, vbi angustius est. Quæ angustie efficiunt aliquando, vt hac parte dolor colicus Colica à phlegmate.

DE COLICO DOLORE.

gravius intendatur. Hinc ad splenem & ventriculum iam laxius extenditur, subitque hepar, hæretq; aliquando cysti fellis. Postremo in dextrum ilium descendit, vbi definit in cæcum quod ad renem dextrum positum est.

Signa.

Distinctio
nephritidis
& colicæ.

Dolor hic fixus, vt in angustijs quæ ad sinistrum renem sunt, nephriticum dolorem repræsentat, vt etiam peritos Medicos fallat. Sed in nephritide vrinæ tenues, albæ, postea etiam cum asperò & sabuloso sedimento: dolor ad coxas extenditur, fomentis & cataplasmatibus mitigatur, inde laxatis vijs non cōmutat locum, aut si cōmutat, perinæum & viæ vterum affliguntur. In colico hoc dolorem vrinæ tinctæ & ignitæ, quæque biliosam naturam falso repræsentant. Impostura fit, quia bilis quæ ad intestinum defluebat, interceptis vijs ad renes diuertit, præclusæ viæ sunt, vt neque ructus, neque strépitus ventris exire possit. Stercora sine succo, plena flatibus, similia bubulis, quæ in iecta aquæ consistant, nec in fundum demergantur.

Causa mali humor ille frigidus affixus intestino, symptoma verò dolor est: qui si vrget vehementius, prius quidem leniendus est quàm affectui consulas.

Doloris sedatio.

QVA E doloris gratia imperantur, ea prodesse solent vel quod intemperiem corrigant, vel

vel causam auferunt, vel leniunt atq; contemperant, aut stupefaciunt. Narcoticorum vsus in hoc genere colici doloris omnino suspectus Græcis, permissus Arabibus. Optimum genus est, quod simul & causam tollit, & dolorem attemperat: Secundum, quod attemperat.

Remedia verò multiplicia: Phlebotomia, purgatio, balnea, exterius admota medicamenta, cucurbitulæ, potiones, amuleta, quæ proprietate quadam colicos curant.

Phlebotomia omnibus ferè relicta est, Octauus approbat, & nostra memoria efficaci admodum remedio, interim vsurpatur: multo magis, si dolor grauius vrit: si bene carnosum corpus est, si vires, ætas & cætera permittunt, remissionis tempore, è basilica dextra, a- uersionis gratia, angusto foramine & modica vacuatione, nisi febris adsit: tum enim multo liberius, atque etiam copiosius sanguis depleri potest.

Q V O D ad purgationem attinet, quia materia contumax est, incidentibus primum, cōcoquantibus atque detergentibus vtendū est, tum ratione vitæ, tum ijs quæ clysteribus iniiciuntur, atque etiam exterius admouentur.

Conueniunt ergo origanum, menta, pule-
gium, marrubium, hyssopus, thymum, maiora
na, ammi, beta, rosmarinum, enula, radix pœo

Medica-
menta.

Simplicia:

DE COLICO DOLORE.

nię, scordium, fefeli, ruta, libiſticum, anethum, chamemelum, aſparagus, aniſum, carui, & dau-
ci ſemina, vinum tenue odoriferum, zedoaria,
galanga, caſtorium, gallia, aromaticum roſa-
rum, puluis ducis, mithridatium, theriaca, con-
fectio de baccis lauri, mel anthoſatum. Centau-
rium minus, vrticę ſemen, aſarum, betę ſuc-
cus, mercurialis, ſal, ſulphur, ius galli antiqui,
ſicus ſiccę, cartamum. Sed hęc claſſis poſte-
rior ſimplicium deterget magis. Iiſdem quo-
que ſcopis hieram, polypodium & ſerapinum
commiſcemus. Olea conueniunt anethinum,
rutaceum, & in quibus ſuperiora coxerint.
Fortius eſt petroleum, oleum de caſtorio, de
euphorbio, piperibus, ſæpeque gummi in o-
leo diſſoluimus, vt galbanum, ſerapinum, qua-
le hoc eſt.

℞ galbani ℥ ſ. diſſoluatur in olei rutacei ℥
iij. aut circiter, aliquando etiam & moſcum &
algaleam & cibetam, ſed minori modo in oleo
diſſoluimus, quale hoc eſt.

℞ cibetę grana iiij. aut vj. diſſoluantur in
oleo rutaceo. Diuitibus moſcus & algalea eo-
dem modo diſſoluantur. Eiufmodi olea vel cū
clyſteribus iniiciuntur, aliquando quidem per
ſe, aliquādo cum decocto conuenienti: iſdem
ea pars in qua dolor eſt, inungitur.

Czic-

Ceterum oportet hoc in primis animaduertere, vt & incidamus & concoquamus citra calorem vehementem, & ijs quę minimę inflant. Calidiora verò conueniunt iam purgata materia, vt inde relicta intemperies corrigatur. Melicrata ex supra dicta materia imperari possunt, & hæ potiones plurimum laudantur.

℞ summitatum absinthij p.j. seminis cumini 3 ij. feruefiant in vino tenui, odorifero, expressio bibatur. Aliud.

℞ aquarum cordialium 3 ij. aquę nepetę 3 j. in quibus dissolue theriacę aut mithridatij, 3 ij.

℞ vini maluatici 3 ij. calami aromatici 3 s. croci grana iiii. ferueant leuiter in calidis cineribus, colatura bibatur. Similiter ex galangę & cumini ana 3 j. feruefactis cum vino albo tenui. Vinum absinthites ab Aetio plurimũ laudatur. Alij recte quidem adiiciunt cumini rosmarintum, vel 3 j. quę feruefiat in eo vino.

Vinum ab
absinthites.

Cucurbitula ampla, & cum multo igne medio vmbilico affigi debet, coquit enim: sed vtilior vsus eius futurus est, si primum impleatur vino calido, in quo aliquid ex supra dicta materia coxerit, & ita calida affigatur. Vtile quoque fuerit aliorum succo aut re simili inungere parte interiori.

Cucurbitu-
la.

Vbi materia iam attenuata & ex parte co-

Euacuat

Et a partim clysteribus, partim catharticis subducenda est.

Clysteres.

In clysteribus ex supra dicta materia compo-
ratis mellis anthosathi ℥ j. olei conuenientis,
vt anethini vel rutacei ℥ iij. dissolui debent. A-
liquid quoq; salis, vt ℥ ij. potius quàm nitrum,
quod ventrem subuertit, dissoluendum est.

PROcedente etiam malo ℥ ij. iij. aut iijj.
pulueris hieræ picræ, aut ℥ j. vel ℥ vj. hieræ,
diaphœnici quoque ℥ l. aut tantundem tere-
binthinæ adijci possūt. Veteres clysteres impo-
rabāt crassiore substātia ex solo interim oleo,
modūq; faciebāt ad heminas duas, hoc est, ad
duas libras, aut nostro more ad quartaria sex.

**Purgatio-
nes.**

PVRgatio leuis esse debet, quales sunt hæ
frequentatæ pilulæ:

R̄ hieræ picræ ℥ l. cum vino albo tenui fiāt
tres pilulæ, coopertæ folijs auri: Paulò fortio-
res, si tantundem addas rhabarbari, oportetq;
à leuioribus ad fortiores progredi. Terebinthi-
na quoque plurimum laudatur, daturq; ab ℥
l. ad ℥ j. inuoluta nebulis vt fiant (quod aiunt)
morselli. Nonnunquam terebinthinæ, ℥ l. hie-
ræ aut rhabarbari incorporatur, vt sint tere-
binthinæ ℥ ij. vel iij.

FORtioribus purgationibus vtendum nō
est, nisi vbi contumacius malum est, tumque
vti licebit ℥ j. pulueris hieræ diacolocynthidos
coacta

compacta in pilulas. Aliquando etiam adijci possunt diagridij grana iij. minúsue.

Laudantur purgationes quæ præter quàm quod purgant, etiam dolorem stupefaciunt, quibus vtendum erit nimium seuiente malo, qualia sunt.

R̄ pulueris hieræ picræ ʒ iiij. opij, croci a- Narcotica.
na gr. j. vel ij. pro viribus, cogantur pilulæ cum vino. Similiter & supra dictis catharticiis ʒ j. philonij commiscebis.

P O S T purgationes clysteribus, fomentis, Topica
balneis vtendum est, ijsque maximè quæ dolorem leniunt, qualia sunt chamæmelum, melilotum, anethum, althæa, semen lini, fœnugræci.

Tumque vtendum erit amuletis, quæ à to- Amuleta.
ta substantiâ conueniunt. Intestinum lupi siccatum, tritum, datum ʒ j. pondere, aut ʒ iiij cum vino albo tenui, in quo chamæmeli flos. vel anethi efferbuerit. Vtuntur varie pelle lupi. Alij enim cubilium stragulas contra hoc malum inde comparant. Alij cingulum gestât, aut partem pellis ventri admovent. Nonnulli sterco lupinum album tritum ex vino albo tenui propinant. Meliora putant, si ossa in stercore inuenta, vnà conterantur. Idem stercus nucula includunt perforata, suspendût è collo, vt ad ventrem, perueniat, atque ad id vtuntur

DE COLICA A FLATIB.

ligula de corio ceruino , aut filo lanæ ouillæ, quæ à lupo interfecta sit, vel vt alij volunt, quæ à lupo euaserit.

Laudant & anguillæ sanguinem. Alaudæ genus cristatum, quod galerita dicitur, vltum, aut elixū cum iure galli. Stercus gallinæ, quæ exercetur & nutritur sicciore pabulo , & oxy-crato. Tunicæ interiores ventriculi erinacei: masculi quidem, in viris, fœminæ, in mulieribus, adiecta tertia parte eorum quæ incidunt, detergent, & alioqui colicæ conueniunt. Hæc probantur Græcis & Arabibus.

Curatio
per narcotica.

A C E R bius verò vexante malo, neque cedente alijs remedijs , narcotica permittunt Arabes , mixta pharmacis , vt prius , vel aliter. Ac primum quidem in clysteribus ex leniente materia capita papaueris concoquemus. Quibus si nihil proficitur, vtetur flocculis , qualis hic est.

℞ olei anethini ℥j. castorei ꝑ s. opij. ʒj. misce, & in eo madefac flocculū lanæ, quem è filo suspendes, suspensum impelles in anum, ac simul atq; acquieuerit dolor, retrahes: vel clystere veteris, cuiusmodi est veterum:

℞ olei rutacei ℥j. opij, castorei ana ʒj. Sed posteritas medicorum oleo admiscet castorei ꝑ s. opij grana v.

Per os verò conuenit philonium Rasis, cuius

cuius hæc descriptio.

R^z piperis, ameos, foliorum rutæ siccorum, menthastri, castorij, baccarum lauri, cumini, Philonitum
Rafis.
ana ʒ j. opij, mandragoræ, seminis albi hyosciami ana ʒ s. mellis ʒ j. in quo cætera incorporantur, datur ʒ j. Quod si catharticum voles efficere, adijcies diagridij ʒ j. Aliud Andromachi admirabile:

R^z piperis albi ʒ j. opij ʒ s. croci gra. xviii. Philonitum
Andromachi.
seminis hyoscyami albi grana xv. spicæ nardi, pyrethri, castorei, vel euphorbij ana grana iij. aut iiij. excipe melle cocto, dosis ʒ j. aut ʒ se. cum aqua frigida.

DE DOLORE COLICO A FLATIBUS, Caput XXXIX.

E Adem ferè curatio colici doloris nati è Causæ.
flatibus. Nam non alia re differt, quàm quòd in primo genere plus est materiæ, ventorum minus: hic verò intestina pluribus flatibus conturbantur, & vel nulla, vel exigua materia est. Propterea minor grauitas, distensio maior, vt aliquando parte aliqua venter in gibbum exuberet.

SINGulare remedium est hic, cucurbitula ampla, imbuta, vt prius dictum est, medicamenti, quæ flatus discutiant, cum multa flamma medio vmbilico affixa.

DE COLICA A FLATIB.

Clysteres.

Clysteribus primum vtendum est, qui fœces emolliant, qualis est ex hydrelæo melle & sale modico. Sed melius fuerit in ea aqua, unde hydrelæon paratur, prius fuisse incocta, quæ flatus discutiant. Sunt autem cuminum, ammi, amomum, feseli, daucus, anisum, fœniculum, petroselinum, carui, nigella, baccæ iuniperi, lauri, vrticę semen, ruta, calamentum, pulegium, zinziber, caryophylli, calamus aromaticus, cinnamomum, piper, galanga. Hæc aromata vino tenui incocta, vel cum vino percolata plurimum conueniunt.

Flatus discutientia.

Victus.

II S autem vina optima, quæque tenui sunt substantia & odorifera non solum ægris, sed sanis conueniunt. Abstineant aqua, diluto vino, fructibus humidis & oleribus. Quæ ratio vitæ imperari debet & viris & mulieribus frigidioribus, quibus plurimi flatus toto ventre colligi solent. Hic etiam aristolochia, castoreo, euphorbio, quæ fortiora sunt, vti licet. Ex his omnibus & melicrata componi possunt, vina quoque reddi efficaciora, condiuntur cibi, olea, vnguenta fiunt, sacculi & fomenta.

Grauidæ.

S E D hic vt in reliquis generibus colici doloris, ratio habenda est mulierum grauidarum, ne quid iniiciamus, aut etiam applicemus, vel aliter imperemus, quod abortum faciat, quale est castoreum, euphorbium, amara omnia. Videndum

dendum rursus, ne nimium aperientibus utamur. Sic enim fit, ut apertis orificijs uteri, sanguis effluat, & sequatur abortus. Præterea neque remolliendum, neque relaxandum nimis: hinc enim dissolutis uteri vinculis abortus fit.

DE DOLORE COLICO A BILE.

Caput XL.

INedia colicos iuuat à frigida causa, lædit vero à calida. A materia acri vehementissimè cruciantur, ut vomitus biliosi, æruginosi, metus conuulsionis, & animi deliquia, odores interim frigidi & febris.

HIS phlebotomia exiguo detractò sanguinis conuenire potest: multo magis, si febris adest, aut inflammatio orta in intestino. Sed aliquando hic & in alijs generibus urina ita suppressitur, ut inde periculum immineat. Quam in re è malleolo vena secanda est. Læduntur hi omnibus acris & calidis, egentq; temperatis, deinde etiam frigidis.

Curatio

Venezæ
sectio.

PURGATIO conuenit non molesta, nec æternuatim facta, sed interuallis ex 3 s. pulueris hieræ picræ, ʒ ij. ad summum, 3 j. rhabarbari, cassia, catholicum ad 3 x. (Rhabarbarum nunquam dandum ultra 3 j. aut ʒ iiij.) manna ad 3 ij. eaque dissolui oportet in aqua hordei, pusana vulgari, sero lactis, decocto passula-

Purgatio

DE COLICO A B I L E.

tum, prunorum, sebesten, violarum.

Clysteri.

Clysteres ex radice & folijs althææ, maluæ, violariæ, mucilagine seminis lini, althææ, psyllij, cydoniorum, adiecto interim capite papaueris cum vitellis oui, oleo violato, butyro recenti, adipe anseris, gallinæ, anatis, saccharo violaceo, aut melle. Atque interim suspicio est vlcerationis, tumq; plantago, rosæ, sumach & similia decocto clysterum miscenda sunt. Plurimum laudantur clysteres ex liquidiore hordeato, aut lacte amygdalarum dulciû ad quartaria v. in quibus dissolues butyri recentis ℥ iij. sacchari viol. ℥ j. Qui clysteres, quia lenes sunt, si diutius retinentur, mel violaceum loco sacchari, aut etiam commune miscendum erit.

E A dem quoque alimenta sint, panis ex austero vino, aquæ frigidæ potus.

Inunctio ex oleo violaceo, butyro recenti, oleo chamæmelino, atq; etiam anethino. Sacculi & fomenta ex proximè dicta materia: Balnea aquæ dulcis.

Narcotica.

N A R cotica in hoc genere ferè necessaria: Verum Arabes corrigunt non castoreo, pipere & similibus, sed croco & stercore lupi. Quæ si medicamentis miscenda sunt, miscebuntur vt prius hieræ, rhabarbaro, cassiæ & catholico. Cætera quoque eadem ratione.

Sunt

SVNT & alia genera colici doloris, vt ab a- Colicæ ge-
postemate, vermibus, intestini descensu, in- nera plura.
durata fæce, de quibus alio loco.

DE ALVI FLUXIONIBVS, ET
PRIMO DE FLUXU CE-
rebrali Cap. XLI.

FLuxiones alui partim vitio ventriculi & Fluxionum
intestinatorum, partim vitio materiæ exci- alui causa.
tari solent. Ea verò materia vel in ventre est
concepta, vel aliunde translata, vel à cerebro,
in fluxu cerebali.

H VIVS modi fluxus euenire solet otiosis, Fluxus cere-
intemperatis, ijs qui somno nimium indul- rebralis.
gent, quique humidiores sunt cerebro, modo
iuncta frigiditate, aliquando & caliditate: hu-
mida aeris constitutione, austrina, & maxime
cum sequuntur aquilones, qui per austros, &
cælum pluuium collectam materiam, expri-
munt in ventrem. Commouetur fluxio ex per-
fectis & periodica est.

Ex ratione materiæ cura instituenda est. Curatio.
Nam aliquando pituita dulcis est, aut expers
qualitatis: aliquando falsa, acris & mordax,
quæ distinguenda sunt & curanda ex ijs, quæ
capite de catarrho scripta sunt. Nam sistendus
est catarrhus, roborandum caput & ventricu-

DE LIENTERIA.

lus. Roborabitur ventriculus ea ratione, quæ præscripta est capite de Debilitate stomachi. Influit aliquando ab hepate, liene atque etiam vniuerso corpore, de quibus postea.

DE LIENTERIA.

Caput XLII.

Lienteriz
causæ.

A Lui fluxus ; qui lienteria appellatur ; multas causas habet : Infirmi-
tatem con-
tentricis non solum ventriculi , sed etiam pri-
morum intestinorum , è quibus fit alimenti di-
stributio. Infirmi-
tas ex intemperie nascitur :
Intemperies aliàs simplex & sine materia , ali-
quando verò cum materia , quæ vt plurimum
acida pituita est. Fit lienteria & ab acri humo-
re , aut re aliâ eiusmodi , vim expultricem irri-
tante , vt abijciat cibum , priusquam confectus
sit. Res autem eiusmodi vlcera sunt saniosa ;
quæ ab alimento vellicantur. Quibus aliquan-
do occasio est pharmaci portiuncula retenta
in rugis & asperitate ventriculi : quod ab aga-
rico , colocynthide , metallicis , & rebus qui-
busdam venenatis , vel non satis comminutis ,
vel maligna qualitate inferri solet. Duo hæc
genera causarum Galenus adnotauit 12. A-
phor. lib. 4. & 32. lib. 3. & alijs quoque locis.
Magna pars Græcorum , quique Arabes se-
quuntur , ventriculum putant viscida interim
pituita

pituita illini, aque ita rubricari, vt inde destruetur asperitate & rugis ventriculi læuor quidam sit & via lubrica, vnde celeriter cibus defluat, nec possit contineri. Ex qua ratione lenteria nomen factum est, quod non ita approbat Cialenus.

Est & alia lenteria causa, post dysenterias & vlcera intestinorum; cicatrices fiunt, quæ si obducantur osculis vasorum, per quæ à tenui intestino ad portas hepatis inuehitur chylus, defluit alimentum aliqua quidem ex parte, sed non omnino confectum.

Lienteria post intestinorum ulcera.

EST autem in genere Lienteria coctio- nis priuatio, cum celeriter alimēta excernuntur; neque consistentia, neque colore, neque odore, neque alia qualitate immutata: sed sub albida, maximè aquosa & liquida, nulla commixta bile, aut sanguine. Alimenti nomine non solus cibus, sed & potus audiendus est. In ea, quæ ab acri humore, doloris sensus est, qui si perseuerat, dysenteria fit. In imbecillitate nullus doloris sensus, & melius eunte morbo, acidi ructus commouentur.

Lienteria quid.

CVRATIO tota in duobus est. Materia vitiosa vacuanda: deinde roborandus est ventriculus. Itaq; si materia acris est, infarcta tunicis ventriculi, & intestinorum, purgatione ex hiera & rhabarbaro vtendum est. Dissoluantur

Lienteria curatio.

Si ab acri humore.

DE LIENTERIA.

itaque ꝓ ij. aut iij. hieræ, aut ꝓ j. eius pulueris in sero caprino, decocto cicerum rubrorum vel absinthij. Et quia puluis amarior est, adi-
ciatur purgationi ex eo puluere, ꝓ j. oxysac-
charæ simplicis, aut ꝓ vj. syrupi de absinthio,
rhabarbari ꝓ j. aut ꝓ iiij. infusi in aqua absin-
thij aut liquoribus supra dictis. Veteres dissol-
uebant in mulsæ, cui & vis est detergendi, & le-
niendæ amaritudinis pharmacorum.

In crassiore bile & contumacius hærente,
veteres addebant ꝓ j. scammonieæ. Nunc ve-
rò satis fuerit, si gra. iiij. diagridij misceantur.

Ventriculi
corrobo-
ratio.

V A C V A ta cacochymia, astringentibus
vtendum est, sed modicè, multo etiam minus,
si quæ febris suspicio est. Probatum remedium
antiquis ex tribus partibus succi granatorum
acidorum, & vna succi mentæ simul coctis, de
inde adiecto melle, vt fieret eclegma. Nostro
more vteremur ꝓ j. oxysaccharæ simplicis, ꝓ
iij. syrupi de menta vt per interualla, duobus
aut tribus cochlearibus vteretur, aut vt esset
liquidius medicamentum ꝓ j. iulep ros. ad-
miseretur.

Eclegma.

Probatum & aliud remedium ex cydonijs
& malis granatis, vt esset vtriusq; æqualis mo-
dus, tum coquerentur ad putrilaginem, atque
expresso succo tantû mellis misceretur, quan-
tû satis esset ad eclegma. Nostro more licebit

vri

vti syrupo de cydonijs, & oxyfacchara simplici, viroq; ad 3 vj. cum 3 j. iulep. ros.

B X T B rius cataplasmata, quæ in debilita ^{Topica} te stomachi à calore dicta sunt. Iis remedijs ce leriter curari scripsit Galenus.

I N pituita eadem in genere conueniunt, ^{Curatio eius quæ à pituita.} quæ si crassa est, oxymelite & similibus primū incidenda: tum ex hiera repurganda. Si verò tantum conspersa tunicis ventriculi, solis sic cantibus & calefacientibus opus est: vt confectiōibus è succo cydoniorum cum aromati bus, quas prius è Græcis & Arabibus descripsimus.

V I N O forti, antiquo, styptico, sed modi- ^{Potus} ca quantitate. Modus enim potus est, ne flui tet in ventriculo. Quod si cōsuetudo est, dilua tur vinum aqua ferrata, in qua, vel cinnamo mum, vel mastix, aut vtrumq; coxerit.

Masticis grana ij. vel iij. per interualla de uorantur, mirobalani chebuli conditi, zinzi ber conditum, & alia in debilitate stomachi à frigore enumerata. Similiter & quæ exterius explicatur. Laudatur vomitus à cœna, & quia cibos non continent, fixa ingēti cucurbitula, eo modo, quo cap. de cholera diximus, vt con tineatur cibus procurandum est. Quod si ijs remedijs nihil proficimus, dropace, atque si napismo vtendum est.

DE DYSENTERIA.

DE DYSENTERIA.

Caput XLIII.

Cause.

HYeme aquilonia, vere australi & pluuio
so, calida æstate, æstatis fine & autumnno,
dysenteria fiunt, otiosis, intemperatis, & qui-
busdam naturis peculiariter, vt lentiginosis.
Nam antecedentibus anni partibus pituita
crassa & viscida in intestinis colligitur. Quod
si bilis non pro ratione è cysti fellis in intesti-
num defluit, nec iam pituitam pro consuetu-
dine deterget, multo copiosior pituita in inte-
stino, & bilis toto corpore asseruatur, accedit-
que cruditas. Hæc omnia æstiuo calore pu-
trefcunt, primumque pituita illa acris euadit,
intestinum vellicat, fit deijciendi appetentia,
inanis aliquando, at interim pauca, vel cum
maximo conatu mucosa & similia albumini-
bus ouorum egeruntur. Fit etiam aliquando,
vt acrimonia eius humoris clausulæ venarum
intestini referentur, & ita aliquid sanguinis
vnà cum mucosis excrementis deijcitur. Hoc
malum nō dysenteriā, sed teneşmon appellari
volunt. Tum dysenteria est, cum bilis illa pu-
tris, magno impetu in intestinum confluit, &
grauius exulcerat. Radit primum pingua,
quæ intestino adnata sunt, deinde ramenta,
postremo etiam sanies effluit. Excrementa il-
la ferè spumosa, quia in dysenteria, & febris &
inflame

Dysenteria

inflammatio est. Itaque & motu & calore spuma excitatur. Omnis dysenteria exulceratio intestini est; aliquâdo totius quidem, aliquando huius vel illius. Quod ad curationem, distinguere oportet ex cap. 43. lib. 9. Aetij.

CYRATIO est in phlebotomia, purgatione, Curatio:
clysteribus, potionibus & externis remedijs.

BENE carnosio corpore, graui febre, atq; Phlebotomia,
inflammatione, suppressa aliqua solenni vacuatione, sanguine multo cum excrementis abeunte, consentiente ætate & viribus, vena secari potest, etiamsi Galenus in commentarijs ad Glauconem, & libro de ratione victus in acutis morbis, repugnare videatur. Verum quia assidua egestione, perpetua vigilia, febre atq; inflammatione, vires maximè laborant, temperandum vacuandi consilium est. Itaque alij humeralem, alij venas extremæ manus aperiri volunt, quia hinc minus virium cum sanguine effunditur. Potest & basilica aperiri, sed angusto foramine, & paulatim reuulsa atque etiam euacuata materia. In suppressis purgationibus inferioribus, venas malleoli aperiri iubent: Quod si fit, eò magis temperanda vacuatio est, quo hinc ductus sanguis plus virium quàm è manu exhaurit.

Locus Galeno aduersarius.

EADEM quoq; controuersia de purgatione. Sed iam indubitatum est, vbi & morbi ma

Purgatio.

DE DYSENTERIA.

gnitudo, & cætera non repugnant. Nullum autem præstantius pharmacum rhabarbaro, à quo purgatio non semel conuenit, sed si res exigit, & vires permittunt, sæpius repetenda est. In purgatione consilium esse debet, vt obstructions liberentur, & via facta, redundans materia vacuetur. Nec de astrictione initio cogitandum est. Itaque ℞ iij. plus minúsue rhabarbari imperantur. Infundantur in aqua endiuizæ aut re simili, quæ vim habet liberandæ obstructionis. Aliquando ꝓ vj. syrupi rosati de siccis, non tam astringendo quàm roborando commiscentur. Nonnunquam etiam aromata, cornu ceruinum, cornu vnicornis admiscenda putant: multo magis, vbi popularis dysenteria est, & suspicio virulentæ materiæ. Cornu ceruinum crematum prius, deinde elotum, dysenterias sanare scribit Galenus. Nec alia vis est vnicornis, nisi quòd arbitrantur, valere contra venena omnia. Itaque potioni è rhabarbaro, gr. iij. vnicornis, aut plura, aut cornu cerui ad ℞ j. misceri possunt. Practici plurimum vtuntur mirabolanis. Dioscorides manifesta quidem ratione agarici ꝓ j. imperat, vbi mucosa & pituitosa deijciuntur, neque à ratione alienum est, vbi nō ita biliosa sunt excrementa, & obstructions multæ sunt, descenduntque muculen-
ta. Ex-

12. Expressioni ꝓ j. rhabbarbari infusi in aqua endiuia, aut cichorij, adijcere expressiōem agarici trochiscati pondere ꝓ j. infusi in melle rosato colato. Practici loco agarici expressiōe ꝓ ij. aut iij. cartami in sero lactis infusi, aut melle rosato, vtendum putant, nonnunquam polypodio. Sed præ cæteris rhabbarbari vsus probandus est, procedente morbo, infusioni drachmæ vnius rhabbarbari, ꝓ j. eiusdem in puluerem redacti, admiscere licet. Postremo etiam torrefaciunt cum iam astringendi consilium nascitur.

QVOD ad clysteres & cætera remedia at-
tinet, videndū est ne initio astringentibus uta-
mur. Astringentia febrem augent, & inflāma-
tionem, vitiosam materiā prohibēt ne effluat,
eaq̃ue prohibita, regurgitat in partes superio-
res. Hinc grauior febris incenditur, epilepsiæ
fiunt & conuulsiones, aliaq̃ue eiusmodi mala
enascuntur. Adde quod astringentia intestino-
rum vlcera exasperant. Sed astringentium
tempestiuus vsus est iam euacuata in totum
vel magna ex parte vitiosa materia, quoq; tem-
pore iam excernitur, cū vitioso frugi succus,
& inde virium casus metuitur. In astringenti-
bus, quæ leuius id præstant meliora sunt, dein-
de ad fortiora progredi licet, videndumq; est,
vt astringentibus partim leniētia misceamus,

Astringētia

DE DYSENTERIA.

Diuretica.
Hepatis cu
ra & stoma
chi.

partim etiam si per os sumuntur, ea quæ vrinâs ducant. Sic enim fit, vt nullo periculo materia prohibita ad vrinâs diuertat, ne refluat in partes nobiles & superiores.

QUO tempore confirmandum hepar est, ne tam facilè humores recipiat. Quod efficiūt cerati santalini ℥ iij. malaxatæ cum oleo rosato, extensæ in aluta, vt fiat scutum ad modum crescentis pro hepate. Cætera quoq; quæ cap. de debilitate hepatis à calida causa dicta sunt. Eadem ratio stomachi & ventriculi habenda est ex ijs quæ proprijs cap. descripta sunt.

Clysteres.

CLYSTERES primum leniant, deinde detergeant & abluant, postea etiam carnem regenerent & consolident. In quibus si oleum dissoluitur, dulce sit, nō salsum: aut si salsum est, prius abluatur, vt falsuginē deponat, & omnē aliam qualitatem. Clysteribus lenientibus optimum est admiscere, quod intestinū roboret. In detergētibus & reliquis, intestinorū sensus & nuditas prius cognoscenda est. Alia enim intestina vegetiore sensu sunt, nec ita inducta pituita, non ita carnosa, quibus conueniunt clementiores clysteres. Clysteres lenientes.

Clyster leniens.

Rosarum M j. fiat decoctio in lacte recens emulso ad ℥℥ j. s. colatura infundatur tepida, diu retineatur, dolorem mitigabis, temperabis ardorem, vlcera ablues & detergebis,
illines

illines intestinum, solidabis, corroborabis intestinum, vim acrium humorum obtundes. Galenus, Oribasius, Aetius solo lacte recens emulcto vfi sunt. Alius.

Oleum rosarum ad ℥℥ j. leuiter calidū pluribus horis retentum dolorem & inflammationem mitigabit. Poteris addere ℥℥. s. olei rosati, decoctionem maluæ & sœnugræci, seminis lini, althææ, cydoniorum aut horum mucilagines pari mēsurā commiscere. Alij ℥℥. j. olei amygdalarum dulciū, mucilaginis, seminis cydoniorum extractæ in lacte ℥ iiiij. adiiciunt.

Conuenit lac amygd. vel oryzogala, hordeatum, auenatum, liquidiora ad ℥℥. j. infusum cum butyri recentis ℥ iiiij. aut pari pondere adipis anatis, anseris, gallinæ pinguedinis hirci, caprarum. Iis enim tutius vtemur, si quæ olei qualitas suspecta est. Amygdala & oryzogala leniunt magis & contemperant. Hordeatum etiam refrigerat: Auenatum siccat, conuenitque magis in tenuibus fluxionibus. Rasis non habere parem scribit in dolore ab acrimonia olei rosarum ℥℥. j. s. mucilaginis seminis psyllij ℥ iiiij. Laudatur & hic clyster.

Medicamentorum delictus.

℞ seminis lini althææ, psyllij conquassatorum ana ℥ s. seminis cydoniorum, oryzæ & tritici in tegula tostorum ana p. j. fiat decoctio in lacte ad ℥℥. j. s. in colatura fortiter ex-

Clyster

DE DYSENTERIA.

pressa, dissolue seui hirci aut pinguedinis rasæ ex abdomine arietis ꝯ ij. butyri recentis ꝯ j. sacchari viol. ꝯ j. s. ouorum vitella duo. Vitella miscemus leniendo & vt diutius inhæreat intestino quod infusum est: Similiter & seuum & quicquid pingue est: Saccharum, & mel detergendo. Utuntur albissimo saccharo vt lenissimo: grosso vero & rubro appellato vt magis detergente: hoc etiam magis melle rosato & communi. Celsus hoc clystere dolorem mitigat, appetentiam excitat.

**Clyster
Celsi.**

Et decocti foliorum rosarum quartaria v. vitella ouorum duo.

**Ad tormi-
na & flatus**

IN dysenteria ferè tormina sunt, & flatus. Quæ in re sumitatur anethi & chamæmeli, florum anthos & meliloti aliquid miscendum est.

**Ad sangui-
nis excre-
tionem.**

Contra sanguinis excretiones tapso barbato, plantagine, bursa pastoris, centinodia, fragaria admiscetur.

Clysteres.

Clysteres detergentes aqua hordei, serum lactis cum melle aut saccharo rosato, similiter hydromel, decoctum cicerum rubrorum, parietariæ, furfurum, vinum rubrum, decoctum betæ, centaurij, radices cucumeris agrestis, ficus pingues, absinthij, lupinorum, horum vnius quartaria v. aut ꝯb.j. in quibus dissolueda ꝯ j. mellis rosarum aut sacchari, aliquando ꝯ s. therebinthinæ liquidæ cum ꝯ ij. salis cõmunis,

nis, aut, vt & detergeas & lenias detergentia coquantur in lacte. Fuerit quoque vtile rosas, plantaginem & similia astringentia admiscere vt roboret: vt materia contumax est quæ inhæret intestino, plus minúsue detergebis.

Fortiores sunt clysteres ex vrina, lixiuio, muria, salisugine, aqua salsarum oliuarû. Fortioribus vteris, vbi leuioribus nihil effectum est. Detergētibus dolor interim exasperatur. Itaque reddito clystere detergente, lac recens mulctum inijcies, aut clysterem qui leniat.

In carnosissimis intestinis regeneranda caro: in membranosis, consolidandum est. Carnem regenerabis clystere, qui primum abluat, deinde impleat carne. Ablues ex sero lactis & saccharo, ex vino calido austeriusculo, mulla & similibus, deinde cōmiscebis ʒ ij. pulueris gentianæ, thuris, enulæ, tetrapharmaci ʒ j. vel eo plus, aut liquori commiscebis mellis, terebinthinæ & butyri ana ʒ vj. Optimumque fuerit hos clysteres diutius retineri, crassiores fieri additis ouorum vitellis.

Carnem regenerantes clysteres.

Consolidant & cicatricem ducunt decoctiones astringentium in quibus terræ sigillatæ boli armeni, sanguinis draconis, thuris, aut similibus ʒ ij, vel eo plus misceantur.

Cōsolidantes clysteres.

Sunt aut astringentia alia calida, alia frigida. Calida, nardi spica, absinthium, cinnamo-

Astringentia calida.

DE DYSENTERIA.

mum, caryophylli, calamus aromaticus, lignum aloes, gallia, thus, mastix, manna, aloen, myrrha, viscum, iris, gentiana, aristolochia, enula, styrax, propolis, salvia, artemisia, thymum, origanum, rosmarinum, pæonia, anisum, ammi, cuminum, nasturtium, coagulum hœdi & leporis, casus inueteratus in aqua coctus, siccatus & in puluerem redactus.

**Astringen-
tia frigida**

Frigida verò hyoscyamus, portulaca, lentiscula palustris, psylliū, semperuiuū, cichoriū, polygonū, lactuca, umbilicus veneris, oxalis, violaria, cucurbita, atriplex, solanum. Sed hæc nō ita astringunt, quia humidiora sunt: quæ sequuntur magis. Vitis capreoli, arnoglossum, rubus, myrtus, balauſtia, malicorium, rosa sicca, corna, sorba, pruna syluestria, pyra, mespila, galla, rhus, berberis, acacia, hypocistis, terra sigillata, hæmatites, bolus armenia, sanguis draconis, salix, coriandrum in aceto maceratum, carabe, camphora, corallia, margaritæ, cornu cerui, santali, spongia ex aceto expressa, imbuta picæ, deinde cremata. Interior tunica ventriculi gallinarū, erinaceorum, papauer, hyoscyamus, opium.

**Clyſteres
ad serpen-
tia intestino
rū ulcera,**

ALIVD est genus clysterum in putridis ac serpentibus vlceribus intestinorum, in quibus caustica dissolutur. Fiunt pastilli caustici ex arsenico, calce viua, auripigmento rubro mixta

mixta acacia & ijs quæ astringunt. Coguntur ex succo plantaginis, ex vino coctæ, fiuntque pondere ℥ j. ij. aut iij. Dissoluuntur aut in ℥ j. vini diluti, in lacte & alijs decoctis lenientibus. Sunt qui addât singulis drachmis eorum pastillorum, singula grana opij. Antequam infundantur, buccella panis ex aqua frigida, lacte aut diluto vino exhibenda est. Stomachus myrtino oleo aut simili roborandus est, præterea muniendum caput ne ardore clysteris offendatur. Quod si infuso, stomachus exurit, detur frigida ad ℥ iiij. & lactucæ cauliculi ex aceto. Retineri oportet quod infusum est ad horam quod minimum: ad duas, quod plurimum.

Si verò nō retinent, sed statim eijciunt clysteres, muria prius, aqua marina, lixiuium, vri na cum sale iniijcienda sunt. Anus ex decocto astringentium foueatur, vel sacculo è milio & sale expresso in vino nigro adstringente. Post hos clysteres lac recens emulctum iniijciendum est.

CLYsterum vsus, vbi exulceratio in inferioribus intestinis. Si verò in superioribus, potiones conueniunt magis, quanquàm perpetuo vtrisque remedijs vti licet, & potionibus quidem, eo ordine, qui in clysteribus præscriptus est, exceptis causticis.

Cura dysentericæ superiorum intestinorum.

DE DYSENTERIA.

Potiones
astringētes

Ad astringendum conueniunt potiones, omphacomeli veterum, nūnc syrupus de agresta, de myrtillis, de ribes, succus cornorū, mespilorum, cotoneorum, sorborum, prunorum syluestrium. Coquantur succi & aliquid sacchari rosati misceatur. Aqua decoctionis sumach, masticis, & rerum astringentium, alumen tritum ꝓ j. pondere ex ouo, similiter symphyti radix, pumex tenuissimè tritus cum vino austero: saluæ decoctum, lac vstulatum cum ꝓ j. stercoreis canini, aut in quo radices quinque folij, consolidæ maioris & similia coxerint, vel in quo calculi vel fluuiatiles vel marini igniti, prius extincti sint.

Coagulum leporis vel hædi ꝓ j. pondere è vino veteri abluitur, datur cum aqua decoctionis sumach, masticis, succo plantaginis depurato.

Puluis è
turture.

Puluis factus è turture farcta cum bolo armena, sanguine draconis & mumia, conclusa vase testaceo bene lutato, & ita cremata, datur ꝓ ij. ex lacte ouillo cocto. Conueniunt cydoniatum, conserua rosarum, cornorum, symphyti, & similes. In aquæ rosarum ꝓ b. j. bulliant masticis, sumach, caryophyllorum ana ꝓ j, s. fiat decoctio ad ꝓ viij. pro tribus dosibus.

Ouum ex aceto frigitur, deinde conspergitur puluere astringente, ossa femoris bouilli trita,

trita, alumen in succo plantaginis dissoluitur, in eo linteolum immergitur, siccatur, vritur, fit pulvis conueniens. Succus quoque expressus è stercore asinino.

EST aliquando cum multum sanguinem fundunt: ijs frigida cibaria conueniunt, vt alijs dysentericis tepida ac calida. Clysteres itaque vt prius. Hæc vero potio.

Si sanguis copiosè deiecitur.

R̄ macis, balaustiorum ana ʒ j. dato ʒ j. aut ʒ iiij. ex vino astringente, alijsq; remedijs, vtere quæ sanguinem sistunt, capite de Sputo sanguinis.

Potio.

Sudor excitatus plurimū prodest viribus valētibus, balneo aut suffumigio ex rebus sudores mouentib. Later calefactus & vino albo cōspersus, inuolutus pānis, adhibetur plātis.

Sudor.

NAR cotica conueniunt nondum deiectis viribus, syrupus de papauere, aqua rosarū tepida, in qua coxerint semina papaueris albi. Suppositoria vt prius. In clysteribus dissoluatur ʒ j. trochiscorum de carabe, aut philonij perfici. Quibus si nihil proficimus, dabimus ʒ j. aut ʒ s. ex decoctione mastice. Philonium proximè descriptum (cap. de cholera) & alia iam multis locis descripta.

Narcotica.

Inungendus est venter, primū quidem ijs quæ leniunt, deinde quæ astringūt, vt oleo de cydonijs, de spica aut cydoniorū carnes in ace

Ventris inunctio.

DE TENESMO.

Emplastrū. to coquendæ sunt detractis interioribus, dein de malaxatis, adde trochiscorum de carabe 3 j. masticis 3 s. fiat emplastrum, quod fumigetur cum ligno aloes. Consulendum viribus ex ijs quæ dicta sunt in sputo sanguinis.

Vitæ ratio.

RATIO vitæ instituenda pro rei necessitate. Leniendum enim, detergendum & astringendum.

DE TENESMO.

Caput. XLIII.

T*enesmus* irritatio est ultimæ partis intestini, hoc est recti, in quo sæpius libet sine causa defurgere. Excernuntur omnino pauca, mucosa, idq; maximo conatu, insidentq; stercori guttæ sanguinis. Hic si præter mucosa, stercora excernuntur, ea cocta ferè sunt.

Causa.

NASCITUR hæc affectio magna ex parte in pituitosis. Aceruatur enim pituita in recto intestino crassa & viscida, putrescit tempore, acrimoniâ contrahit, irritat intestinum. Hinc deiiciendi libido. Sed quia cōtumacius inhæret pituita, non nisi magno conatu excerni potest. Hoc tenesmi genus dysenteriâ ferè præcedit. Aliud verò genus hæc sequitur. A dysenteria relinquuntur vlcera, in quibus acris sanies intestinū vellicat, ex quo fit tenesmus, in alijs desidendi cupiditas. Post pharmaca, si quid intestino hæsit, vt malè infriata colocynthide, agari-

Tenesmi genera.

de, agarico aut similibus, eadem affectio nascitur. Ulceribus quoq; in ea parte sponte sua natis, idem accidit. Abscessus in recto intestino natus eandem appetentiam nonnunquam inuehit. Initio de causa cognoscendum est.

QVOD si præcessit frigus, & pituita crassa in causa est, rutam, hyssopum, origanum, calamentum, rosmarinum, maioranam, lauri folia, stœchas, anethum, melilotum, chamæmelum vino incoques: hinc fouebis sedem, materiam calidam emplastri modo toto perinæo induces. Iuuant fofus ex oleo rutaceo, chamæmelino, anethino, sesamino. In vehementi frigore, oleo in quo decima pars castorei aut bituminis dissoluta sit. In dolore, anethino & lili-
no vteris. Eiusmodi oleis fouere & vngere oportet perinæum & imum ventrem: ijsq; calidis, deinde cōtegendæ partes duplici aut triplici linteo calefacto.

Curatio si
à frigore &
pituita.

Laterem veterem denigratum fumo, cōfringes & comminues, aceto feruenti immerges, inuolues linteo & calidum sedi toti q; perinæo applicabis. Molli filtro aut cōtone vel spongia molliore sæpius immerges vino calido, in quo ruta, fœniculum, & quædam ex supradicta materia coxerint, deinde expressa, sed calida sedi ac perinæo admouebis. Post fotum linteis calentibus muniendæ partes, omnino

DE TENESMO.

que videndum est, ne refrigescant.

Suffumigia LAV dantur & hac in re suffumigia ex resina pini iniecta carbonibus, nuce pinea bene resinosa, aliquando additis seminibus rutæ, cumini, anisi, fœniculi, vel hoc modo.

℞ picis siccæ ℥ j. bituminis ℥ s. liquentur in aceto. liquatis insperge sulphuris in pulverem redacti ℥ s.

Clysteres ad quartaria duo vel tria ex his comparantur quæ calefaciunt, incidunt, detergent, leniunt, quales proximè descripti sunt.

Glandes. Similiter & glandes ex ladano, styrace, oleo rutaceo, adiectis seminibus fœniculi, rutæ anisi, cumini & similibus.

Si dolor vrget vehementius, narcoticis vtendum erit, vt prius.

In dolore uehementi. Sacculi fouendæ sedi, & perinæo ex milio, furfuribus, sale, ruta, & descripta materia, frixis in sartagine, deinde sacco inclusis.

Venæ sectio. QUO D si inflammatio est, & cætera consentiant, vena brachij interna secanda est.

Purgatio. Probatum quoque Arabibus purgatio leuis è cassia aut manna, suspecta Græcis. Vrina & sudor prouocari possunt ad diuersionem.

VIctus refrigerans, clysteres lenientes ex lacte, hordeato, oleo rosarum tepidis, & alijs vt prius. Infusiones (balnea vsque ad umbilicum) in decoctione maluæ, bismaluæ, seminis lini,

lini, violariæ, adiecta portiuncula florum chamæmeli & meliloti.

Olea vngendo conueniunt, rosaceum, violatum, nenupharinum, in quo folia salicis coxerint, deinde & axungia, butyrum recens, ex quibus & vnguenta fiunt, quale hoc est.

Rz olei rosarum ʒj. olei salicis & violarum ana ʒ ss. mucilaginis quatuor, seminis frigidorum ʒ vj. ceræ modicum, fiat vnguentum. Molli corone in aceto albo feruente partes fouendæ sunt.

VL cera si qua sunt, abluenda primum sero lactis, vino austero, mulsa, etiam lixiuio si sanies contumacior est, aut vino austeriusculo tepido & sexta parte mellis rosarum. Quibus postea adijciatur aliquid rosarum, thuris, masticis, gummi Arab. tragacantha & similia, aut fiant hæc vnguenta.

Rz cerusæ plumbi ʒj. mucilaginis gummi Arabici extractæ in aqua rosarum ʒ ss. corticis thuris ʒj. olei rosati quantum satis est ad impinguendum. Aliud.

Rz mucilaginis gummi tragacanthi & Arabici, mucilaginis sem. psyllij ana ʒ ss. aloes lotæ ʒ ij. olei rosarum quantum sufficit, cum modico ceræ, fiat vnguentum. Hæc inunguntur vlceribus, si quidem apparent: alioqui commiscentur ijs clysteribus, qui ad consolidan-

DE FLVXV HEPAT.

dum descripti sunt capite de Dysenteria.

Lactis capri-
ni potus

Potus lactis caprii, primum quidem ad ℥ss. j. quæ paulatim bibatur, non acervatim, post tri die vero ℥ss. s. remedio est tenesmo. Oportet primo die recens mulctum bibere, post tri die decoctum ad dimidias & despumatum. Decoctum betonicæ in vino albo tenui laudatur ab antiquis.

DE FLVXV HEPATICO.

Cap. XLV.

HE pate calidiore excrementa durissima & similia caprarum, unde **ἡπατὶς* (forte *ἡπατὶς*) à Græcis, nisi sit iuncta imbecillitas. Hic enim biliosa, liquidiora & ut augetur calor, insigniter flava, crassiora, graviter olentia, eruginosa, nigricantia, assatis humoribus & postremo colliquata hepatis substantia.

Signa.

HIC sitis, ardor, deiecta appetentia, assidua corporis iactatio, difficilis curatio. In infirmitate attractricis hepatis, chylosa. In infirmitate alteratricis, primum quidem loturæ carniū similia & sanguini diluto aqua, deinde varia qualitate & consistentia, interim quasi limus sanguinis & grumus, integra ferè appetentia, sitis nulla, frigoris sensus, foetor exiguus. Hepatici fluxus nocte excitantur magis, longioribus intervallis.

HO.

HOrum curatio ex capite de debilitate hepatis petenda est. In summa vtendum est refrigerantibus, si infirmitas à calido est: Calefacientibus, si à frigido. In vtrisque, vitanda sunt, quæ obstruunt. In calida.

R̄ electuarij ditriasantali ꝓ ij. coriandri præparati ꝓ j. seminis acetosæ & portulacæ ana ꝓ j. coralli rubri ꝓ s. sacchari rosarum ꝓ vj. misce, vtatur in iusculis, in hordeatis, in potu.

Calidæ intemperiei curatio.

Syrupi conueniunt rosarum, de ribes, myrtinus, cýdoniorum, vel iulep cum multa aqua ferrata, spodium, seminis portulacæ, acetosæ, coralli rubri, flos rosæ & semen, arilli, lacca, cichorium, endiuiæ, sonchus, coriandrum præparatum, acetositas citri, ptisana & similia conueniunt.

Syrupi.

Cerotum santalinum subactum è rosaceo, cerotum ex oleo rosarum, deinde subactum cum succo cichorij, endiuiæ, sonchi, plantaginis, & tantillo succi absinthij, vel eupatorij. Cerotis inspergi possunt pulueres ex proximè scripta materia.

Cerota.

IN frigida, vnde lotura carniū, electuarium de vino prius descriptum, mel pulsatum hoc modo præparatum.

Frigidæ intemperiei curatio.

R̄ passularum bene pinguium M. ij. fiat decoctio in ℥. j. s. vini optimi austeriusculi, coquantur dum crassescat, vinum deinde passu-

Mellis: assularū præparatio.

DE FLUXU HEPAT.

**Pulvis opel-
eus.**

læ in supradictum vinum fortiter exprimantur per colatorium satis crassum : expressio cū vino rursus coquatur ad crassitudinem. Cui adde aromatici rosati ꝓ j. seminis nasturtij & securidacæ assati & infriati, cinnamomi electi ana ꝓ s. misce, vtatur sæpe. Hunc eundem pulverem seorsim asseruabis, insperges ꝓ j. lactis vstulati ꝓ iij. cum vitello oui, fiat pulcicula. Posterit inspergi & lacte amygdalarū bene cocto.

Lac ouillū.

In hoc fluxu lac ouillum coctum & vstulatum conuenit, sed inspergere oportet aliquid supra dicti pulueris, vel hunc:

Rz corticis thuris ꝓ ij. caryophyllorum, cinnamomi ana ꝓ s. oryzogala, pulli gallinarum & columbarum, perdices, auiculæ assatæ, vinum tenue, odoriferum, subastringens.

**Inunctio
hepatis.**

INungatur hepar cum oleo masticino, de spica, de absinthino & alijs, deinde superaspergatur pulvis masticeis ꝓ j. styracis calamitę grana xvj. thuris albi & nigri ana grana vj.

Fomentū.

Fotus ē spongia expressa in vino decoctionis masticeis, thuris, styracis calamitæ, rosarum, absinthij, foliorum cupressi, eupatorij, asari. Si superueniat febricula (quod sæpe fit) proximè dicta remedia calefacientia temperanda, prius dictis refrigerantibus.

DE FLVXV PESTILEN-
tiali. Cap. XLVI.

G Aleno olida insigniter, fulua & crassa ex
cernuntur, alijs subalbida autumno fe-
rè, huiusmodi facies, grauiatur corpus, pulsus con-
cidit, quarto, vel 7. vel 9. moriuntur, aut ægre
reualescunt. Alij tota cute commutantur, alijs
decidunt vngues.

Signa fluxus pesti-
lentialis.

FLV xus hic periculosè astringitur. Præter
remedia scripta in dysenteria, vtatur auro in
decocto pullorum, perdicum & similibus, sy-
rupo de ripis, de cydonijs, de myrtillis, de li-
monibus, acetositate citri, vino granatorum,
syrupo acetoso simplici cum iulep rosato. At-
que aliquando in aurora 3 s. bonæ theriacæ in
vino granatorum, acetositate citri aut re simi-
li dissolues.

Curatio.

I V scula alterantur cū multa acetosa & no-
dulo de berberis. Colatitijs inspergatur puluis

Victus.

R limaturæ auri 3 j. diamargaritonis re-
center facti 3 s. nucis moscatæ 3 s. margarita-
rum, smaragdorum, saphirorum ana 3 s. pa-
nis sacchari 3 s. fiat puluis. Interim quoque
vtatur puluere vnicornis & cornu ceruini.
Vino tenui vtatur odorifero, diluto aqua in
qua aurum extinctum sit. Vtatur interim hoc
electuario.

Puluis cor-
dialis.

DE MINGENDI DIFFIC.

Electuariū,

R^z conseruæ ros. ʒ j. s. conseruæ corticum citri conditi cum saccharo ʒ j. corticum citri ʒ j. s. margaritarum electarum ʒ j. hyacynthorum, smaragdorū ana ʒ s. serici crudi ʒ j. seminis citri mundati ʒ ij. s. acetosæ ʒ s. boli armeni, terræ sigillatæ ana ʒ ij. limaturæ auri ʒ j. cornu cerui & vnicornis, rasuræ eboris ana ʒ j. sacchari albiss. ʒ ix. folia auri nu. x. fiat conditum ad formam sacchari ros. cum aqua ros. moscata.

DE MINGENDI DIFFICVL tate Cap. XLVII.

VESICA interiorem membranam habet omni genere fibrarum, quas dum intendit, urinam continet; si solum transuersis agit, exprimit. Eius actio in totum naturalis. Eiusdē collo musculus est obliquus. Agit hic transuersis fibris, arbitrario quidem motu, ne vrina intempestiuè effluat. Itaq; cum plena est vesica, & quantitate & qualitate irritatur, transuersas fibras intendit, musculus cessat ab officio, atq; ita vrina emingitur. Nerui à lumbis & ossē sacro ad vesicam perueniunt.

*Causæ sup-
pressæ uri-
næ.*

R^e solutis neruis aliquando torpescit vesicæ sensus: aliquando musculus sphincter, qui collo vesicæ adnatus est resoluitur, atq; ita vrina intempestiuè effluit, aut si sensum perdidit vesica,

vesica, retinetur. Alijs nascitur inflammatio læsis vertebris vnde nervi oriuntur, quod & calore & dolore lotij intelligitur. Alijs rupta vena, sanguis emingitur. Grumus fit, qui meatus intercipit quæ vrina expurgatur. Idem meatus et lapillis & tuberculis, & inflammationibus, crasso pure, vel humore aliquando præcluditur, atque hinc vrina supprimitur.

VRINÆ verò suppressæ tria sunt genera *δυσουρία* vrinæ difficultas: *σπασμωγία* stillicidium aut substillum malum: *ιξουρία* cum omnino vrina supprimitur. Dysuria libidinem mingendi facit, sed ægrè & vi quadam, aliquando etiam cum dolore vrina excernitur: In Stranguria assidua mingendi cupiditas, sed vrina guttatim effluit. Ischuria improprie quidem fit, perdita renum actione attrahente. Si enim serum sanguis non attrahitur, vrina non fit: proprie verò meatu vrinario præcluso aut infirma excretrice vesicæ, quæ transuersis fibris exprimere non possit, idque propter intemperiem, vt siccitatem in ardentissimis febribus. Aliquando resolutis vesicæ nervis & musculo incolumi. Nam si musculus vnà resolutus est, vrina præter voluntatem effluit. Dysuriam & stranguriam faciunt retentricis imbecillitas, quæ ferè fit à frigido. Frigidum enim vesicæ corpus à frigido facilè offenditur. Altera causa est vri-

Dysuria.

Stranguria.

Ischuria.

DE DYSVRIA ET STRAN.

næ acrimonia. Adiunge cæteris inflammatio-
nem, grumos, calculos, &.

DE DYSVRIÆ ET STRANGV- RIÆ CVRATIONE.

Caput. XLVIII.

Curatio
difficulta-
tis urinæ à
frigore.

SI à frigore infirmitas, calorificis vtendum
est, vnctionibus perinei & pectinis, fomen-
tis, balneis, clysteribus, potionibus, alijsque
remedijs.

Olea.

V Ngendo olea conueniunt, rutaceum, a-
nethinum, chamæmelinum, balsaminum, de
scorpionibus, de cheiri, de lilio, de cucumere
asinino in quo decima pars castorij, sexta gal-
bani vel opopanacis coxerint. Ex eiusmodi o-
leis fiunt cerota. Cerotis consperguntur aro-
mata quæ calefaciant, & partium tenuitate fa-
cile penetrant.

Fomenta.

F O menta fiunt ex decocto maioranæ, ro-
rismarini, arthemisiæ, origani, calamenthi, t hy-
mi, hyssopi, parietariæ, silymbrij, berulæ, & cres-
sonum: ex quibus & balnea comparari debent:
alioqui has herbas friges in sartagine ex oleo
vel butyro, & emplastri modo femori superio-
ri, pectini & perinæo calida admovebis. Omen-
tum arietinū calidum iisdem locis admotum
iuuat, vel recens detracta pellis cuniculi: cuius
axungia in eundem vsum plurimum comen-
datur.

Cly-

DE DYSVRIA ET STRAN. 118

Clysteres & glandulę ex supra dictis herbis, oleis & materia adiecto sale & melle ad irritandum confici debent.

DE coctum radicis eryngij, cyperi, radicis lappæ, ameos, cinnamomi, nepethæ, myrrhæ, opopanax, cretæ marinæ, cartami, extremitatum caulis, & alia, quæ postea dicentur. Decocta.

Aquę conueniunt tribulorum, raphani, cretæ marinæ, penetaphylli, alliorum, acori, florum maluæ, cyperi, erythrodani, sabinæ, fabaceorum, scolopendrij, alkekengi. Grana alkekengi trita & expressa, succum reddunt vtilem cum vino albo tenui. Aquæ.

Succus granorum alkekengi.

CONueniunt à proprietate, viuerræ genitale, cinis scorpionum crematorum, testa oui repurgata è qua pullus exierit, aselli, vermes terreni, erinacei siccati, aut eiusdem testiculi puluis, vesica tauri & capræ.

Conuenit & theriacæ potus, vocatū lithon triptū, electuarium ducis, aurea Alexandrina, cucurbithulæ natibus adfixæ, pediculus inditus foramini virgę, aut cimex, vel loco horum fila croci, granulum salis, catheter, aut candela cerea oleo prius illita.

VB I verò vrina acrior, si quidem corpus bene carnosum est, si inflammationis suspicio, vena basilica secanda est. Purgandum cum ꝑx. cassiæ dissolutis in sero caprino vel liquore Curatio difficult. urinae cum caliditate.

DE DYSVRIA ET STRAN.

conuenienti, Vomitus, si quidem consuetudo est, plurimum predest, Clysteres de lacte, sudoris prouocatio. Galenus ex Hippocrate phlebotomiā è crure potius probasse visus est, quā è brachio, Arabes prius è brachio quā è crure, quod & aliquot locis Galeni non repugnat.

Olea.

Hic olea conueniunt, violatum, nenupharinum, de papauere, ex quibus cerota fiunt admixta modica quantitate camphoræ, vt gr. iij. ad singulas 3 ceroti.

Fotus & balnea.

Balnea & fotus in decocto seminis lini, fœnugræci, althææ, psyllij: nec peccaueris, si quid chamæmeli adieceris.

Aqua distillata ex acetosa, plantagine, lanceola, pentaphyllo. Syrupus de iuiubis, de papauere, decoctum liquiritiæ, portulacæ, lactucæ, quatuor se. communium, lac asinæ vel capræ, serum lactis, lac amygdalarum, hordeatū cum seminibus lini, melonū, cucumeris, quatuor se. communibus frigidis quale hoc est:

Lac amygdalarum.

R̄ seminis psyllij, melonum, cucumeris, ana 3 ij. se. althææ, cydoniorum ana 3 j. seminis lactucæ, hyoscyami albi, papaueris albi, ana 3. s. gummi tragacanthi 3 ij. fiat decoct. cum qua dissolue amygdala dulcia, fiat lac amygdalarū cum saccharo violaceo.

Curatio.
ulceris cū
difficultate
urinæ.

Quod si vlceris suspicio est, iam bolus armenia, terra sigil. sanguis draconis, puluis equiseti cum

ti cum lacte vstulato, syrupo myrtillorum, iulep ros. conueniunt: similiter saccharum ros. triasantali, tragacanthum frigidum, cydoniatū sine speciebus factum cum saccharo.

I N iijcitur in virgam lac recens emulctum, maximè muliebre, cui si calor maior est & dolor, addatur mucilago, se. papaueris, cucumeris, psyllij & similium, cum modico camphorę. Vbi verò consolidandum.

Iniectio.

R̄ lactis muliebris vel bubuli vstulati ꝑ iij. sarcocollę tritę, amyli, cerusę, ana ꝑ j. fiat iniectio ter aut quater in die. Laudatur hic puluis quo mane & vespere vtatur.

Consolidantia.

R̄ se. melonum excorticorum ꝑ ij. se. citrulli, cucurbitę, portulacę, papaueris albi, ana ꝑ j. se. hyoscyami albi ꝑ j. gra. vj. (obolum vnum & semis) panis sachari ꝑ iij. fiat puluis detur ad ꝑ ij. cum iulep viol. aut liquore conuenienti, Drachma vna trochiscorum alkeken-gi cum liquore conuenienti plurimum commendatur.

G R V mi decocto stœchados, sarmetorum vitis, mumię, oxymelitę, rebusq; eiusmodi incidentibus dissolui debent. Hinc graue periculum est: sequitur enim animi defectio, coloris fœditas, pulsus paruus, frequens, obscurus, anxietas & vt plurimum mors.

Grumi sanguinis.

Sanies & pituita si crassior, incidenda est. In

DE CALCULO.

Inflammationes & vlcera suo modo curâda sunt;
ita & calculus. Plenior vesica, manibus compri-
menda est, & qua parte tumor eminet.

DE CALCULO.

Cap. XLIX.

C Alculum gignunt, calor renum immo-
dicus, aliquando etiam tepidus, & hu-
mor crassior, qui calore lapidescit. Generatur
aliquando in renum stomacho, aliquando in
substantia. In vesica quoque generari ver simili-
le est, & maxime pueris. Signa.

Signa.

D Olor fixus in renibus, grauitas, vrinæ
initio tenues, primum quidem cum arenis &
exigua asperitate, deinde cum multo sabulo
crassiores excernuntur.

Curatio.

P Rimum igitur clystere molliendus ven-
ter est. Renes enim oppressi stercore grauius
dolent, liberati leuius, & ex eo calculus mino-
ri negotio excluditur.

I N dolore vehementi, sanguis detrahi po-
test è poplite, vel malleolo: alius quoque leui
medicamento ducenda est, vt cassia ad ζ j. cū
saccharo violaceo, vel glycyrrhizæ decocto. O-
pimum quoque fuerit interim dum Medicus
laborat excludendo calculo, alternis diebus
cassizæ ζ s. aut ζ iij. cum saccharo viol. impera-
re, horæ dimidio ante cibum.

Postea-

P O steaquam verò stercus depulsum est, se Topica.
 sta vena est, & lenita aluus, vnctionibus, fo-
 mentis, balneis & remedijs lenientibus atq; la-
 xantibus vtendum est. Conueniet itaque ole-
 um viol. amygdalarum dulcium, butyrum re-
 cens, oleum in quo radices althææ coxerint:
 vnguentum dialthææ, hyssopus humida: hyc- Vnguent.
 me etiam oleum liliorum & chamæmeli. Fo-
 tus & balnea ex malua, bismalua, violaria, cha-
 mæmelo, meliloto, lini semine & fœnugræci,
 alijsq; eiusmodi. Iuscula quædam ex malua,
 bismalua, adiectis ciceribus rubris cum multo
 butyro & modico salis.

P O stea verò remedijs vtendū est quæ cal- Calculus
excludunt.
 culum excludunt, primum quidem leuiori-
 bus, deinde fortioribus. Conuenit initio mel
 simplex cum decoctione liquiritiæ, betonicæ,
 lupulus, capparis, scolopendrium, cappillares
 herbæ, radix graminis, chamæbati & similia.
 Fortiora sunt scylla, iris, enula, aristolochia &
 similia. Oportet autē interuallis repetere hæc
 remedia, leniendo, laxando, excludendo.

Sanguis hircinus è iugulato hirco iuvene, Sanguis
hirci.
 quo tempore vuę maturescunt. Medius quidē
 excipitur, relicto eo, qui primus fluit & postre-
 mus, fictili vase reponitur, insolatur, exiccatur
 reservaturq; fideliter. Cū vsus fuerit, accipies
 pulueris 3 j, s. è vino tenui. Trallianus à balneo

DE CALCULO.

aut iam laxatis vijs,renes,pubem,interifœmi-
neum calido hirci sanguine inungit.

**Lapis Iu-
daicus.**

Lapis iudaicus tritus & potui datus ꝓ j. pon-
dere. Solinus, Diosc. & alij Medici cum renum
tum vesicæ lapillos frangere scribunt: Gale-
nus non vesicæ, sed renum. Author libelli de
calculo, duplex genus facit, scribitque marem
è renibus: fœminam, è vesica calculum educe-
re. Datur cum oxymelite tritus in core, vel
cum ꝓ iij. aquæ.

**Oleum ca-
mæmelinū.**

Oleum chamæmelinum fictili vase conclu-
ditur, mixtis floribus genistę: vas fideliter clau-
sum stercorario fimo sepelitur, illicque vt ef-
feruescat, aliquot dies relinquitur. Eo oleo re-
nes, pubes, perinæum inungitur.

Bestiolæ in lapidarijs fodinis quasi verrucę
lapidibus obhærescunt: quæ si quinq; numero
ex aquæ ꝓ iij, sumantur, mirabiliter iuuant.

**Pellis & res
nes leporis.**

Pellis leporis cremata, lepus decollatus, alio
qui integer cum corio & carnibus vase fictili
crematur. Eiusdem renes siccati & inueterati
pondere ꝓ iij. ex vino tenui propinantur.

Cinis vngulæ equi, plumarum palumba-
rum, testæ cochlearum, cancrorum, vermium
terrenorum, assellorum, passerculi, quam cau-
dam tremulam vocant, stercus murium in ac-
eto tritum, calculus quem quis primum exclu-
serit, lotium capræ montanæ, cicadæ aridæ &
alia

alia eiusmodi, à proprietate calculū excludūt.

Corticis raphani acerrimi ꝯ vj. horis 12. in vini albi tenuis ꝯ viij. madeant, colatura duas desibus sumitur.

Cortex raphani.

Terebinthina ad cautionem calculi potius quàm exclusionem imperanda est, eaque multis modis vtimur.

Terebinthinae usus.

R̄ terebinthinae ꝯ iiij. inuratur in lamina ferrea candēte, vt possit infriari, dabis ꝯ ij. eius pulueris, cum ꝯ ij. aquae saxifragiae, chamæmeli vel genistae, & ꝯ j. oxymelitis. Hoc medicamentum excludendo calculo satis esse potest, vbi prius leniueris & relaxaueris.

R̄ terebinth. ꝯ lithontripton ꝯ ij. misce f. bolus. Hoc verò datur tempore paroxysmi.

R̄ terebinthinae lotē in aqua viol. ꝯ f. benedictae ꝯ ij. Aliud.

R̄ terebinthinae lotae in aqua alkekengi ji. pulueris diatragacanthi & liquiritiae ꝯ j. f. in corporentut in ꝯ f. calsiæ cum saccharo, f. bolus. Aqua distillata è terebinthina.

Iustinianum excludendo calculo ad ꝯ. iiij dissoluitur in glycyrrhizae decocto, vel cum saccharo viol. in bolum cogitur.

Iustiniani.

Lithontripton per se ꝯ iiij. pondere, vel cū ꝯ j. iustiniani ex decocto liquiritiae, aqua viol. chamæmeli aut simili. Aliud.

Lithontripton.

R̄ cornu cerui vsti & puluerisati, gummi

DE CALCULO.

tragacanthi similiter puluerisati ana. ʒ. j. terebinthinæ crematæ ʒ. f. lapidis iudaici, pul. vermium terrenorum ana ʒ. j. incorporentur omnia in iustiniani ʒ. j. f. deinde in decocto glycyrrhizæ dissoluantur vt fiat potus.

Guaiacum

Sunt qui singulare præsidium putant frangendo lapidi lignum guaiacum: iusta quidem ratione, virtute videlicet incidente, abstergente & leniente. Talia enim esse oportet, quæ calculosis imperantur. Vitanda tamen sunt quæ nimium siccant, quæ crassiorum partium. Ratio quoque habitus corporis ineunda est: obesum corpus magis tenuantia: gracile verò minus perferre potest. Sic loci temporis, anni, ætatis & similium meminisse oportet. Laudatur & hæc distillatio

Distillatū.

Rz mellis ros. terebinthinæ ana ℥. j. iuiubarum, sebesten, nuculeorum pini ana ʒ. iiij. granorum alkekengi, se. cucumeris, nigellæ, apij ana ʒ. ij. succi raphani per residentiam depurati ℥. ij. semina & reliqua materia solida conquassentur, cum cæteris ponantur in alembico, f. distillatio. In distillationis ʒ. iiij. dissolues ʒ. j. aut ʒ. iiij. eorum, quæ à proprietate calculum excludunt, qualia sunt antea descripta, cinis scorpionum, scarabeorum, hepatis asini, testæ ouorum è qua exclusus receter pullus est, hirundinum, testarum auellanæ. Limonum succus à multis comendatur, item & cinis vitri combusti.

IN vehementi siti & calore, siquidem prius vacuatum corpus est, si debilitas visceris, aut consuetudo non prohibet, aquæ frigidæ potus largiter exhibitus, aliquâdo calculû excludit.

Aqua frigida calculû excludit.

R^z radicis asparagi, rad. rubi humilis (chamaebatos) ana M. ij. foliorum betonicæ, polij montani ana M. ij. cicerum nigrorum M. j. fiat decoctio in aqua pluuiali secundum artē. In fine decoctionis adde aceti scylitici ℥ j. fiat colatura, dosis ℥ iiij. cum ℥ j. lapidis iudaici aut similibus. Porphyrij & Octauiani.

R^z brassicæ siccæ & in puluerem redactæ ℥ ij. piperis ℥ s. misce, dato ℥ j. ex aqua aut aqua alkekengi vel simili.

Gallus lassatus flagris cum polytricho, trichomane, lupulo, asparagis, alijsque eiusmodi ad putrilaginem coquitur, ius sorbetur.

Gallus antiquus.

PRÆterea conueniunt scolopendriû, portulacæ succus, cucurbitæ cinis, valeriana, semen personatæ, cartami (sem potius quàm radix) & damasonij radix, lini, cucumeris, malue, fœnugræci, apij, seseleos, hederæ semina, typeri radix, asari, rusci, cynosbati fructus detracta interiori lanugine & spōgiolæ in cynosbatonata, gūmi & nuclei cerasorum, persicorû, cortex medius coryli, sarmenta vitis combusta & extincta in vino tenui, aut liquore conuenienti, vt bibatur colatura.

Medicamenta.

DE CALCULO.

R Electri, lapidis spongiæ, pul. saxifragiæ ana 3. lex aqua genistæ, aut simili.

Cucurbitulæ.

Cucurbitula lenitò prius dolore, remolli-
tis ac laxatis partibus, iam non vrgente inflam-
matione, reñibus primum, deinde perina o &
inguinibus affigi debet.

**Methodus
curandi.**

IN summa clystere mollienda aluus, lenien-
dus venter è cassia, detrahendus sanguis è cru-
re, nisi plenitudo sit totius corporis, sic enim
è cubito prius. Lenientibus atq; laxantibus,
deinde etiam leniter incidentibus calculus ad
exclusionem præparandus est, paulatimq; fa-
ciendus gradus ad ea, quæ detergent, attenu-
ant, expellunt, atq; etiam vrinas mouent. Mul-
tò maximè cum iam remittit dolor, & calcu-
lus commutat locum. Quod si ijs quæ bibun-
tur nihil efficitur, cucurbitula vtendum est. Si
verò nequæ hoc remedio exit calculus, ad re-
laxantia, lenientia & initium curationis re-
deundum est.

Chirurgia.

Si verò translatus est calculus in vësicam,
neç aliter extrahi potest, ad incisionem con-
fugere oportet. Cuius rationem repetes ex
sexto Pauli, chirurgia Albucasis, & alijs chi-
rurgis.

IN hoc morbo intolerabilis dolor, facit vt
aliquando vtendum sit narcoticis, de quibus
multa antea. Oleum de scorpionibus descri-
ptione Rasis,

R ari-

℞ aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi. ^{Oleum}
 corticum rad. capp. ana. ʒ j. bulliant omnia in ^{scorpionū.}
 ℥. j. olei amygdalarum amarum (sunt qui ad-
 dant succi raphani ℥. s. vt fiat decoctio ad suc-
 ci consumptionem, alij aquam) per hebdoma-
 dam insolentur. Singulis ℥. colaturæ adijce
 denos scorpiones, & rursus insolentur per dies
 quindecim. Gutta eius olei virgæ infunditur.
 Eodem oleo pecten & perinæon inunguntur.

Probatum quoq; multis balneum sulphu-
 reum ex aquis naturalibus, vel sub quadruplo
 sulphure liquato in quadrupla aqua. Alij in
 eiusmodi aquam calidam lintea immergunt et
 calida perinæo ac pectini apponunt.

DE VRINAE ARDORE.

Caput L.

IN iudicijs acutarum febrium, bilis plurima
 aliquando excernitur à natura, quæ si deflu-
 it in vesicam, ardorem vrinæ facit. Vrina sero
 sanguinis & parte bilis constat. Cum autem al-
 terum acrius est, vel augetur proportio bilis,
 ardor vrinæ fit. Vrina omnis acris est: sed mul-
 tò maximè sentitur acrimonia, si qua pars vl-
 cerata est, qua effluit. Ad vesicam glandulosa
 sunt corpora, quæ humorem reddunt, vnde v-
 rinæ acrimonia temperari potest. Ea exiccan-

DE ARDORE VRINÆ.

tur immodico coitu, morbo aut medicamēto, quæ causa ardorem vrinæ gignit. Sanies quoque acris, ex superiore corpore in vesicam defluit, quæ vrinæ mixta, ardorem facit.

Curatio.
Phlebotomia.

Cognita causa, de phlebotomia, purgatione & alijs remedijs cogitandum. Phlebotomia tū conuenit, cū calidius corpus est, è brachio.

Purgatio.

Purgatio & diuertendo & acriorem humorem repurgando cōuenit. Sed prius considerandum est, an solum leniendum, an etiam detergendum. Vbi solla humeris acrimonia est, leniendum solum: vbi vlcus, etiam detergendum. Leniendo conuenit cassia detergendo terebinthina. Vtriusque virtus augetur aut temperatur ijs, in quibus dissoluitur. Itaq;

Purgatio.

si leniendum imperabis 3 x. cassiæ, aut 3 j. (plus minúsue) dissoluesque in decoctione iuiubarum, passularum mundatarum, substen, prunorum & similium. Si detergendum, sinul & leniendum, dissolues in aqua hordei, sero capri no, iulep viol. quod & lenit & deterget. Terebinthina, vt prius dictum est vteris. Aliquando rhabbari 3 j. aut 3 iiij. 3 vj. cassiæ commiscebis atque ita dissolues, vel cum saccharo coques in bolum. Quod attinet ad reliqua remedia, reuocanda sunt in hunc locū, quæ de stranguria ab vrinæ acrimonia dicta sunt. Si tantū humoris acrimonia est, leniendum, si etiam vl

cus præterea, detergendū & consolidandum.

Leniunt iulep & syrupus de violis. Maluæ & Lenientia
bismalux frequens vsus. Aqua ex ijsdem destil-
lata, decoctum glycyrrhizæ rasæ, passulatum
mundatarum, prunorū, iuiubarum, seminum
communium frigidorum, psyllij, cydoniorum
lac muliebre, oua & similia. Imperabis ergo a-
quæ maluæ 3 iij. iulep violarum, 3 j. f. Vbi de-
tergendum, vteris syr. de iuiubis, de nenupha-
re, de papauere: & ijs quidem magis, si maior
ardor est, hosque syropos dissolues in supradi-
ctorum decoctis. Semina melonum excortica-
ta & mundata 3 j. pondere, aut ex ijsdem semi-
nibus, semine cucumeris & cucurbitæ cum a-
mygdalis, imperabis, lac amygdalinū, aut hoc
ipsum iubebis comparari, dissolutis amygdalis
in decoctione prædictorum seminum. Atque
vbi vrgebit ardor semina hyosciami albi & pa-
paueris commiscebis. Semina lini, althææ &
cydoniorum, psyllij eidem vsui esse possunt, vt
vel hordeatis vel lacti amygdalino misceatur.

Deterget iulep, id est aqua sacchari, sed le- Detergentia
niet magis, si saccharum violaceum sit. Pluri-
mum laudatur medicamentum ex trochiscorū
alkekengi 3 j. iulep violarū 3 iij. hocq; vtendū
erit, vbi maior ardor est. Lac muliebre & bubu-
lum lenient magis, ouillū cōfirmat, caprinum
& asininum detergent magis. Serū separatim

DE ARDORE VRINAE.

ab ijs generibus lactis, magis detergebit.

Iniectio.

Sed quia ardoris sensus magna ex parte sentitur ad collum vesicæ, & extremitatem glandis, propterea iniectionibus in colem turūdis quoq; in foramen virgæ vtendum est. Leniendo lac muliebri iniiciendum est, liquor tenuis albuminis oui agitati atq; despumati, vel hoc.

℞ mucilaginis sem. pŷyllij & cydoniorum, extractæ in aquæ cucurbitæ, violarū, maluæ ana ʒ ss. lactis muliebri ʒ j. liquoris oui ʒ ij. misce pro iniectione.

In maximo ardore mucilagines sem. hyosciami & papaueris cōmisceri possunt, vel camphoræ gr. vj. aut plura, vel opij gr. ij. aut. j.

Turunda.

Turunda (tenta) intingi debet ceroto rosarum Galeni quod ita comparabis.

℞ olei rosarum ʒ vj. lauetur sexies ex aqua rosarum, deinde cum ʒ iiij. ceræ lotæ, fiat cerotum liquidū in duplici vase. Potest & hoc cerotum refrigeratum affundi succo plantaginis: & hoc magis, vbi extremitas virgæ vlcerata est. In dolore vehemente dissolues camphoræ ʒ j. in aquæ rosarum aut violarum ʒ j. vel in vino dulci, opij gr. ij. atque ita linimentum (turundā) in ijs liquoribus madefacies & moliter indes in virgam. Si detergendū, supradictis iniectionibus addes saccharū, vt nō solum lenias, sed etiam detergeas, vel aqua hordei. vel
fero

fero lactis cum modico saccharo.

C V M vero vlcera deterfa sunt, conueniunt *Cōsolidantia* quæ consolidant. *ulcus.*

R̃ sartocollæ ʒ j. amyli, cerusæ lotæ ana ʒ *Iniectio.*
 f. nutriantur in lactis muliebris aut caprini vel
 ouilli ʒ ij. fiat iniectione in virgam, quæ ter aut
 quater in die repetatur. Aliud.

R̃ aluminis plumæ (scissilis) sacchari ana
 ʒ j mellis ʒ j. f. vini albi austeriusculi ʒ ij. leui-
 ter bulliant, de colatura fiat iniectione. Conue-
 niunt & hæc.

R̃ succi virgæ pastoris depurati, succi plan-
 taginis ana ʒ j. boli armeni, mumix ana ʒ i. mi-
 sce pro iniectione cōsolidante. Trochisci de ca-
 rabe, de terra sigillata, bolus armenus tragacan-
 thum, trochisci de spodio ʒ j. pondere dissol-
 uuntur in ʒ ij. succi equiseti, (hippuris) plan-
 taginis, iulep rosarum, syrupi myrtillorum di-
 luti, vbi consolidandum est.

I N curatione ardoris vrinæ, clysteres ex his *Sudor.*
 quæ leniunt inijci debent, atque vbi humoris
 acrimonia causa est, sudoris prouocatio & vo-
 mitus ex vsu sunt.

Inunctiones pectinis & perinæ è descripto *Inunctio.*
 ceroto rosarum oleo violaceo, de nenupha-
 re, de mandragora, de salice, cucurbita & cu-
 cumere.

Balnea : immersio pudendi in decoctione *Balnea.*

DE MICTV SANGVIN.

leniente. Laudatur à multis iulep ex aqua acetosæ & quarta parte sacchari violacei. Postremo partes affectæ roborandæ, de quo in gonorrhæa.

DE MICTV SANGVINIS.

Cap. LI.

Mictus sanguinis causa.

Q Vibuscum naturis eodem modo sanguis per vias vrinales excernitur, quod alijs per nares, venas sedis, aut vomitum. Hoc ipsum præter naturam est, debetque anteuerti secta vena è brachio dextro. Eiusmodi excretiones sanguinis, excitantur inclinante vere. Veris itaque initium anteuertendum est.

2 Alijs cruenta est vrina, similisq; diluto sanguini ex laxitate atque amplitudine venarum, quæ à caua renibus inferuntur. Renum quoque infirmitas hoc idem efficit. Scriptum ab Hippocrate: Quicumque sponte sanguinem mingunt, ijs à renibus venula rupta est. Sponte, hoc est & repente, & sine manifesta causa. Rupta vero vena propter humorum multitudinem ac crassitudinem, unde venæ quæ renum ventres subintrant, disrumpuntur, aut aliquando aperiuntur: Ex casu, saltu, ictu, aut vehementiore motu, idem potest contingere. Rupta vena confertim effluit sanguis, aperta paulatim. Laxioribus venis emulgentibus, infirma vi re
num

Signa,

num contentrice aut discretrice, statim à cibo serum sanguinis purum, post coctionem cum spongioso sedimento excernitur.

In infirmitate vasorum seminariū aliquando excernitur sanguis, non cum vrina, sed in coitu, aliter quàm vesica exulcerata. Hic enim cum vrina sanguis emingitur quibusdam corpusculis immixtus. Nec enim vesica solum, sed etiam in cole vlceratio esse potest. Sed vlceris, sanies & dolor indicia sunt.

IN imbecillitate, primum cognoscendū est, an à calido an à frigido, fereq; à calido esse volunt. Quod malū astringentibus, refrigerantibus atq; supprimentibus corrigi debet. Quæ quia propter tardum motum non facile penetrant ad renes, diureticis, maximè aromatibus cōmiscenda sunt. Sed diureticorum minima sit portio. Non enim vt vrinas moueant, sed vt adstringentia ad renes deducant, commiscantur. Materia in sputo sanguinis, in hæmorrhagia è naribus, & alijs locis descripta est.

Auicenna nihil melius existimat confir-
man dis renibus lacte ouillo. Datur ieiunis ad
℥ vj. quibus aliqui admiscent boli armeni aut
similis medicamenti ʒ j. Alij etiam ʒ j. spicæ,
vel cinnamomi, &c.

Rz lactis ouilli ʒ iij. aquæ millefolij ʒ j. boli
armeni ʒ ij. spicæ ʒ i.

Curatio im-
becillitatis
uenarum.

Lac ouillũ.

DE MICTV SANGVIN.

℞ lapidis hæmatitis ʒ j. dissolue in aqua plantaginis ʒ iiij. Quod si ardor sentitur in renibus.

Sanguinis
mictus cum
ardore.

℞ aquæ plantaginis & portulacæ ana ʒ ij. philonij ʒ j. Aliud.

℞ mucilaginis seminis papaueris albi ʒ f. trochiscorū de carabe ʒ f. rasuræ eboris & cornu cerui ana ʒ f. omnia incorporentur carne cydoniorū condita sine speciebus, detur auelanæ magnitudine duabus horis ante pastum.

Conueniunt radix consolidæ maioris, gummi Arabicum, tragacantha macerata prius, de inde feruefacta in vino austeriusculo, colatura bibatur, maximè vbi solidandum est. Et hoc quoque laudatum ab antiquis.

Trochisci.

℞ aluminis plumæ ʒ j. gummi Arabici ʒ f. tragacanthi ʒ ij. cum vino astringente, fiat trochisci pondere ʒ ij. dentur vt prius. Ad dersionem vlcerum & consolidationem repetenda sunt, quæ proximo cap.

℞ spodij ʒ f. berberorum ʒ iiij. seminis lactucæ ʒ v. cum succo cydoniorum, fiant trochisci, detur ʒ j. ex decoctione sumach. Puluis seminis lactucæ inspergitur vitello oui mane.

Hæmorrhagia
vesicæ.

IN hæmorrhagia vesicæ, ilibus ac lumbis atque etiam natibus, & coxendici exteriori, cucurbitula affigi debet.

Topica.

IN unctione renum, perinæi & pectinis ex oleo

oleo rosarum, myrtillorum, de cydonijs, aut eo in quo alstringentia coxerint. Hinc fiunt cerota liquida, quibus conspergi possunt santali, bolus armena, cortex thuris & similia: commisce ri acacia, hypocystris, & similia.

HIC summum periculum est vbi grumescit sanguis. Nam hinc sequuntur, quæ capite de Difficult. mingendi dicta sunt. Conandum quæ est, vt incidantur grumi oxymelite, artemisia, stæchade, assa odorata, conyza, seminis raphani, coagulo, summatim ijs, quæ lapidem comminuunt, datis ex oxymelite. Quibus si nihil efficitur inciso perinæo, quomodo calculi educi debent.

Ad grumos sanguinis.

DE DIABETE, IN VOLVNTARIO VRINÆ EFFLUVIO, & SIMILIBUS.

Caput LII.

VRITICUS Græci vocant, qui sæpius mingunt. Vitia quæ in sæpius mingendo contingunt, vrinæ multitudo efficit, renum vitium, resolutio vel infirmitas musculi, qui cololum vesicæ claudunt.

Mistus frequentioris causæ.

Diabete proprium est renum vitium. Nas citur primum humoribus vitiosis substantia renum imbibitis, vnde insatiabilis appetentia potus, vt in canina appetentia insatiabilis ciborum cupiditas, ex vitioso humore, qui sto-

Diabete.

DE DIABETE.

macho imbibitus est. Sequitur perpetua renum attractio. Sed cum infirma sit alteratrix & contentrix, quicquid hinc bibitur, statim per vrinam effluit, quomodo in lienteria potus cum cibis. Hic ardent viscera atque adeò vniuersum corpus, propterea quòd quicquid aquosum & serosum in venis, vnde videlicet sanguis temperatur, attrahitur in renes & emingitur. Ex quo fit, vt & humores solidarum partium exugant venæ, quod deinceps renibus attrahentibus emingitur. Rara hæc affectio, & in ardoribus nascens, vbi vrina omnino aquæ similis est.

Inuoluntarium urinæ effluuium.

ALIVS affectus est vesicæ, cum vel defluxione, vel frigore, ictu, casu, vulnere, aut alia huiusmodi causa, nerui qui vesicæ musculū claudunt, resoluuntur. In qua affectione, & noctu & interdium præter voluntatem vrina effluit. Cui & alia affectio vicina est eorum, qui non satis vrinam cōtinent, sed stragulas noctu permungunt. Quod vitium familiare senibus & pueris: senibus propter siccitatem, pueris propter laxitatem & mollitiem.

Qui noctu se permungunt.

Curatio diabetæ.

In ardenti febre, diabetes incurabilis: In alijs ægrè curari potest, quia non facile initio deprehendi potest. Quod si initio deprehenditur, mittendus est sanguis è cubito, sed moderatè. Deinde vtendum ijs est, quæ refrigerant,

Venæ sectio.

gerant, contemperant, & paulatim vitium corrigunt renum. Vitæ ratio omnino frigida tum actu, tum potentia. Cataplasmata quoque refrigerantia, tum renibus, tum visceribus applicanda. Vomitus eius quod bibitum fuerit. Sudor excitatus in dolio, ut tantum ex- Sudor.
ratur caput.

CONueniunt cibi, lactuca, endiuia, ova for Vitus.
bilia, recens caseus sine sale, lac in quo vel chalybs, vel calculus fluuiatilis sæpius extinctus sit, pulli gallinarum hordeo mundato, vel quatuor seminibus frigidis maioribus infarcti, hordeatum, lac amygdalarum, præparata cum refrigerantibus. Et quia his viribus primum detrahitur, suilla caro, vinum crassum, rubrum, aqua frigidissima dilutum, concedi possunt.

Farinam oxyrhodo subactam, emplastri Topica
modo & renibus (lumbis) & hypochondrijs applicabis. Vitis & rosarum folia: ea in summa quæ refrigerant, & astringendo roborant renibus applicabis. Cerota comparabis lumbis & pectini ex rosaceo, subigesque cum lactucæ succo & similium. Aliquando etiam in maiori ardore, expresso succo è folijs papaueris cerota subiges, aut populeum vocatum ceroto commiscebis, eruntque ʒij. populeonis ad singulas ʒ ceroti. Laudatur & infusio ex oleo, in quo vermes terreni fuerint decocti. Mirum est

Theriaca. quòd theriaca natura sua calida & sicca, sitim diabetis extinguit, data interuallis. Leges vltimū problema primi Aphrodisei. Hunc morbum Syphonem, vrinæ profluuium, intercutem matulæ, dysfacum, hyderon appellant.

A paralyfi. Si paralyfis ex luxatione vertebrarum, non facilè curatur: alioqui balneis sulphureis, frictionibus asperis, inunctionibus dictis capite de Paralyfi. Dropacè & sinapismis vti oportet, vt vim medicamentorum percipiant lumbi, perinæon & pecten.

A multitudine uring. QVOD si vrinæ multitudo in causa est, vtus ratione exiccante, ijs quæ ad intestina diuertunt vtendum erit.

A musculi sphincteris infirmitate. AD alios vero quibus infirmitas claudentis musculi causa est, conueniunt caro erijci, cerebrum aquilæ, cerebellum, renes, testiculi leporis, pulmo hœdi, lingua anseris, galli guttur, vesica suilla, tauri, capræ, ouis, enula, thus, myrobolani, cyperus, coriandrum præparatum, myrrha, menta, calamentum, galbanum, castoreum, feseli, lac ouillum & caprinum, oleum de behen, de spica, rutaceum, masticinum. Vulgare remedium est esus murium. Oleis itaq; vel inde comparatis corotis, pecten & perinæon inungenda sunt. Reliqua ex vino odore senibus, ex aqua pueris exhibenda sunt. Laudantur & hæc.

R̄ cinnamomi electi ʒ j. spicæ nardi ʒ f.
cyperi, coriandri præparati ana ʒ j. vesicæ su-
illæ siccæ, testiculorum leporis siccorum ana
ʒ f. omnia incorporêtur conserua enulæ cam-
panæ prius conquassata & subacta. Aliud.

R̄ glandium ʒ ij. corticis thuris ʒ j. sem. co-
riandri præparati, boli armeni, gumi arabici
ana ʒ ij. spicæ, cinnamomi ana ʒ j. testiculorū
leporis, vesicæ suillæ ana ʒ f. misce fiat puluis,
vtatur sæpe. Laudatur lac ouillum & caprinū
cum modico saccharo, vel cum medicamen-
tis descriptis.

Ne permingat stragulas, vesica tauri vel
suis prius madefacta oleo, interiori parte de-
bet è cole suspendi & ita alligari, vt quicquid
meiatur excipiat vesica.

DE VERMIBVS.

Caput LIII.

Vermium tria genera. Ascarides, infima Vermium
differentia.
parte recti intestini, adultioribus pue-
ris familiares. Rotundi qui pueris superiori
intestino ferè generantur. Latus vermis per
totum intestinum aliquando extenditur, ra-
rò admodum & paucis gentibus generatur,
nunquam Atheniensibus, Thracibus, vt scri-
bit Theophrastus. De eo iam antea cap. de ca-
R

DE VERMIBVS.

Cauſa. nina appetentia . Horum omnium generatio putris materia & calor. Signa ex Paulo & Actio colligenda ſunt. Verminam hūc morbum & verminationem appellarunt, non ſolum hominibus, ſed iumentis familiarem.

Curatio. IN genere conueniunt , quæ enecant vermes & excludunt, acria, amara, quæ vias lubricant, quæ à proprietate hoc efficiunt.

Ascarides. ASCA ridibus , quia infimo inteſtino hærent , glandibus potius vtendum , quàm potionibus. Fiunt glandulæ ex carne ſalfa filo appenſa: fiunt ex lardo prius aqua frigida macerato: Item ex melle mixta aloe, & ijs, quæ interficiunt vermes : Qualia ſunt coriandri ſemen & caulium, decoctum thymi, allia, abſinthium , hyſſopus , menta , bouis aſtragalus vſtus, vermes terræ vſti, chamæmelum, zedoaria , ſantonicum, myrrha , puluis contra vermes, ſecuridacæ ſemen, ſuccus portulacæ & endiuizæ, oleum omphacinum, medulla cerui, ſolia perſicorum, rutæ, raſuræ eboris, vnicornis, rhabarbarum, cornu ceruinum. Superſtitioſum eſt , quod Scribonius ſcribit oportere e cornu cerui ſcobem fieri lima lignea, nam aliter iuuare poteſt. Plurimum laudatur decoctum ſebeſten : alia quoq;, quæcunq; qualitate aliqua vniuerſali vermes interficiente prædita ſunt. Aquæ conueniunt graminis, abſin-

thij, portulacæ, & rerum amararum.

PVRgatio vero an conueniat quæstio est, **Purgatio**
de qua non dubitandum. Repurgata enim ma-
teria, vnde vermes generantur, vnâ cum ea
vermes excludentur. Laudatur rhaharbarum,
hiera tum simplex, tum diacolocynthidos. Ve-
teres etiam Medici scammonia vti sunt. Nûc
licebit vti grani iij. diagridij cum aqua absin-
thij, aut simili. Sed purgatio commodior est,
vbi in superiori intestino vermes sunt.

R decoctionis Sebesten ʒ iij. cornu cer-
ui ʒ j. mentæ siccæ, & piperis tritana ʒ ij. La-
tos etiam expellit rhabarbari ʒ j. aquæ grami-
nis aut absinthij ʒ ij. spicæ gr. iij.

Clysteres ex vini ʒb. j. olei absinthij ʒ iij. **Clysteres**
pul. hieræ ʒ ij. Poterit etiam aliquando addi
mellis ʒ j. & ʒ j. salis. Nam & sal deglutitum **Salis fa-**
ascendentes vermes ad stomachum deorsum **cultas.**
pellit. Videndum tamen ne odiosa vermibus
per sedem iniiciamus, cum ad superiora eorû
motus est: tum enim iucunda potius, vt melli-
ta, & dulcia iniicienda sunt, aut eiusmodi glan-
dulæ subijciendæ. Bibenda verò quæ eisdem
vermes deorsum pellant. Nam aliquando ad
ventrem vsque ascendunt, & stomachum lan-
cinant, vnde syncope, conuulsio, mors.

Emplastra & cerota ex cerato facta è tri- **Emplastra**
bus partibus olei absinthij, amygdalarû ama-

rarum, nucleorum perfici & vna ceræ. Deinde vbi refrixerint, subigi debent ex succe amaro, vt absinthij. Adijciendum quoque aliquod genus fellis, nam fel insigni amarore enecat vermes. Ex quo & glandulas felle illinimus. Medulla cerui, venter, lumbi, & perinæon inungi possunt.

MIRVM est quod aliquando contigit vermes per ingenuina prorupisse via exedendo facta, alijs per vmbilicum. Nonnullis quoque contigit vt multitudo vermium tunicam sibi contexeret expansam toti intestino & omnino similem veris intestinis.

Alui fluo-
r simul infe-
rans.

Vbi coniunctus est alui fluuor, eligenda quæ præterquam quòd vermes enecant, etiam alui fluxiones retinent, quale est rhabarbarum & plantago.

Remedia
puerorum.

Et quia pueri ferè vermibus infestantur, refugiunt autem quæcunque amara sunt, ductis dentibus clysterio, aut curuata fistula medicamenta in œsophagum infundenda sunt. Fiunt clysteria ex muria, aqua oliuarum, centauro in absinthij decocto. Sed vbi vermes exclusi sunt, roborandum intestinũ, instituenta vitæ ratio, ne in posterum regenerentur. Theriaca & mithridatium, si nulla febris est, vermes excludunt, & enecant.

DE HEAMORRHOIDVM SVPP-
pressionē. Caput LIIII.

Hæmorrhides vniuersum corpus vacuant, aliquando cacochymia: aliquando puro sanguine, quodq; sola quantitate peccat: id aut per venas, quæ à vena caua explantatæ vtero, pudendis & sedi implantantur. Hoc enim verisimilius est, quàm per venam, quæ à portis hepatis, in extremum rectum intestinum porrigitur. Neq; admodum verisimile hæmorrhoidum materiam per venam portam lienem repurgare. Ramus enim venæ, quæ à medio liene descendit, desinit in omentum. Hæc vacuatio in genere præter naturam est, ideoque periculosa, & ideo non facienda eius consuetudo. Quibusdam tamen naturis fit naturalis consuetudine, & incolumis valetudinis causa est. Tale est quod scribit Hippocrat. Atra bile vexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides superuenientes bonum. Præterea quod quartana, melancholia, angina, pleuritide, & alijs eiusmodi grauioribus morbis hominem vindicat. Salutaris quoq; hæc vacuatio epilepticis, & ijs quibus tubercula, & maligna vlcera, oboriri solent. Fluunt tamen aliquando hæmorrhoides immodicè: oportet enim ea fluxione corpus leuari non infirmari.

Atq; vbi de commouendis hæmorrhoidi-

Nota cōtra
Anatomi-
corum sen-
tentiam.

Curatio sup-
pressarū Hæ-
morrhoidū

bus consilium est, peculiaris natura ægri primum interroganda est, an ex consuetudine & statis interuallis, soleat eo modo repurgari. Sunt enim quibus periodicè fluunt, mulieribus viduis, senibus, & quibus aliter supprimuntur menses, sanguis interim diuertit à venis vteri ad venas sedis, & ita per periodos sese repurgant. Præterea interrogandus est æger, num sit opportunus grauioribus illis morbis, quos diximus. Hæc enim efficiunt liberius consilium excitandæ huius purgationis.

Quibus modis excitetur ad fluxum.

EXCITATUR aut aliquâdo purgationibus, quæ cachochymia conueniant, nonnunquâ phlebotomia è malleolo, vel ijs venis, quæ superiore parte pedis eminent. Cucurbitulis cruribus admotis & sedi. Breuissima via est per sanguifugas. Ferro etiam aperiuntur vbi turgent (quas mariscas appellant) tum etiam medicamentis, vt oleo è nucleis persicorum, aut in quo res acres & amaræ coxerint, hoc vnguento.

Et pinguedinis lardi erasæ ex parte pinguisima ʒ j. olei irini, rutacei aut similium ʒ iij. fiat veluti vnguentum molle, quod subigatur ex succo cœpæ rubræ. Eadem cœpa aceto macerata, contusa & imposita. Verum vbi dolor, cū butyro subigimus, oui vitello, vel rosaceo. Pulpa colocynthidos in conuenienti oleo immergitur, ano alligatur, quinque horarum spatio ap-

tiaperitur. Suppositoria ex radice cyclami-
 nis, ex radice cauliū induntur. Fortiora sunt,
 si taurino felle illinātur. Fellis genera maximè
 flaua, sed illinūtur, vel cotone excepta indun-
 tur. Pallida verò mitiora sunt. Fortè hoc est.

Suppo-
 sitoria.

Rz stercoris columbini in pul. redacti ʒ
 iij. inspergantur vnguento molli facto ex pin-
 guedinis lardi ʒ j. olei in quo matricaria coxe-
 rit ʒ f. salis ʒ ij. omnia miscētur in mortario.

Celerius agent medicamenta, si antea as-
 fricetur sedes ex folijs ficus, parietariæ, aut
 alijs asperioribus, vt linteo canabino, vel de-
 trito panno.

Fricatio anl.

Forus quoque ex cyclamino, centaurio, Fetus.
 abrotono, matricaria, bryonia, radicæ enulæ,
 ireos, absinthij & similia. Reliqua materia
 cap. de promouendis mensibus dicetur.

SED aliquando latent hæmorrhoides: qua
 in re placuit antiquis, vt sedes inuerteretur,
 inusitatum nec ita tutum remedium nostris
 temporibus. Euertitur sedes, quo facilius re-
 media applicentur.

Cæcæ hæ-
 morrhoi-
 des quomo-
 do aperien-
 dæ.

Rz piperis, nitri ana ʒ j. leuigatis, locum
 attingito. Vti licet & sale gemmæ, & puluere
 seriphij & felle, absinthij succo, & matricariæ.
 Postea verò reponenda sedes ex ijs, quæ pro-
 prio capite dicentur.

DE HAEMOR. FLVXV.

DE HAEMORROIDVM FLV-

xu nimio. Caput LV.

Hæmorrhoides vbi immodicè fluunt, sistere oportet. Sistuntur etiam vbi odiosa sunt, atq; vbi grauius aliquod malum non metuitur. Ad eam rem vena cubiti secatur extremæ manus. Cucurbitulæ hypochondrijs, lumbis ac scapulis affiguntur. Reliqua curatio potionibus, topicis remedijs, chirurgia perficitur. Quod ad chirurgiam pertinet, meminisse oportet, anum maximè ea parte qua spinèter est, partim neruosa substàtia, partim carnoso circulo constare. Neruosa substantia neq; acria & mordacia medicamenta, neque vstionem, aut incisionem sine conuulsionis periculo, perferre potest. Quod autem scriptum est ab Hippocrate, quodq; ad consilium sistendi hæmorrhoides pertinet; à diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si vna non seruetur periculum est, ne intercus, aut tabes subsequatur, ita intelligere oportet. Medico sananti hæmorrhoides, id est, dum sanguinem mittit, affigit cucurbitulas, topica & reliqua remedia adhibet, rectam vitæ rationem instituit, vna quidem eo tempore relinquenda hæmorrhoids, vt paulatim, non temerè ac præcipitanter fluxum cohibeat. Vbi verò persanauit, nulla relinquenda est.

Vene sectio.

Chirurgia.

POTIO.

POTIO nes conueniunt, quæ partim cap. de sputo sang. partim cap. de pro fluxijs alui, & mictu sang. descriptæ sunt, & describentur cap. de suppressendis mensibus.

Sed quia in hæmorrhoidibus ferè cruciat dolor, ijs vtendum est.

R̄ olei viol. ʒ iiij. cerusæ lotæ ʒ vj. ceræ albæ quantum sa. Aliquando vitellum oui cum rosaceo, aut violato oleo, subigimus. Nonnunquam & albumen cōmiscemus, vbi maior ardor est. Similiter & medullam panis albissimi ex supra dictis oleis subactam, emplastri modo apponimus. Conueniunt & mucilagines portulacæ, lactucæ, sed maximè psyllij. Fiunt quoque sacculi ex rebus anodynis, fiunt fots ex iisdem. Atque vbi doluerit grauius.

Ad Hemorrhoidum.
dolorem.

R̄ olei viol. ʒ ij. populeonis ʒ ij. cum ouo integro, fiat vnguentum. Quod si res vrgeat, opij ʒ j. commiscere potes.

Postremo videndum est, ne astringentibus immodicè, nimium resiccatus podex, non præstet officium. Itaque fomentis humectantibus corrigendum vitium est. Similiter cum nimium refrixit, refrigerantibus medicamentis & narcoticis, temperandus est.

Nimia astringentio vitanda.

Potest sisti hæmorrhoids siccantibus, causticis, vossella præhensis & vincolo interceptis venis. Laudatur farina volatilis, aranearū te.

D E E X I T V A N I .

la, & alia in fluxu sanguinis enumerata.

**Hæmor-
rhoides
quomodo
curantur.**

VRVNT, & (vt loquuntur) mortificât ex puluere rad. caulium torefactæ, & stercore canino similiter cremata, sæce arida vini astringentis cremata, adiecta tertia parte vitrioli Romani. Extremum est arsenicum rubrum cum æqua parte aluminis plumæ. Oportebit autem prius quàm hæc admoueas, sedem madefacere vino astringente:

D E E X I T V A N I .

Caput LVI.

Causa.

ANus totum intestinum rectum est, aut laxitas extrema eius. Excidit hæc infirmis musculis obliquis, qui sedē sursum reuellunt, & laxitate membranarum, quibus ossi sacro & lumbis colligatur: nerui etiam resolutione, qui ab extrema spina ad sedem porrigitur.

**Curatio si
simul in-
flammatio
adit.**

ITAQUE primum animaduertes, num qua inflammatio adsit, quod tumore, rubore, calore & duritiæ intelliges. Hic sanguinem è brachio detrahes, deinde etiam è malleolo, si fuerit opus. Materiam inflammationis resoluentibus medicamentis, & laxantibus digeres, admixta eorum parte, quæ recuperatiât, & corroborent.

Topica remedia frustra sunt adhibita sedi, si à læso neruo vitium est, tumque applicanda extremitati spinæ, vbi coxa est, redeundumque

dumq; ad genus curationis, quod cap. de Paralyfi dictum est.

SI verò infirmitas est eorum obliquo-
rum musculorum, & corpus crassis, & viscidis
humoribus abundat. Purgatione primum
utendum est, ex hiera simplici, agarico, hiera
diacolocynthidos & similibus. Tum si qua for-
des inhæsit ano, detergenda prius hydrome-
lite, vrina propria, decocto betæ, muria, ma-
rina aqua.

Si ob mu-
sculorum
infirmitatē.

Postea verò fatus conueniet sæpe repeti-
tus ex vino austero, in quo acacia, hypocystis,
myrtus, malicorium, rosæ, scoria ferri, & alia
eiusmodi astringentia, coxerint, adhibita ra-
tione quæ iubet: mollioribus corporibus mi-
tiora, durioribus, fortiora remedia esse adhi-
benda.

Fotus.

A fotu vnctiones, insersiones puluerum,
insecssiones & balnea vsurpanda sunt. Quan-
quâ inunctiones, & olea, quæ lubrica sunt om-
nia, non sine ratione quidam reiiciunt: alij ad-
mittunt, quia firmitus inhærent. Laudabitur
oleum nardinū, costinum, laurinū, masticinū,
rosaceum: quæ vbi inuncta fuerint, puluis ex
arida pice tria, seta porcina vsta, galla, fimo ca-
nino, cornu cerui, carabe, sanguine draconis,
mastice, corallis, & similibus.

Vnctio.

Suffitus è bdellio, pice arida, pinea, colo-

DE ANI, EXITV

phonia, exuuio serpentis, lapide molari can-
dente consperso aceto, in quo porri folia coxe-
rint, vino austero nigro, in quo aliquid astringen-
tium efferbuerit.

Inseffus. Inseffiones in aqua sulphurea, marina, bitu-
minosa, aluminosa & similibus. Puluis.

**Pulueres
inspergen-
di ano.**

℞ sang. draconis, malicorij, ana 3 j. galla-
rum bituminis ana 3 ij. subtilissimè trita &
cribrata inspergantur.

℞ carabe, cornu cerui vsti, coralli, balau-
stiorum, thuris albi, an. imonij, acaciæ, ana 3 f.
trita inspergantur, aut incorporentur, vitello
oui, & modico olei. Vitellum oui vsurpamus,
vt in eo pulueres incorporentur, tam quia nō
vt oleum, sordes relinquit.

Emplastra.

Emplastra fiunt ex ammoniaco, bdellio
malaxatis cum oleo nardino, & similibus con-
sperfis puluisculis, quæ astringant. Ossi sacro
& perinæo, & sedi apponi debent, & ne deci-
dant, fascijs contineri. Tempus remediorum,
vbi iam ægri deiecerint, & abluta sedes repo-
sita fuerit.

DE EXITV MATRICIS.

Caput LVII.

Relaxatis vinculis, refrigerato vtero, col-
lecta mucosa substantia, vterus excidit,
senibus magis, & ijs, quæ ex instituto vitæ nu-
dos

dos pedes in frigido continent, aut diutius in lapide frigido sedent, vel aerem frigidiorē excipiunt, maximè in puerperio, & tempore menstruorum: casu, ictu, resolutione quoq; decidit, in vehementi mictu eo modo, quo vrina & stercora præter voluntatem effluunt, ita etiam vterus delabitur. Totum vterum decidere posse, quidam è Græcis negant, contra hos Arabum authoritas & experientia facit, tumq; desperata res est, vt cum inueterauit malum, quod ætate senili non facilè curari potest.

INITIO animaduertendum, num retenta vrina aut stercus. Curatio. Primum enim excludere oportet. Vterus enim in medio positus & compressus magis, expellitur, nec facilè reponitur. Aptè collocanda mulier est, sublati coxis inuicem dilatatis, reflexis poplitibus, atque eo modo, quo in sede diximus, detergendum, abluendum, fouendum.

Pessuli quoq; è lana molli inuoluta lineolo fingendi sunt: in ea lana pulueres misceri possunt, qui vterum confirmant. Pessulus factus pro ratione ætatis, immergendus est vino, in quo adstringentia coxerint, & ita insinuandus est pudendo, prius reposito vtero. Pectinem quoq; ue & lumbos lana, bombace, aut spongijs imbutis, oxycrato contegemus, & ne concidant alligabimus. Pessuli.

DE MATRICIS EXITV.

Cucur-
bituræ.

Cucurbituræ cum multa flamma vmbilicæ
& sumini, atq; etiam ilibus affigendæ sunt, sæ-
piusque repetendæ, atque interuallis cucurbi-
tularum, emplastrū supra vmbilicum, & lum-
bos affigendum.

Emplastrū

Rz galbani ʒ j. s. myrrhæ, thuris albi, ana
ʒ ij. therebinthinæ ʒ s. seminis lauendulæ ʒ j.
moschi ʒ s. incorporentur, & extendantur in
aluta. Pessarium.

Pessarium.

Rz assæ foetidæ, myrrhæ, thuris albi, ma-
stiches ana quantum s. pro ætate, & ratione
mulieris, s. pessarium malaxatum, cum oleo
laurino, vel de lilijs, addendo ʒ j. sem. lauen-
dulæ, & baccarum lauri ʒ s. Naribus odora,
vtero foetida admouenda. Pannis lineis inuol-
uendæ partes pudendi, & vicinæ perfumiga-
tis cum myrrha, & thure.

Suffumigia & infusionses vt prius. Sed
hic peculiariter ex lauendula, bistorta, folijs
& baccis lauri, adiecta portiuncula myrrhæ,
thuris cum cortice, & masticis.

Si putruit vteri pars quæ decidit, placuit
Græcis & Arabibus, vt quicquid corruptum,
si amputetur.

DE SISTENDIS MENSIBUS. Caput LVIII.

Mensis naturalis est purgatio, nisi vel
quantitate excedat, vel præter perio-
dos

dos effluat. Decimo quarto anno ferè excitatur, nonnullis duodecimo, rarissimè septimo. Definit verò xl. aut paulò post. Aliquando ad lx. producitur. Alijs singulis mensibus, nonnullis vno aut pluribus mensibus intermissis. Quibusdam sæpius vno mense redit. Iunioribus ad lunæ plenilunia, alijs ferè decrecente luna, tribus, 4. 5. 6. 7. diebus, eo plus minúsue. Maiorem copiam efficiunt, ratio vitæ plenior, otium, temperamentum frigidius, tenuitas sanguinis aut acrimonia, amplitudo vasorum quæ plurima, & maxima ad vterum perueniunt. Subsistere debent in totum grauidis, puerperis, lactantibus.

Causæ copiosioris fluxus.

V T sistas, primum animaduerte causam immoderati fluxus, colorem sanguinis fluentis, si linteolo excipias, animaduertes. Calida enim menstrua, vbi sanguis calidior est: florida atque rubentia, vbi sanguinis copia in causa est: subalbida, vbi sanguis frigidior est.

Curatio

R VBENTIB V Sitaque mensibus, siquidem corporis plenitudo est, venam è cubito secato. Si verò magna pars plenitudinis iam depleta est, aut alioqui non redundat in reliquo corpore sanguis, cucurbitulas satis amplas cum multa flamma, sub mammis affigito, vinctulis brachiorum vtitor, frictionibus manuum & calfactionibus. In vsu phlebotom-

Curatio fluxus à sanguinis copia.

DE SISTENDIS MENSIB.

miæ & reliquorum, interrogabis, qua parte vteri maior grauitas insit: Si dextra parte, basilicam dextram secabis, dextram manum ligabis, fricabis, calefacies, sub dextra mamma cucurbitulam affiges.

Curatio
fluxus qui
à cacochy-
mia.

SI verò cacochymia est, biliofum sanguinem rhabarb. ʒ j. s. aut hiera picra repurgabis. Si pituita, eadem hiera, aut rhabar. vteris, sed additò agarico. Sed verè vbi nulla plenitudo, aut manifesta cacochymia, cucurbitula sub mammis, aut in humeris apposita, vincula manuum, remedia quæ sanguinem sistunt, satis esse possunt.

Plantago.

IN laxitate meatuum astringentibus: in tenuitate sanguinis incrassantibus, vtendum est. Conuenit inter Græcos & Arabes succum plantaginis efficacissimè menses sistere. Memini (inquit Gal.) cum iiii. diebus iugiter sanguis fluxisset, nec sisti posset, cyatho vno succi plantaginis iniecto, constitisse. Recentiores, aqua plantaginis vtuntur, in qua melius fuerit aliquid dissoluere eorum, quæ sanguinem sistunt, vt ʒ j. troch. de carabe, de spodio, de terra sigillata, & eorum, quæ iam antea sæpe enumerata sunt. Loco pessulorum, lana vel cotton, aut mollius linteolum, astringente succo, vt plantaginis insuccatur, & ita inditur genitalibus.

Pessuli,

Pessuli si finguntur, tenuēs sint ac rotundi ad instar digiti, ē lana, bombace aut concerpto linamento, quibus medicamenta adstringētia excipiantur. Deinde conuoluantur vel serico raro, vel lineo linteolo, pendeat ē filo, vt cū fuerit opus, retrahatur. Mulieres vincula fingunt ē peruinca (quam vulgus vocat vincam peruinca) quæ iniiciunt cruribus.

Laudant ungulas asini, pelles anguillarum, pelliculas interiores nucis auellanae, quæ cum succo cydoniorum, coguntur in pilulas, aut diluuntur in succo conuenienti.

Sanguinem
sistētia.

Vtuntur epithematibus lumborum & crurum posteriorū, ex aqua plantaginis, sumach, vino rubro astringente, & similibus.

Lumbis im
ponenda.

R̄ scorix ferri crematæ & in aceto extinctæ, deinde puluerisatæ, lapides hæmatitis triana ꝑ ij. syrupi myrtillorum & rosarum ana ꝑ s. aquæ plantaginis ꝑ ij. f. potus.

R̄ trochis. ambra citrinæ, coralli rubri ana ꝑ j. f. puluis, detur ex aqua plantaginis. Aliud:

R̄ boli armēni ꝑ ij. coque in vino subtili, sub austero ad ꝑ ij. bibatur colatura. R̄ conser. ros. antiquæ ꝑ ij. seminis plantaginis ꝑ ij. sanguinis draconis, boli armēni ana ꝑ iij. ambra citrinæ, coralli rubri, ana ꝑ j. cum syrupo de myrtillis fiat opiata, datur castaneæ magnitudinē sero & mane ante cibum.

DE PROVOCAT. MEN.

**Aproprie-
tate quæ
cōueniant.**

Laudant puluerē è pectunculis, qui è Com-
postella & mari importantur. Iaspis, onyx, id
est, cornelina, hæmatites, corallia rubra prodes-
se creduntur, siue in puluerē redacta vsurpen-
tur, vel è collo pendeant: manui alligentur, aut
supponantur mammis.

Distillatō.

Distillatum è conserua consolidæ maioris
& limacibus ana. Aliquando ad stupefacientia
veniendum est.

Narcotica.

Rz Philonij ꝑ j. boli armeni ꝑ j. cum vino
styptico, fiat potus.

Ablutiones ex vino austero, in quo salvia co-
xerit, aut aliquid ex materia astringenti. Inuri-
ctiones ex oleo rosarum melino, vel in quo a-
stringentia coxerint.

DE PROVOCATIONE MEN- struorum. Cap. LIX.

Resistunt menses ætate, conceptu, lacta-
tione, & hi prouocari non debent. Sunt
quibus propter calidius temperamentum &
siccus, propter frugaliorem vitam, exercitia
maiora, vacuationes tum manifestas, tum in-
sensibiles, vt sanguinis vacuationes per nares,
phlebotomias frequentes, & alia eiusmodi. Itē
in ijs, quæ à longo morbo se confirmant. Alijs
propter pinguedinem, in quam totus sanguis
conuertitur: nonnullis propter gracilitatem
& inopiam sanguinis. Neque his commouen-
dus men-

dus mensis, vt nec bene carnosus. Si quidem Menses
quando
mouendi.
 cessatione menstruorum nihil offenduntur.
 Vnicum tamen est quod excipi debet, ratio ge-
 nerationis. Nam vt mulier suppressa, nihil læ-
 datur purgatione, quia tamen sine menstru-
 sanguine generatio esse non potest, oportet
 quidem naturam assuefacere, vt sanguinem in
 vterum deriuat. Nam in multis conceptum
 adiuvat bis aut ter in anno detractus sanguis,
 sed ijs maximè, quibus præ copia sanguinis,
 menstrua resistunt. Huius rei author est Hip-
 pocrates. Frequentissimum est, vt vel crassiore
 sanguine, vel alioqui interceptis vteri venis,
 resistent menses.

Hac in re consilium est Galeni, vt vena mal-
 leoli aperiatur, tria vascula detrahantur, ali-
 quot post diebus, duobus tribusue, balneum
 imperetur, in quo chamæmeli flores, origa-
 num, maiorana, arthemisia, lauri folia, conyza,
 baccæ iuniperi, & lauri, aliaq; eiusmodi coxe-
 rint. Statim à balneo melicratum propinan-
 dum, è pulegio, calamentho, & alijs eiusmodi.
 Alioqui nostro more syrupus de arthemisia,
 de hyssopo, præsio, calamentho, de byzantijs,
 de duabus aut quinque radicibus ad ʒ j. s. cum
 aqua cuscutæ, decocto cinnamomi, aut cassiæ
 lignæ ad ʒ iij. propinandus est. Quod si
 fortius volueris, castorei ʒ j. aut eo plus ad-

Curatio
 si à sangui-
 nis copia.

Menses
 mouentia.

DE MENS. SVPPRES.

ijcies. Hac arte semper expertus est Galenus moueri menses, vt nihil inde mulier lædatur. Cucurbitulæ pubi, inguini, interiori femóri affigi debent.

Purgationes conueniunt ex hiera picra, quæ hoc modo parari debent:

Purgatio.

℞ aloes succo trini ꝓ ij. spicæ cassiæ lignæ, cinnamomi, xyloaloes, radicis gentianæ, masticis, asari, cubebarum ana gra. vj. croci grana iij. omnia puluerisata incorporentur cum modico conseruæ anthos, aut borraginis, propinentur cum vino albo tenui.

**Conseruæ
borraginis.**

Secretum est quarundam mulierum, vti conseruæ borraginis dissoluta in vino albo tenui. Potest & puluere hieræ aliquid agarici commisceri. Laudantur & pilulæ alephanginæ, masticinæ, & similes. Laudatur quoque hæc purgatio.

℞ cassiæ fistulæ ꝓ x. pulueris liquiritiæ ꝓ ij. croci gr. iij. mellis anthosati ꝓ iij. dissolue in decoct. cicerum rubrorum. Vacuato & bene purgato corpore, alijs remedijs vtendum est.

Suffitus.

Suffitus aromatum muliebria ducit. Fiunt autem cum baccis lauri, iuniperi, siccis herbis adoratis, cassia lignea, & alijs eiusmodi.

Encathismata.

Encathismata vt prius, vbi viscosi & pingues humores sunt, petroselino, porro, apio, allijs, smyrnio, styrace, melanthio, fœniculo, vtroque

vtroque centaurio vtendum est, & ad suffitus & olea comparanda, & pessulos. Laudatur oleum de behen, de nuce moscata, laurinum, de iunipero.

Sunt qui genistæ floribus ad dimidium vas **Genistæ flores.** impleant oleum chamæmelinum superfundant, fideliter obturatum vas fimo sepeliunt, aut reponunt in furno calido, sinuntque effervesce: quo oleo inguina inungunt & pessulos madefaciunt.

Optimum est imperare decoctionem cicerum rubrorum coctorum cum radicibus petroselini, vt cum butyro, sale modico iusculum paratur, cui vt ferè consuetudo est, puluerem cinnamomi, & tantillum croci insperges.

Laudantur aquæ absinthij, cuscutæ, pulegij, calamenthi, mentastri, rubæ tinctorum, sauinæ, vinum album tenue, colatum per manicam Hippocratis cum saccharo, in aqua anthos dissoluto, & tantillo cinnamomi. **Hermodylos scribit Mesue, non habere par remedium mouendis mensibus, & fœtui mortuo. Fortes quoq; sunt trochisci de myrrha.**

Hermodylos scribit.

Trochisci.

R. myrrhæ electæ ʒj. lupinorum optimè tritorum ʒv. foliorum rutæ, mentastri, pulegij, cumini, rubæ tinctorum, serapini, opopanax ana ʒij. formetur trochisci pondere ʒij. detur vnus manus, cum aqua, in qua lupuli semē coxerit, vel:

DE PRAEVOCAZIONE.

Rz myrrhæ, ʒ ij. aſæ ſœtidæ, ʒ ſ. cinnamo-
mi gra. x. croci gra. ij. cum aqua rubeæ ſiant
pil. Fœniculi radix, melanthium, & hoc qui-
dem præſtantiffimum eſt. Alij dant trypheræ
ſine opio ʒ j. cum decocto cinnamomi. Eodem
modo mithridatium dari poteſt. In ſumma o-
mnia quæ magis calefaciunt, & ſiccant minus.
Peſſulus.

Rz olei muſcellini (conuenientiffimum) ʒ
ij. pul. gentianæ ʒ ij. miſce cum cotone moſca-
to in eo madefacto, fiat peſſulus.

DE PRAEVOCAZIONE

uteri. Cap. LX.

Signa uitæ
& mortis.

Multa ad hanc rem ex cap. 5. lib. 6. de lo-
cis Affectis, & Actio colligenda ſunt.
Vocatus in paroxyſmo, primum an viuat mu-
lier cognoscere debet. Nam ſæpe fit, vt grauio-
re accelsione intereant, aut non aliter iaceant,
quàm mortuæ. Infidele eſt ſignum vitæ, quod
floccis lanæ naribus admotis, vel vaſe pleno a-
quæ impoſito regioni ſtomachi, colligitur.
Sternutatorijs potius de vita cognoscendum
eſt. Secundum eſt, vt cauſam cognoscamus.

Cauſæ ſub
locutionis.

Cauſæ, Menſtruorū ſuppreſſio, ſpermatis cor-
ruptela in nubilibus virginibus, viduis, & ijs
mulieribus, quæ ſua natura ſalaces ſunt, & præ-
ter conſuetudinem non miſcentur viris. Ali-
quando

quando humor quidam crassus, & veluti semina-
lis vtero collectus corrumpitur.

In paroxysmo extremorum vincula, frictio-
nes maximè crurum ex sale, aceto, vel simili-
bus: oderata vtero, grauitè olentia naribus ad
mouèda, male olida, vt castoreum, galbanum,
gagates lapis, capilli hominis, assa fœtida, plu-
mæ crematæ, cornu cerui, cornua reliquorum
animalium cremata, euphorbium. Quæ omnia
excipi possunt pice humida, vel in puluerem
redacta, galbano & rebus huiusmodi. Huius
causam repetes ex problemate 60. lib. 2. Aphro-
disæi. Odorata verò quæ vtero adhibentur, zi-
bet siue schiuetta, bombax moscatus, aut co-
ton mosco conspersus, oleo mosco perfusum,
gallia moscata, alipta moscata, caryophyllum
& similia. Formulæ.

Coratio
paroxys-
mi.

R^x aliptæ moscatæ ʒ ij. ligni aloes, caryo-
phyllorum ana ʒ j. mosci, ambræ, ana gra. iij.
excipiantur oleo de spica. Aliud.

Supposito-
ria.

R^x galliæ mosc. ʒ ij. cinnamomi, folij, ma-
eis, caryophyl. ana ʒ j. ambræ, mosci, ana gra.
iiii. ladani, styracis, ana q. s. cum aqua ros. mo-
scata, fiat veluti suppositorium, quod indatur
genitalibus. Pul. eiusmodi aliquando insper-
gemus costino, de spica, laurino, de lilio, vt in-
de intrinsectos digitos obstetrix affricet ori vte-
ri in virginibus, in alijs etiam interiora. Et vt

Olea illi-
nenda u-
tero.

DE VTERI SVFFOCAT.

à paroxysmo excitentur, vellicandæ aures, nares, sed maximè pili, qui pudendis adnascuntur. Aliquando etiam piper, zingiber, & alia eiusmodi pudendis immittuntur, vt naturam irritent ad excretionem. Et quia magna ex parte plenæ sunt ventorum, glandulis, clysteribus, vnctionibus quæ flatus discutiant, vtendum erit, ex cap. de Colico dolore.

Excitatis à paroxysmo, nullum remedium melius marito: alioqui si retenti menses in causa sunt, mouere oportet ex proximo cap.

Purgatio.

ET si humor crassus, purgationes conueniunt. Imperabis igitur hieræ diacolocynthis \mathfrak{z} iij. aut infusionem \mathfrak{z} j. s. agarici trochiscati, vel \mathfrak{z} ij. pul. hieræ picræ. Alioqui.

R̄ therebinthinæ lotæ in aqua matricariæ \mathfrak{z} s. s. dauci, agni casti, cinnamomi ana gr. viij. cum modico conferuæ anthos, fiat bolus.

R̄ therebinthinæ \mathfrak{z} iij. agarici trochiscati \mathfrak{z} ij. sem. dauci, canabis, ligni aloes ana gr. viij. cum eadem conferua, fiat bolus. Purgationes per interualla repetendę sunt, sed paulatim imminuto modo.

Castorij
usus.

Laudatur castoreum per interualla datum. Hoc autem varijs modis vtitur. Nam in paroxysmo dissoluimus in aceto acerrimo, & naribus admouemus, veleius \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} j. exhibemus, cum aqua distillationis radicum dauci, vel

ci, vel arthemisiæ. Acetum scyliticum, vel in quo pulegium, calamentum, thymum, origanum, conyza coxerint, naribus admotum, vel etiam potum adiuuat, etiam si vterum lædere videatur.

Laudatur ab antiquis semen & succus plantaginis, cinnamomum, lignum aloes, semen dauci, canabis, rutæ, agni casti, radix nymphææ, & quæ semen extinguunt, vomitus, sternutatio, cucurbitulæ primum inguinibus & coxis, deinde ilibus cum multa flamma affixæ. Hypochondria quoque fasciis deligata & constricta, glomeres sili anethino feruenti inculcati & calidi, alternatim appressi pectini. Laudatur pulvis cochlearum, id est, blattæ bysantiæ & pectunculorum: postea alia quoque remedia.

Dropaces & sinapismi extremæ spinæ & ventri appositi, balnea naturalia, frequens coitus, vnctio ex oleo dulci, in quo semen agni casti, rutæ, cinnamomum confracta omnia coxerint, ut eo sume & lûbi inungantur. Adijcitur aliquando piper, pyrethrum & similia. Sed in unda ratio corporis habitus, temporis anni, & reliquorum. Similiter clementer agendum est cum prægnantibus.

Quod ad phlebotomiam attinet, suspectum remedium, nisi suppressi sint menses. Tum eo modo quo in mouendis mensibus. Si quidem

Varia remedia.

Vena: secunda.

DE RHAGADIBVS.

nigella mulier est, phlebotomo malleoli venam aperies: sin alba & mollis, vel scarificabis, vel sanguisugis vteris.

DE RHAGADIBVS.

Caput. LXI.

Rhagades
quid.

Rhagades vlcera sunt ani & vteri, diducta in fissuras: sed alia humida et sinuosa alia callosa, nonnulla cancrofa & feruida.

Curatio.

Saniosa primum ablues sero lactis, mulla: deinde consolidabis tetrapharmaco in rosaceo dissoluto, medicamentis è lithargyro, chalcitide & metallis. Callosa remollies, œsipo, radice lilij, iride illyrica, quam excipies terebinthina. Alioqui vitellum oui assum cum lacte muliebri subactum impones. Vbi feruor & cancri suspicio.

℞ cuscute lotæ 3 iij. tutiæ præparatæ & puluerisatæ 3 s. misce. Aliud.

℞ succi portulacæ, lactucæ, plantaginis psyllij, horum vnus 3 iij. agitentur in plumbeo mortario, pistillo blumbeo ad crassitudinem. Ceratum rosatum Galen. subactum cum succo solatri. Vnguentum de cerusa, de plumbo, quibus tutia lota & infriata commisceri debet.

DE

DE MOLA VTERI.

Caput LXII.

MOla cruditas quædam est et coagulatio Mola quid
 materiæ, quam naturalis calor infor-
 mare non potest, vixque curari potest.

Vtendum tamen primum quidem mollien- Curatio
 tibus ex capite de Scyrrho, deinde ijs quæ par-
 tum eijciunt, & foetum mortuum excludunt, qua-
 lia sunt, trochisci de myrrha & hermodact. etc.

DE HERNIA.

Caput LXIII.

QVæ ad hanc rem pertinent plurima
 cap. 18. & sequentibus libri 7. Cornelij
 Celsi: multa quoque apud Paulum & Aetium.
 Cæterum tendo quidam membranofus est, v- Causa herniæ
 trinque ab inguinibus procedens in peritonæ-
 um exporrectus, cuius robore peritonæum
 confirmatur, atque hinc omentum & intestina. Re-
 laxatus herniam facit, descenditque plus minus-
 ue intestinum & omentum: aliquando in ingui-
 na, nonnunquam in scrotum, unde nomina *ἑρμιάλη* & *ἑπιπλοκήλη*, aliquando rupto peritonæo
 idem fit. Graue malum est, cum cæcum intesti-
 num descendit, intestinumque in scroto cōvoluitur
 Supprimuntur fœces, regurgitantque in ventrem.
 Testiculus erythroides tunicavestitur. Posthæc
 vero adnata est, *σάρξ*, in superficem extenditur.

folliculus genitalis, quod *ὄρχιον* Græci, scrotum Latini vocant. Inter erythroidem & testiculū, & inter darton & erythroidem, aut etiā in scroto, aquosa sanies aut aqua colligitur, vnde hydrocele. Nonnunquam soli flatus herniam repræsentant, idque recens natis puerulis sæpe contingit, facileque discutitur. Varicosus ramex, Sarcocoele, testiculorum inflammatio, tumor, & similia extra rationem herniæ sunt.

Hydrocele

Curatio aquosæ & ventosæ.

Aquosa & ventosa hernia remedijs curantur, quæ descripta sunt in ascite & tympanite. In aquosa peculiariter laudatur emplastrū factum è recenti stercore vaccino, & parte tertia pulueris boli armeni vel sanguinis draconis. Laudatur & $\frac{3}{4}$ s. pulueris è cremata radice brassicæ. Puluis is incorporatur adipe suillo veteri.

Enterocoele & epiplocele.

Ad *ὑπερσπύλιον* & *ἐπιπλοκύναν* multa sunt remedia medica, tum quæ per os sumuntur, tū quæ apponuntur. Sed in primis habenda ratio, vt quod decidit, reponatur. Quies ad multos dies imperetur, molli lecto decumbant pro ratione corporis. Abstineant clamoribus, & in egerendo manum apprimant pubi & scroto, ne quid recidat.

Fasciarum præparatio.

Fasciæ seu loculamenta scroti ex panniculis comparantur, sed ita compactis, vt solidæ sint. Optimumque facit materiam eiusmodi fasciarum

sciarum astringentem materiam primum imbibisse. Possunt & ex ligno, ferro, aut solidiore alioqui materia confici, sed ita, vt interiori parte qua scrotum contingant & inguina, molliori corpori inducantur.

Laudatur succus iacææ vtriusque, datus singulis diebus mane quantum testa oui capiat cum modico vini albi. Ex eodem succo depurato iulep & syrupus comparari possunt. Laudatur pul. & succus radicis consolidæ maioris, rusci, osmundæ regalis, sigilli Salomonis, panis, cuculi, radix valerianæ. Pulueris 3 j. datur pueris in lacte cocto, addito oui vitello, aut ex solo oui vitello, succis vtemur, vt succo iacææ, eodem modo seminis thlaspi, vermibus terrenis, limatura chalybis, lapide quem vulgus diamanta vocat, hepatica trita, & hæc quidem probata multis.

Iacææ succus.

Herbula est in sabulosis, ramulos multos in terram spargit, folijs minimis & rotundulis abundat alijs folliculis, ex viridi flavescentibus per ramulos sparsis, astringente gustu, ex qua succus expressus subinde affuso vino albo, certissimum, & aliquoties probatum remedium contra descensum intestini. Nam nouem diebus ita percurat, vt postea non redeat malum.

Herniariæ.

Ex radicibus osmundæ regalis repurgatis, fiunt syrapi, qui huic rei conuenient, radices

Emplastra eiusmodi in vino nigro austero coqui possunt & emplastra inde finge. Alioqui vtendum est emplastro pharmacopolarum contra rupturam. Valet & lenticula aquæ trita & alligata, si militer & cicuta: Valet radix pentaphylli sicca trita ꝓ j. pondere ex vino data. Foliorum equiseti ꝓ s. tritorum ex aqua calida. Parabile emplastrum ex ꝓ j. bdellij; mane quidem subacta cum salua hominis, vespere verò cum vino austero. Radix cyperi, arnoglossæ, aristolochiæ longæ & rotundæ, & in emplastrum formata, & trita prius. deinde data potui. Emplastrum:

Octauij emplastrum. R^x masticeis, corthicis thuris, nucis cupressi, myrrhæ, sarcocollæ, vsblach (glutinis piscium) ꝓ s. vsblach in aceto dissoluatur, reliqua trita miscéantur, extendantur in aluta. E nucis cupressi & gallis immaturis ad cōsumptionem tertiæ partis coctis, emplastra fiunt parabilia, quæ in mensem relinquuntur, nisi superueniat dolor. Liquor autem in quo coxerit potui datur. Probatissimum Octauio.

R^x balauistiorum ꝓ j. s. gallarum ꝓ s. radiceis asphodeli, radiceis narcisci: aut si hæ radices desunt, radices arnoglossæ & betæ loco personatæ ana ꝓ j. s. coquantur in vino, tundantur & in emplastrum subigantur.

Emplastrum de spuma argenti. R^x spumæ argenti vehementer combustæ ꝓ ix. aceti ꝓ s. ij. & ꝓ iij. olei cydoniorum ꝓ s. succi

succi plantaginis ꝑ ij. spuma argenti in aceto extinguetur etiam dum feruens, deinde teratur, tum adiecto oleo & succo, perpetuò agitando, fiat decoctio secundum artem, vt fiat emplastrum, quod quinque diebus continuis adhibebitur. Aliud emplastrum.

R̃ thuris, mastice, sarcocollæ, acaciæ, lapidis hæmatitis, mumie, tragacanthi, gumi Arabici, terræ sigillatæ ana ꝑ iiij. boli ar. gallæ, lithargyri, balaustiorū, nucis cupressi, malicorij, aristolochiæ longæ & rotundæ, corticis olibani, rosarum, radicis vtriusq; consolidæ, orobi, filiginis, sambuci, cyperi ana ꝑ s. picis naualis ꝑ ij. s. colophonie, resinæ pini, terebinthinæ ana ꝑ j. visci quercini ꝑ j. s. ceræ ꝑ ij. pilorū leporis vltorū ꝑ iiij. olei in quo pingues ficus coxerint ꝑ s. fiant magdaleones sec. artē, de quibus portio extendatur in aluta & applicetur. Quòd si ijs remedijs nihil proficitur, ad chirurgiam veniēdum est, quam ex 6. Pauli, & 7. Cor. Celsi & recentioribus chirurgis colliges.

Magdaleones.

DE ARTHRITIDE.

Caput LXIII.

CVra in vacuando & roborando. Vacuamus & repellēdo & diuertēdo & propriè vacuando. In cautione & initio morbi etiā si arthritidis frigida est, si quidē nihil aliud prohibet,

Curatio.

Phlebotomia.

detrahendus sanguis est. Ischio vel crure labo-
rante, venas brachij diuidimus: Et si quidē flu-
xio est à capite, mediam: si à reliquo corpore,
basilicam. Hippocrates non satis manifesta ra-
tione venas post aures aperit, vbi coxendix af-
ficitur. Arabes vehementer laudant phlebotō-
miam ex interuallo annularis & parui digiti.
Brachijs laborantibus, deplendus est sanguis è
crure, & hæc perpetuo κατ' ἴσιν. In coxendice,
post phlebotomiam è brachio, venam poplitis
aut malleoli incidere oportet, multò magis si
sanguis in causa est. Quod si dextrū crus, dex-
trum item brachium simul laborant, è sinistris
inēbris vena secanda est: si vero in omnia mem-
bra dolor sparsus est, ex eo, qui minus laborat.

Purgatio
in biliosa.

P V R gatio. In biliosa arthritide & serosa,
Arabes fortioribus catharticijs vtuntur. Alij
primum quidem leuioribus vt calsia, deinde
fortioribus. Melius fuerit partem materię leui
pharmaco repurgare. Quod est reliquum par-
tim vrinis, partim sudoribus excludendū est.

In pituitosa.

In pituitosa, alius magis ducenda est, & cū
melancholia in vitio est. Solo potu lactis asini
ni & decocto radicis graminis, dulcorato cum
modico saccharo, calidæ arthritides interim
curantur. Purgationes ex superioribus repe-
tendæ sunt, & maximè ex morbis capitis.

Peculiariter laudatur purgatio quæ fit her-
modacty-

modactylis, & Græcis & Arabibus. Pilulæ sunt ex hermodactylis paratæ in officinis, maiores in causa frigida, minores in causa calida. Minoribus rhabarbarum, maioribus agaricum adijcies, vt massæ pilularum 3 j. sit, reliquorum 3 j. Græci hoc modo.

Pilulæ de
hermodactylis.

R̄ hermodact. 3 s. anisi, cumini, piperis cōmunis & longi. zinziberis, medullæ seminis cartami ana 3 j. myrrhæ 3 s. euphorbij recentis 3 ij. masticeis 3 j. cinnamomi 3 s. moschi gr. ij. cum aqua saluæ, fiat massa, dosis 3 iiij. ex hydromelite. Arabes hoc modo.

Pilulæ de
hermodact.
Græcorum.

R̄ hermodact. 3 iiij. se. cucumini, zinziberis ana 3 j. trita incorporentur cum melle, dentur cum aqua tepida. Hæc in pituita magis cōueniunt, in biliosa singulis dosibus gr. ij. aut iiij. diagridij adijce. In biliosa hoc modo componunt.

Pilulæ de
hermodact.
Arabum.

R̄ aloes 3 j. diagridij gr. xv, rosarum rubrarum, seminis apij & fœniculi ana 3 s. hermodact. 3 j. s. fiat pilulæ dentur in nocte. Alij hoc modo:

R̄ hermodactyli. 3 iiij. masticeis 3 ij. rhabarbari 3 j. sacchari 3 iiij. fiant pilulæ, dentur ex aqua calida. Vtuntur electuario de succo rosarum et diacydonio cathartico in biliosa. In pituitosa 3 s. turbith gūmoli in lacte cocti, vt expressio

DE ARTHRITIDE.

bibatur. Neq; reformidant ꝑ j. diagridij cum saccharo rosarū. Comparant & pilulas è 3 iij. sarcocollę, serapini vel opopanacis. Sed videndum in vsu fortium pharmacorū, ne æger macilento sit corpore, virtute non ita firma maxime ventriculi & intestinorum. Periculum enim fit, ne inde citetur dysenteria. Et hermodactyli natura sua stomachum lædunt, propterea quidam è veteribus non radice, sed herba eius utebantur, nihilo minus adiectis quæ stomachum roborant. Alexander loco hermodactyli, coronopodia herba utebatur. Plurimum laudantur hæ pilulæ, nec stomachum lædunt.

Pilulæ quę stomachum non lædunt.

℞ agarici 3 j. nucis moscatæ, zinziberis, ana ꝑ s. infundantur in aqua mentæ, fiat levis feruor super calidos cineres: materiæ expressæ adde rhabarbari ꝑ iij. pulueris hieræ diacolocynthidos 3 j. s. diagridij ꝑ s. cum infusione, fiant pilulæ dosis 3 j. vel ꝑ iij.

Topica.

Topica sunt vt dolorem leniant, repellant, coquant, discutiant, roborent. Celebre iam olim, nunc etiam frequentatum remedium, medullæ panis p. j. dissoluatur in lacte calido, muliebri, bubulo vel ouillo, cui adde croci 3 s. & si vehemens dolor fuerit, & calor, adde opij à 3 s. ad 3 ij.

Opium.

℞ tria albumina ouorum bene agitata & despuma-

despumata cum \mathfrak{z} j. olei rosarum misce, linteola in medicamēto madefacta, subinde applica.

\mathcal{R} cerussæ \mathfrak{z} ij. dissolue in aqua endiuivæ & modico aceti, fiat liquidum vnguentum.

Quod si ad narcotica præ doloris vehementia veniendum est. Narcotica:

\mathcal{R} olei rosarum \mathfrak{z} iiij. opij \mathfrak{z} ij. incorporentur. Aliud

\mathcal{R} butyri recentis \mathfrak{z} ij. mandragoræ subtilissimæ tritæ \mathfrak{z} j. misce.

\mathcal{R} lactis, muliebris \mathfrak{z} ij. opij \mathfrak{z} l, Alia alijs locis descripta.

Sola aquæ frigidissimæ perfusio vel niuis aliquando satis est. Verbasci flores & folia, lenticula palustris, psyllium, nymphæa, violaria, portulaca, & similia trita per se vel rosaceo apponuntur in calida. A quibus leuiter digerentibus vtendum est, vt cerato ex oleo chamæmelino, anethino & similibus. In calida,

In frigida cōueniunt, oleum in quo enula, aristolochia, gentiana, nepeta, iua, saluia, maiorana, rosmarinum, costus, radix althææ, vulpes, vermes terreni coxerint. Laudatur & oleum raphaninum, aut in quo galbanum liquefactum sit, oleum de terebinthina, oleum expressum è granis tritici, vel nuce moscata in lamina ferrea candente, quibus aliquando In frigida,

DE ARTHRITIDE.

axungia commiscetur: laudatur plurimum humana & vrsina: Oleum in quo folia ebuli coxerint, vel succus radicis eius. Sunt qui dolentem locum primum quidem frigidissima perfundant, idque iterum atque iterum: deinde è petroleo fouent.

Ab occulta proprietate inuuant.

Quædam occulta proprietate profunt, quælia sunt ossa comminuta aut cribrata, deplume caput milui crematum & tritum, corium canis marini admotum loco, corium torpedinis, ciconiæ sterces, vt cum adipe vrsino fiat vnguentum, pulli ciconiæ oleo dulci, aut pulli cygni incocti, vt oleo, medulla ceruina misceatur. Historia est Sexti Pompeij, qui pedibus immersis aceruo tritici persanatus sit. Quod remedium postea medici secuti sunt.

Ad topheas.

In topheis, caseus inueteratus acris maceratus in decocto cruris suilli salsi, vt inde fiat emplastrum. Stercus caprinum in oxycrato dissolutum cum farina hordeacea: sed hæc durioribus corporibus, in mollioribus, axungia, radices althææ commiscendæ sunt.

Rz collæ siue visci, terebinthinæ, ceræ ana ʒ j. galbani ʒ iij. liquefactis vtitor. Vsus mithridatij & theriacæ post bene purgatum corpus laudatur Græcis, & Arabibus.

Balnea.

Balnea, si nullû viscus infirmum est, si va-

cua-

euatum corpus, remissionis tempore, munita prius ægra parte ex puluere boli armeni incorporato in oui albumine, vel hoc medicamēto.

R̄ corticis granatorum, sumach ana p. ij. coquantur ad mollitiem, incorporentur cum p. iij. farinæ hordei & succi semperuiui, applicentur loco. Hæc autem ne balneo liquefactus humor defluat in partem infirmam, quibus remedijs & in repellendo vti licet.

In fine morbi, & ad præcautionem originum, menthastrum, nepeta in aqua salsa diu coquantur, inde fit potus. Vel vna parte salis tribus aquæ vel olei mixtis, locus affricatur. Abſtinentia vini multos sanauit. Balnea quoque naturalia ad cautionem conueniunt. Vere & autumno podagræ, Aprili ferè & Septembri. Itaq; prius cauendum est. Humor ferè calidior chiragræ, podagræ frigidior.

Declinatios
ne & præ-
cautione.

In ischiadicis venę sectio vt prius, ita & purgatio: Clysteres acres, cucurbitulæ loco affixę. Repellentibus abſtinendum, fortioribus remedijs vtendum, phœnigmis, iberide, nasturtio, dracuntio, batrachio & similibus. Cauterio, incisione cum ferro, vt in Eupolemo Hippocrat. fieri oportuit. Hæc eadē reliquis arthriticis, vbi contumacius malum est. Inuentū quoque hoc remedium vt superiori parte, qua hu-

De dolore
coxendicis
curando.

DE ELEPHANTIASI.

mor influit in articulum, caro nudaretur, venæ hamulo exciperentur, vinculis interceptæ secarentur, atque via ita fluxioni præciditur. Plurima remedia scripta inuenies apud Aetium.

DE ELEPHANTIASI VERA

Caput LXV.

Confirmata elephantiasis non curatur, recens curari potest aut prohiberi. Recentem volunt, quæ annum non superat, sæpiusque medicus, vt de morbo iudicet, quàm vt eundem curet, appellatur. Signis itaque de morbo pronunciandum est, temperamentum hominis spectandum est.

Causæ.

Qui sanguine sunt crassiore, huic vitio magis opportuni sunt, & aliquando hæreditariū malū est. Locis calidioribus, adustus sanguis, aut à frigore congelatus, hoc malum inuehitur. A febribus continuis male curatis, ab usu alimentorum & medicamentorum, quæ melancholiam gignant, aut pituitam crassam, quæ nimium incidunt & attenuant, aut aliter calfaciunt, huius mali initium est.

Signa.

His piger sensus & motus, spiratio retardatur, durescit aluus, urinæ crassæ sunt ad instar iumentorum, aliquando tennes minguntur;

tur: Spiritus olet grauius, frequens ructus & sternutatio incitatur, libido incenditur, concidit appetentia, crassescunt malæ, mentum, superciliorum locus, crura & manus, labia crassescunt, tabescunt muscoli, & plurimum, qui medius est inter pollicem & indicem, fit gran dinosum corpus, sub lingua varicosæ venæ nigricant, facies rubet ad liuorem. Pili è capite & supercilijs defluunt, habitus corporis commutatur, fiunt *πρυπάδες* quasi alati, Satyros re præsentant, somnia molestissima, incubi, morror & anxietas, pulsus exiguus, imbecillis, creber, tardus: rubent oculi, & in rotunditatē coguntur, raucescit vox, narium pinnae dilantur, interiore parte nares constringuntur, dis pncea, mollis auricula contrahitur, excremen ta olida, interstitium naris corrumpitur, fixus intuitus. Quibusdam detractus sanguis totus corruptus non cogitur. Sal iniectum calenti & recens extracto sanguini, non dissoluitur, acetum iniectum sanguini non commiscetur. Si ad spondilia colli transfiguntur nō sentiūt, perit tandem extremitatum sensus. Oportet igitur vocatum medicum, vt de re magni momenti pronunciet, hæc signa omnia percurrere: quæ vt aucta sunt, ita auctum vitium est.

Consilium est Galeni, vbi eius mali suspi- Curatio

DE ELEPHANTIASI.

cio, vt vere sanguis detrahatur, deinde reſectis, viribus exhibeatur medicamentum, quod atram bilem purget. Ratio vitæ inſtituatur quæ ſanguinem craſſiorem attenuet ac depuret, vitato tamen immodico uſu attenuantium. Rationem vitæ ex Aetio & alijs colliges.

Venæ ſectio.

Conſenſus eſt Græcorum & Arabum, initio detrahendum eſſe ſanguinem. Sed quia magna ex parte corruptus iſ eſt, particulatim ex utroque brachio detrahes, eligesq; maiores venas, ſiquidem patiuntur multo magis cum ſpiratione difficilior eſt. Alioqui venas malleoli, vel extremæ manus aperies. Nonnunquam etiam contentus eris ſanguisugis, aut cum cucurbitulis cum ſcarificatione appoſitis, partim tibijs, partim ſcapulis. Auicenna etiam venas capitis incidit & iugulares, ſi ſuffocatio imminet.

Purgatio.

A ſanguinis miſſione purgatio ex hiera diacolocynthidos, deinde etiam adiectio diagridio, poſtremo etiam elleboro. Sed interuallis hæc fieri oportet quoque tempore ceſſamus à pharmacis, ſero lactis, lacte etiam, et ijs, quæ humores reperant & depurant, vtendum eſt. Materia ex capite, de Melancholia petēda eſt. Poſtea vero frequens vomitus, primum quidē leuioribus, deinde raphano, poſtremo elleboriſmo.

borismo. Cucurbitulæ inanes stomacho & visceribus admoventur, caputpurgia, gargarismi, vnctiones primum molles, vt è butyro, de inde vbi pruritus est, ex ijs quæ detergeant. Postremo cum vlceratæ sunt partes, conueniunt quæ leuiter astringunt.

Balnea primum dulcia (persuasum vulgo **Balnea.** est, comparato sanguine humano, sanare hunc morbum) deinde si pruritus est, naturalia conueniunt. In multis remedijs brassicæ & absinthij decoctum, stœchados, ligni sancti commendatur, optimumque fuerit cum ijs passulas, ficus, violarum flores, buglossæ & borraginis incoquere, multò magis, si feruidior sanguis est. **Decocta.**

Castratio singulare remedium ab antiquis: **Castratio.** probata est scobs eboris, cornu ceruini, succus cyrenaicus, aselli aquarij, scyllæ semen, & hæc duo maximè contra dyspnœam. Smaragdus **Smaragdus.** trita & ex aqua data, vel cum aqua & gummi illita. Erinacei caput laudatur à Galeno, nepe-
ra, qua eo modo vtendum erit, vt ligno sancto. **Theriaca.** Laudatur theriaca quæ in calidiore conditio-
ne temperari potest, adiecta parte conseruæ viol. aut borraginis. Laudatur vinum in quo vipera viua extincta sit.

Viperarum carnes abscesso capite & cauda **Vipera.**

DE EXCORIAT. CUTIS.

ad putrilaginem coctæ cum iure albo veteri,
vel ij, quæ huic morbo conueniunt, vt & car-
nes edantur, & iusculum sorbeatur. Alioqui
non tam suspectum remedium est, si pabulis
caporum & gallinarum iusculum illud vel car-
nes misceantur. Senties penetrasse virus cum
plumæ decidunt auibus, tumq; aues ad cibum
elixabis. Sed theriacæ & remediorum vsus ma-
gis tempestiuus, à thermis comparatis è fuma-
ria borragine, endiuia, nepeta, rosmarino, ori-
gano, meliloto & alijs eiusmodi.

Yale.

VSTIO frequens circa caput, satis fuit ali-
quando, alioqui in tibijs ad genu, aut musculo
sa parte brachiorum, imprimuntur.

DE EXCORIATIONE CV- tis. Cap. LXVI.

Curatio.

EXcoriatio cutis, qualis est ex attritis, lon-
giore decubitu, ceratum ex tribus parti-
bus olei myrtini vel rosacei, & vna ceræ con-
uenit. Quod si calor est, ex succo plantaginis
decocto sumach, aut rei frigidaæ astringentis
subigatur. Eidem rei conuenit vnguentum
de cerussa.

DE RVBORE ET PVSTVLIS faciei. Cap. LXVII.

Vbi

VBi rubor faciei & pustulæ, sanguis è media vena brachij detrahendus est, imperanda purgatio, quæ partim flauam bilem, partim melancholiam purget. Cucurbitulæ ceruici & scapulis affigendæ cum scarificatione. Sanguisugæ malis, extremo naso, extremis labijs, lateribus menti affigendæ. Abluenda facies, primum quidem ex remollientium decocto, vt ficuum, passularum, ab ijsque fumus excipiendus, tum vel aqua plantaginis vel therebinthinæ, in qua mellis portiuncula dissoluta sit, faciem lauabis. Inunges autem a-xungia ursina vel vulpina, alioqui taurina aut porcina, in qua farina ciceris incorporata sit, Caseus recens ex aceto subactus æstate. Conuenit vnguentum mixtum ex sapone gallico & vnguento albo, ex vnguenti albi parte vna & tribus olei rosarum subactis, cum aqua plantaginis nenupharis, semperuiui. Sanguis leporis calidus, & reliquorum animalium, utilis est. Conuenit aqua distillationis florum salicis, succus limonum, sulphur viuum, cerussa, camphora.

VB I pustulæ eminent, vnguento enulato siue hydrargyro concidunt. Argentum viuum in saluia ieiuni hominis extinctum, & cerato, vel adipe concorporatum, efficacissi-

Pustularum
curatio.

DE DOLORE.

mum est. Hyeme theriaca vti licet, vel vnguen-
to citrino, vel pomulato, vel lithargyro auri
modo Seruitoris præparato. Sed interim dum
hæc fiunt, vitæ ratio instituenda est, quæ ca-
lorem hepatis attemperet, deinde etiam, qui
fumos prohibeant à cibo, qualis est tragea
communis, puluis communis adiecto co-
ralli modico.

DE DOLORE.

Cap. LXVIII.

DE dolore iam multis locis dictum est,
& postea dicetur; Fit autem, vel intem-
perie, vel solutione continui. Remedia vel pa-
regorica vel contraria qualitate pugnancia, vel
narcotica. De narcoticis multis locis.

Paregorica sunt oleum simplex, anethinū,
chamæmelinum, lini, oleum quorum, oleum
in quo althææ radix coxerit: axungia suis, gal-
linæ, anatis, vituli, ouum crudum, & alia sæpe
enumerata. Contraria qualitate pugnant &
hæc paregorica. Caryinum, laurinum, oleum
de galbano, de sulphure & similia calida olea,
ex refrigeratione nato dolore. A calore verò
excitato, repugnat oleum viol. ros. de nenu-
phare, papauere & similia.

Dolo-

D O lorem à siccitate corrigunt, aqua tepida, hydrelæum, lac, butyrum, oleum, axungia, æsypus. Dolorem à copia sanguinis phlebotomia tollit. Dolorem è flatu oxycratum tepidum, decoctum rutæ, anethi, serpilli, & alia, quæ capitibus de morbis intestinorum descripta sunt.

Dolor à
siccitate.

Dolor à
flatu.

A crassis humoribus cum flatu, oxycratum, hyssopus, thymum, pulegium, calamentum, & similia.

A contusione, caseus recens, aloe aut mastix oleo myrrino liquata: vbi locus intumuit, spongiæ fots ex sero lactis, siquidem inflammatio est, sic enim ex aqua tepida fovebimus, oleum ricinium, caryinum, & in his inculcatus panniculus & parti impositus.

Dolor à
contusione

F I N I S.

CAPITVM INDEX.

| | | |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | De dolore capitis | pag. 1 |
| 2 | De vertigine | 6 |
| 3 | De phrenitide | 7 |
| 4 | De apoplexia | 10 |
| 5 | De lethargo | 13 |
| 6 | De caro | 15 |
| 7 | De paralyfi | 15 |
| 8 | De spafmo cabins | 19 |
| 9 | De conuulfione | 21 |
| 10 | De incubo | 23 |
| 11 | De epilepfia | 24 |
| 12 | De melancholia | 28 |
| 13 | De catarrho | 31 |
| 14 | De ophthalmia | 33 |
| 15 | De debilitate vifus | 36 |
| 16 | De cataracta | 39 |
| 17 | De hæmorrhagia | 42 |
| 18 | De angina | 45 |
| 19 | De tuffi | 48 |
| 20 | De afthmate | 51 |
| 21 | De pleuritide | 54 |
| 22 | De fputofanguinis | 61 |
| 23 | De phthifi | 65 |
| 24 | De palpitatione cordis | 68 |
| 25 | De fyncope | 69 |
| 26 | De cholera | 71 |
| 27 | De imbecillitate ventriculi | 73 |
| 28 | De fingultu | 78 |
| 29 | De bulimo | 80 |
| 30 | De canina appetentia | 82 |
| 31 | De hepatis inflammatione | 82 |
| 32 | De hepatis debilitate | 85 |
| 33 | De morbo regio | 87 |

| | | |
|----|--|-----|
| 34 | De hepatis obstructione | 90 |
| 35 | De hydrope | 91 |
| 36 | De spleniticis | 95 |
| 37 | Contra rugitus & fluctuantem aquam e regio- ne lienis | 97 |
| 38 | De dolore colico à pituita | 98 |
| 39 | De colica à flatibus | 102 |
| 40 | De colico à bile | 103 |
| 41 | De fluxu cerebri | 104 |
| 42 | De lienteria | 104 |
| 43 | De dysenteria | 106 |
| 44 | De tenesmo | 112 |
| 45 | De fluxu hepatico | 114 |
| 46 | De fluxu pestilentiali | 116 |
| 47 | De mingendi difficultate | 116 |
| 48 | De dysuria & stranguria | 117 |
| 49 | De calculo | 119 |
| 50 | De vrinæ ardore | 123 |
| 51 | De mictu sanguinis | 125 |
| 52 | De diabete & inuoluntario vrinæ effluvio | 127 |
| 53 | De vermibus | 129 |
| 54 | De hæmorrhoidum suppressione | 131 |
| 55 | De hæmorrhoid. fluxu nimio | 132 |
| 56 | De ani exitu | 133 |
| 57 | De matricis exitu | 134 |
| 58 | De mensibus sistendis | 135 |
| 59 | De mensium prouocatione | 137 |
| 60 | De vteri præfocatione | 139 |
| 61 | De rhagadibus | 141 |
| 62 | De mola vteri | 142 |
| 63 | De hernia | 142 |
| 64 | De arthritide | 144 |
| 65 | De elephantiasi vera | 147 |
| 66 | De cutis excoriatione | 149 |
| 67 | De rubore & pustulis faciei | 150 |
| 68 | De dolore | 150 |





